

Министерство образования Республики Беларусь

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ»

Ю.Ю. ГНЕЗДОВСКИЙ, В.Н. ГОРБУЗОВ, П.Б. ПАВЛЮЧИК

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С РАДИКАЛАМИ

Пособие по спецкурсу «Методы решения задач»
для студентов специальности 1-31 03 01-02 - Математика

Гродно 2007

УДК 51(075)
ББК 22.1
Г56

Рецензенты: доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой математического анализа Гродненского государственного университета имени Янки Купалы *И.П. Мартынов*;
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальных уравнений и оптимального управления Гродненского государственного университета имени Янки Купалы *Н.С. Берёзкина*;
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры технической механики и материаловедения Гродненского государственного аграрного университета *А.А. Денисковец*.

Рекомендовано Советом факультета математики и информатики ГрГУ им. Я.Купалы.

Гнездовский, Ю.Ю.

Г56 Уравнения и неравенства с радикалами: пособие / Ю.Ю. Гнездовский, В.Н. Горбузов, П.Б. Павлючик. — Гродно: ГрГУ, 2007. — 246 с.

ISBN 978-985-417-977-3

В пособии рассмотрены методы решения уравнений и неравенств с радикалами.

Предназначено для учителей математики и учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и колледжей. Может быть использовано при обучении студентов педагогических специальностей методам решения задач элементарной математики.

УДК 51(075)
ББК 22.1

ISBN 978-985-417-977-3

© Гнездовский Ю.Ю., Горбузов В.Н.,
Павлючик П.Б., 2007
© ГрГУ им. Я.Купалы, 2007

ВВЕДЕНИЕ

В школьном курсе математики уравнения и неравенства занимают значительное место как самостоятельные темы и как аппарат решения многих других задач (геометрических, при исследовании свойств функций, решении текстовых задач и т.д.).

Уравнения и неравенства с радикалами имеют стройную логическую основу решения. При этом широко используется метод равносильностных переходов.

Благодаря большому количеству решённых задач читатель сможет успешно подготовиться к экзамену, получит навыки в выборе рациональных методов решения.

При использовании данного пособия необходимо учитывать следующие обстоятельства.

Пусть A — некоторое уравнение, неравенство, система или совокупность, B — также некоторое уравнение, неравенство, система или совокупность. При этом если A , например, неравенство, то B может быть уравнением, неравенством, системой и совокупностью.

Будем считать, что A равносильно B , и запишем

$$A \iff B,$$

если множество решений A является множеством решений B , а множество решений B является множеством решений A .

Другими словами, A и B равносильны тогда и только тогда, когда у A и B одно и то же множество решений.

Приведем примеры отдельных равносильностей:

$$x + 12 \geq 0 \iff x \geq -12;$$

$$x + 3 = x^2 + 3 \iff x = x^2;$$

$$(x + 3,2)^2 = 0 \iff |x + 3,2| = 0 \iff x + 3,2 = 0;$$

$$(x + 7)(x^2 - 1) = 0 \iff \begin{cases} x + 7 = 0, \\ x^2 - 1 = 0; \end{cases}$$

$$(x^2 - 25)^2 + (x + 5)^2 = 0 \iff \begin{cases} x^2 - 25 = 0, \\ x + 5 = 0; \end{cases}$$

$$\frac{x + 5}{2 - x} > 0 \iff (x + 5)(2 - x) > 0;$$

$$\sin x \geq 1 \iff \sin x = 1;$$

$$\cos x \leq -1 \iff \cos x = -1.$$

Символ \iff будем использовать и вместо оборотов слов «тогда и только тогда, когда» и «если и только если».

Например, запись

$$\frac{5}{6} < \frac{7}{8} \iff 5 \cdot 8 < 6 \cdot 7$$

означает, что

$$\frac{5}{6} < \frac{7}{8} \text{ тогда и только тогда, когда } 5 \cdot 8 < 6 \cdot 7$$

или, что то же,

$$\frac{5}{6} < \frac{7}{8}, \text{ если и только если } 5 \cdot 8 < 6 \cdot 7.$$

Будем использовать весьма удобные при изложении материала *условные обозначения*:

\mathbb{N} — множество натуральных чисел;

\mathbb{Z} — множество целых чисел;

\mathbb{R} — множество действительных чисел;

\emptyset — пустое множество;

\forall — для всех, при любых;
 \implies — следовательно; если, то;
 $D(f)$ — область определения функции f ;
 $E(f)$ — множество значений функции f .
 Так, запись

$$|x| \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

читается:

$$|x| \geq 0 \text{ при любых } x \in \mathbb{R}$$

или

$$|x| \geq 0 \text{ при любом действительном } x.$$

Утверждение

$$\text{если } x = 2, \text{ то } |x| = 2$$

с помощью символа \implies записывается кратко:

$$x = 2 \implies |x| = 2.$$

Среди числовых множеств будем выделять *числовые промежутки*. Это множества одного из видов:

$[a; b]$ при $a < b$ — *отрезок*;

$(a; b)$ — *интервал*;

$[a; b)$ и $(a; b]$ — *полуинтервалы*;

$(-\infty; b]$, $(-\infty; b)$, $[a; +\infty)$, $(a; +\infty)$ — *числовые лучи*;

$(-\infty; +\infty)$ — *числовая прямая*.

Обратим внимание на еще одно обстоятельство.

Если требуется решить уравнение, неравенство, систему или совокупность, то такую задачу понимаем как нахождение их *множества решений*.

Например, неравенство $x^2 < -3$ не имеет решений. Поэтому его множеством решений является пустое множество. В ответе запишем: \emptyset .

У квадратного уравнения $x^2 = 5$ два корня: $x_1 = -\sqrt{5}$ и $x_2 = \sqrt{5}$. Его множество решений состоит из двух чисел $-\sqrt{5}$ и $\sqrt{5}$. В ответе запишем: $\{-\sqrt{5}, \sqrt{5}\}$.

Система

$$\begin{cases} x + 1 > 0, \\ x - 1 \leq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > -1, \\ x \leq 1 \end{cases} \iff -1 < x \leq 1,$$

а ее множеством решений является полуинтервал $(-1; 1]$.
Совокупность

$$\begin{cases} x - 2 > 1, \\ x - 1 \leq -2 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 3, \\ x \leq -1. \end{cases}$$

В ответе запишем: $(-\infty; -1] \cup (3; +\infty)$.

Неравенство $(x - 1)^2 \geq 0$ выполняется при любом x . Множество действительных чисел является его множеством решений. В ответе запишем: \mathbb{R} или $(-\infty; +\infty)$.

Множество решений систем и совокупностей, которые содержат две переменные, будем записывать в виде множества упорядоченных пар.

Например, система

$$\begin{cases} |x| - 2 = 5, \\ y - 1 = -2 \end{cases} \iff \begin{cases} |x| = 7, \\ y = -1 \end{cases} \iff \begin{cases} \begin{cases} x = -7, \\ y = -1, \end{cases} \\ \begin{cases} x = 7, \\ y = -1. \end{cases} \end{cases}$$

В ответе запишем: $\{(-7, -1), (7, -1)\}$.

§ 1. УРАВНЕНИЯ С РАДИКАЛАМИ

1. Уравнение $\sqrt{f(x)} = g(x)$

Наличие радикала в задании уравнения

$$\sqrt{f(x)} = g(x) \quad (1)$$

предопределяет основные методы его решения. При этом первоначально ставится задача избавиться от радикала.

1.1. Формальный метод

Если обе части уравнения (1) возвести в квадрат, то избавимся от радикала и получим уравнение

$$f(x) = g^2(x). \quad (2)$$

Допустим, что уравнение (2) решено. Что это даёт для решения уравнения (1)?

Ответим на этот вопрос посредством следующих закономерностей.

Теорема 1. *Любой корень уравнения (1) является корнем уравнения (2).*

Доказательство. Пусть число x_1 — один из корней уравнения (1), который взят произвольным образом. В этом случае $\sqrt{f(x_1)} = g(x_1)$.

Из равенства чисел $\sqrt{f(x_1)}$ и $g(x_1)$ следует, что их квадраты $(\sqrt{f(x_1)})^2 = f(x_1)$ и $g^2(x_1)$ равны.

Равенство

$$f(x_1) = g^2(x_1)$$

означает, что x_1 является корнем уравнения (2).

Ввиду того, что среди корней уравнения (1) корень x_1 выбран произвольным образом, заключаем о справедливости теоремы. ■

Стало быть, корни уравнения (1) содержатся среди корней уравнения (2).

При этом уравнение (2) может иметь так называемые «посторонние» корни. Это те корни уравнения (2), которые не являются корнями уравнения (1).

Покажем это на следующем примере.

Пример 1. Уравнение¹

$$\sqrt{x+1} = 1-x \quad (3)$$

возведением в квадрат левой и правой частей приводим к квадратному уравнению

$$x^2 - 3x = 0,$$

корнями которого являются числа 0 и 3.

При $x = 0$ уравнение (3) обращается в верное равенство. Поэтому 0 будет корнем уравнения (3).

При $x = 3$ выражение $\sqrt{x+1}$ равно $\sqrt{3+1} = 2$, а выражение $1-x$ равно $1-3 = -2$. Поскольку $2 \neq -2$, то число 3 не является корнем уравнения (3).

Следовательно, уравнение (3) имеет один корень — число 0.

Возможность наличия у уравнения (2) «посторонних» корней объясняется следующим.

Если x_1 — некоторый корень уравнения (2), то

$$f(x_1) = g^2(x_1).$$

Тогда число $f(x_1) \geq 0$, а значит,

$$f(x_1) = (\sqrt{f(x_1)})^2$$

и

$$(\sqrt{f(x_1)})^2 = g^2(x_1).$$

Отсюда следует, что

¹Другие способы решения приведены в примерах 3 этого пункта, 1 и 9 из пункта 4.

$$\sqrt{f(x_1)} = |g(x_1)|.$$

Поэтому числа $\sqrt{f(x_1)}$ и $g(x_1)$ или равны:

$$\sqrt{f(x_1)} = g(x_1),$$

или являются противоположными:

$$\sqrt{f(x_1)} = -g(x_1).$$

Если

$$\sqrt{f(x_1)} = g(x_1),$$

то x_1 — корень уравнения (1).

Если же

$$\sqrt{f(x_1)} = -g(x_1) \neq 0,$$

то число x_1 корнем уравнения (1) не является. В этом случае x_1 — «посторонний» корень уравнения (2) по отношению к уравнению (1).

Рассмотренный метод решения уравнения (1) носит формальный характер. Потому что от уравнения (1) переходим к уравнению (2), не зная, какие корни уравнения (2) будут корнями уравнения (1).

Формальный метод решения уравнения (1) состоит из следующих этапов.

1. Переход от уравнения (1) к уравнению (2).
2. Решение уравнения (2).
3. Выделение из всего множества корней уравнения (2) тех, которые являются корнями уравнения (1).

Переход от уравнения (1) к уравнению (2) осуществляется почленным возведением в квадрат уравнения (1).

Метод решения уравнения (2) выбирается в зависимости от вида этого уравнения.

Выделение корней уравнения (1) из множества корней

уравнения (2) осуществляется проверкой.

При проверке каждый отдельно взятый корень уравнения (2) подставляется в уравнение (1) (см. пример 1).

Иногда «посторонние» корни уравнения (2) относительно уравнения (1) удобно находить иными способами. Например, доказать лишь то, что при $x = x_1$ выражение $g(x)$, расположенное в правой части уравнения (1), принимает отрицательное значение. Тогда x_1 — «посторонний» корень уравнения (2) относительно уравнения (1), так как расположенное в левой части уравнения (1) выражение $\sqrt{f(x)} \geq 0$ при любом значении переменной x , при котором оно определено.

Пример 2. Уравнение¹

$$\sqrt{5-x} = x-3 \quad (4)$$

почленным возведением в квадрат приводим к уравнению

$$x^2 - 5x + 4 = 0 \iff (x-1)(x-4) = 0 \iff \begin{cases} x = 1, \\ x = 4. \end{cases}$$

При $x = 1$ значение выражения $x-3$ отрицательное: $1-3 = -2$. В то же время выражение в левой части уравнения (4) всегда, когда оно существует, является неотрицательным.

Значит, число 1 не является корнем уравнения (4).

Число 4 — корень уравнения (4), так как расположенные в левой и правой частях этого уравнения выражения $\sqrt{5-x}$ и $x-3$ принимают одно и то же значение:

$$\sqrt{5-4} = \sqrt{1} = 1 \quad \text{и} \quad 4-3 = 1.$$

1.2. Метод эквивалентных преобразований

Этот метод также предполагает избавление от радикалов, но при этом ставится условие, чтобы от уравнения (1) перейти к равносильной ему системе, состоящей из уравнений и неравенств.

¹Другие способы решения приведены в примерах 4 этого пункта, 2 и 10 из пункта 4.

В основе этого метода лежит следующее свойство числовых неравенств:

$$\text{если } a = b \geq 0, \text{ то } a^2 = b^2,$$

и

$$\text{если } a \geq 0, b \geq 0, a^2 = b^2, \text{ то } a = b.$$

То есть имеет место равносильность

$$a = b \geq 0 \iff a^2 = b^2, a \geq 0, b \geq 0. \quad (5)$$

Ещё одно правило будем соблюдать: прежде чем решать уравнение (1), надо указать условия, при выполнении которых оно имеет смысл.

Уравнение (1) имеет смысл при $f(x) \geq 0$.

Если $f(x) \geq 0$, то $\sqrt{f(x)} \geq 0$. Следовательно, выражение $g(x)$, расположенное в правой части уравнения (1), должно быть неотрицательным: $g(x) \geq 0$.

Итак, если $f(x) \geq 0$ и $g(x) \geq 0$, то уравнение (1) имеет смысл и является равенством двух неотрицательных выражений $\sqrt{f(x)}$ и $g(x)$. Поэтому

$$\sqrt{f(x)} = g(x) \iff \begin{cases} f(x) \geq 0, \\ g(x) \geq 0, \\ f(x) = g^2(x). \end{cases} \quad (6)$$

Из уравнения

$$f(x) = g^2(x),$$

входящего в задание системы равносильности (6), следует, что $f(x) \geq 0$.

Значит,

$$\begin{cases} f(x) \geq 0, \\ g(x) \geq 0, \\ f(x) = g^2(x) \end{cases} \iff \begin{cases} g(x) \geq 0, \\ f(x) = g^2(x). \end{cases}$$

Следовательно, имеет место равносильность

$$\sqrt{f(x)} = g(x) \iff \begin{cases} g(x) \geq 0, \\ f(x) = g^2(x). \end{cases} \quad (7)$$

Пример 3. В соответствии с равносильностью (7) уравнение¹

$$\begin{aligned} \sqrt{x+1} = 1-x &\iff \begin{cases} 1-x \geq 0, \\ x+1 = (1-x)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} 1-x \geq 0, \\ x^2 - 3x = 0 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} x \leq 1, \\ x(x-3) = 0 \end{cases} \iff x = 0. \end{aligned}$$

Пример 4. Уравнение²

$$\begin{aligned} \sqrt{5-x} = x-3 &\iff \begin{cases} x-3 \geq 0, \\ 5-x = (x-3)^2 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} x-3 \geq 0, \\ x^2 - 5x + 4 = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x \geq 3, \\ (x-1)(x-4) = 0 \end{cases} \iff x = 4. \end{aligned}$$

Если сравнивать равносильности (6) и (7), то, на первый взгляд, равносильность (7) предпочтительнее равносильности (6). Ведь в системе равносильности (7) на одно неравенство меньше, чем в системе равносильности (6). Это так. Но в отдельных случаях равносильность (6) более эффективна, по сравнению с равносильностью (7), да и по сравнению с

¹Другие способы решения приведены в примерах 1 этого пункта, 1 и 9 из пункта 4.

²Другие способы решения приведены в примерах 2 этого пункта, 2 и 10 из пункта 4.

формальным методом решения уравнения (1). Подтверждением являются следующие примеры.

Пример 5. Решим уравнение¹

$$\sqrt{3x - x^2 - 2} = x^2 - 3x. \quad (8)$$

Из уравнения (8) следует система неравенств

$$\begin{cases} 3x - x^2 - 2 \geq 0, \\ x^2 - 3x \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 - 3x + 2 \leq 0, \\ x(x - 3) \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} (x - 1)(x - 2) \leq 0, \\ x(x - 3) \geq 0, \end{cases}$$




Рис. 1

которая не имеет решений, что устанавливаем с помощью числовой прямой, дважды используя метод числовых промежутков решения неравенств (рис. 1).

Значит, уравнение (8) решений не имеет.

Пример 6. Уравнение²

$$2\sqrt{2x^2 + 7x - 15} = 3 - x \iff \begin{cases} 3 - x \geq 0, \\ 4(2x^2 + 7x - 15) = (3 - x)^2 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x - 3 \leq 0, \\ 7x^2 + 34x - 69 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \leq 3, \\ x = \frac{-17 \pm 2\sqrt{193}}{7} \end{cases} \iff$$

$$\iff x = \frac{-17 \pm 2\sqrt{193}}{7}.$$

При этом учтено, что

$$-\frac{17 + 2\sqrt{193}}{7} < 0 < 3,$$

и

¹Другой способ решения приведен в примере 11 из пункта 4.

²Данное уравнение можно решать формальным методом (аналогично примерам 1 и 2). Однако проверка, необходимая в этом случае, будет затруднительной.

$$193 < 361 \iff \sqrt{193} < 19 \iff 2\sqrt{193} < 38 \iff \\ \iff -17 + 2\sqrt{193} < 21 \iff \frac{-17 + 2\sqrt{193}}{7} < 3.$$

Возможна ситуация, зафиксированная в следующем примере.

Пример 7. Решим уравнение

$$\sqrt{x^2 - 4x + 3} + \sqrt{-x^2 + 3x - 2} = \sqrt{x^2 - x}. \quad (9)$$

Выражение, расположенное в левой части уравнения (9), имеет смысл при

$$\begin{cases} x^2 - 4x + 3 \geq 0, \\ -x^2 + 3x - 2 \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} (x-1)(x-3) \geq 0, \\ (x-1)(x-2) \leq 0 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} \begin{cases} x-1 < 0, \\ x-3 \leq 0, \\ x-2 \geq 0, \end{cases} \\ x=1, \\ \begin{cases} x-1 > 0, \\ x-3 \geq 0, \\ x-2 \leq 0 \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} \begin{cases} x < 1, \\ x \leq 3, \\ x \geq 2, \end{cases} \\ x=1, \\ \begin{cases} x > 1, \\ x \geq 3, \\ x \leq 2 \end{cases} \end{cases} \iff x=1.$$

Если $x = 1$, то уравнение (9) обращается в верное равенство:

$$\sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 + 3} + \sqrt{-1^2 + 3 \cdot 1 - 2} = \sqrt{1^2 - 1}.$$

Значит, $x = 1$ — единственный корень уравнения (9).

Некоторые уравнения вида (1) решить с использованием проверки не представляется возможным. Например, когда множество решений уравнения (1) бесконечно.

Пример 8. Решим уравнение

$$\sqrt{|x^2 - 1| + 3x^2 - 1} = \sqrt{2}x. \quad (10)$$

Уравнение (10) равносильно системе

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x \geq 0, \\ |x^2 - 1| + 3x^2 - 1 = 2x^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 0, \\ |x^2 - 1| = 1 - x^2 \end{cases} \iff \\ \iff & \begin{cases} x \geq 0, \\ 1 - x^2 \geq 0, \\ 1 - x^2 = 1 - x^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 0, \\ 1 - x^2 \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 0, \\ x^2 \leq 1 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} x \geq 0, \\ |x| \leq 1 \end{cases} \iff 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

Множеством решений уравнения (10) является отрезок $[0; 1]$.

Таким образом, при решении уравнения (1) будем использовать равносильностные переходы (6) и (7):

$$\boxed{\sqrt{f(x)} = g(x) \iff \begin{cases} g(x) \geq 0, \\ f(x) = g^2(x) \end{cases} \iff \begin{cases} f(x) \geq 0, \\ g(x) \geq 0, \\ f(x) = g^2(x). \end{cases}}$$

2. Уравнение $\sqrt[2n]{f(x)} = g(x)$ при $n \in \mathbb{N}$

Уравнение с радикалом чётной степени

$$\sqrt[2n]{f(x)} = g(x), \quad n \in \mathbb{N}, \quad (1)$$

в случае, когда $n = 1$, является уравнением (1) из пункта 1. Уравнения (1) и (1) из пункта 1 решаются аналогичными методами.

Формальный метод решения предполагает сначала почленное возведение уравнения (1) в степень $2n$. В результате получаем уравнение

$$f(x) = g^{2n}(x), \quad n \in \mathbb{N}. \quad (2)$$

Затем из всего множества решений уравнения (2) выделяем те, которые являются решениями уравнения (1).

Пример 1. Решим уравнение

$$\sqrt[4]{2x^2 - 1} = x. \quad (3)$$

Почленным возведением в четвёртую степень иррациональное уравнение (3) приводим к биквадратному уравнению

$$x^4 - 2x^2 + 1 = 0 \iff (x^2 - 1)^2 = 0 \iff x^2 = 1 \iff \begin{cases} x = -1, \\ x = 1. \end{cases}$$

При $x = \pm 1$ выражение $\sqrt[4]{2x^2 - 1}$, расположенное в левой части уравнения (3), принимает значение: $\sqrt[4]{2(\pm 1)^2 - 1} = 1$.

Выражение x , расположенное в правой части уравнения (3), значение 1 принимает лишь в одном случае, когда переменная $x = 1$.

Поэтому решением уравнения (3) будет только число 1.

Уравнение (1) также можно решать с помощью следующих равносильностей:

$$\sqrt[2n]{f(x)} = g(x) \iff \begin{cases} g(x) \geq 0, \\ f(x) = g^{2n}(x) \end{cases} \iff \begin{cases} f(x) \geq 0, \\ g(x) \geq 0, \\ f(x) = g^{2n}(x). \end{cases}$$

Пример 2 (продолжение примера 1). Уравнение (3) равносильно системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} x \geq 0, \\ 2x^2 - 1 = x^4 \end{cases} &\iff \begin{cases} x \geq 0, \\ x^4 - 2x^2 + 1 = 0 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} x \geq 0, \\ (x^2 - 1)^2 = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x \geq 0, \\ x^2 = 1 \end{cases} \iff x = 1. \end{aligned}$$

Пример 3. Решим уравнение

$$\sqrt[2n]{f(x)} = f(x), \quad n \in \mathbb{N}. \quad (4)$$

Уравнение (4) имеет смысл, когда $f(x) \geq 0$, и при любом натуральном n равносильно уравнению

$$f(x) = f^{2n}(x) \iff f^{2n}(x) - f(x) = 0 \iff$$

$$\iff f(x)(f^{2n-1}(x) - 1) = 0 \iff \begin{cases} f(x) = 0, \\ f^{2n-1}(x) = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} f(x) = 0, \\ f(x) = 1. \end{cases}$$

Решениями уравнения (4) являются те значения переменной x , при которых $f(x) = 0$ или $f(x) = 1$.

Итак, при решении уравнения (4) используется равносильность

$$\boxed{2^n \sqrt[n]{f(x)} = f(x) \iff \begin{cases} f(x) = 0, \\ f(x) = 1 \end{cases} \text{ при } n \in \mathbb{N}.}$$

В частности, уравнение

$$\sqrt[12]{2x+3} = 2x+3 \iff \begin{cases} 2x+3 = 0, \\ 2x+3 = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -1,5, \\ x = -1. \end{cases}$$

Пример 4. Решим уравнение

$$2^n \sqrt[n]{f(x)} = -f(x), \quad n \in \mathbb{N}. \quad (5)$$

Уравнение (5) имеет смысл, когда $f(x) \geq 0$, и при любом натуральном n равносильно системе

$$\begin{cases} f(x) \geq 0, \\ -f(x) \geq 0, \\ f(x) = (-f(x))^{2n} \end{cases} \iff \begin{cases} f(x) = 0, \\ f(x) = f^{2n}(x) \end{cases} \iff f(x) = 0.$$

Решениями уравнения (5) являются нули функции f .

Итак, при решении уравнения (5) используется равносильность

$$\boxed{2^n \sqrt[n]{f(x)} = -f(x) \iff f(x) = 0 \text{ при } n \in \mathbb{N}.}$$

Например, уравнение

$$\sqrt[12]{2x+3} = -2x-3 \iff 2x+3=0 \iff x=-1,5.$$

Пример 5. Решим уравнение¹

$$\sqrt{x+5} + \sqrt[3]{4x-4} = 0. \quad (6)$$

Уравнение (6) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} \sqrt{x+5} = \sqrt[3]{4-4x} &\iff \begin{cases} \sqrt[3]{4-4x} \geq 0, \\ \sqrt[6]{(x+5)^3} = \sqrt[6]{(4-4x)^2} \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} 4-4x \geq 0, \\ (x+5)^3 = 16(x-1)^2 \end{cases} &\iff \begin{cases} x \leq 1, \\ x^3 - x^2 + 107x + 109 = 0 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} x \leq 1, \\ (x+1)(x^2 - 2x + 109) = 0 \end{cases} &\iff x = -1, \end{aligned}$$

так как у квадратного трёхчлена $x^2 - 2x + 109$ отрицательный дискриминант: $D = 4 - 4 \cdot 109 = -432 < 0$.

3. Уравнение ${}^{2n+1}\sqrt{f(x)} = g(x)$ при $n \in \mathbb{N}$

Уравнение с радикалом нечётной степени

$${}^{2n+1}\sqrt{f(x)} = g(x), \quad n \in \mathbb{N}, \quad (1)$$

имеет смысл при всех тех значениях переменной x , при которых определены выражения $f(x)$ и $g(x)$. Это следует из того, что корень нечётной степени извлекается из любого действительного числа.

Функция

$$y(x) = x^{2n+1} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

¹Другой способ решения приведён в примере 3 из пункта 4.

при любом фиксированном натуральном n является возрастающей с множеством значений $E(y) = \mathbb{R}$.

Значит, эта функция такая, что не только каждому фиксированному значению аргумента x соответствует одно значение функции, но и каждое значение эта функция принимает только один раз (является обратимой функцией). Поэтому при любом натуральном n имеет место равносильность

$$x_1^{2n+1} = x_2^{2n+1} \iff x_1 = x_2.$$

Тогда при любом натуральном n уравнение

$$\begin{aligned} 2n+1\sqrt{f(x)} = g(x) &\iff \left(2n+1\sqrt{f(x)} \right)^{2n+1} = g^{2n+1}(x) \iff \\ &\iff f(x) = g^{2n+1}(x). \end{aligned}$$

Таким образом, при решении уравнения (1) используется равносильный переход

$$\boxed{2n+1\sqrt{f(x)} = g(x) \iff f(x) = g^{2n+1}(x) \text{ при } n \in \mathbb{N}.}$$

Пример 1. Уравнение

$$\sqrt[5]{x^5 - x + 2} = x \iff x^5 - x + 2 = x^5 \iff -x + 2 = 0 \iff x = 2.$$

Пример 2. Уравнение

$$\sqrt{x \sqrt[3]{x}} = 3 \sqrt[3]{x}$$

имеет смысл при $x \geq 0$ и равносильно уравнению

$$\sqrt[3]{x^2} = 3 \sqrt[3]{x} \iff \sqrt[3]{x} (\sqrt[3]{x} - 3) = 0 \iff \begin{cases} \sqrt[3]{x} = 0, \\ \sqrt[3]{x} = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0, \\ x = 27. \end{cases}$$

Пример 3. Решим уравнение

$$2n+1\sqrt{f(x)} = f(x), \quad n \in \mathbb{N}. \tag{2}$$

Уравнение (2) при любом натуральном n равносильно уравнению

$$f(x) = f^{2n+1}(x) \iff f(x)(f^{2n}(x) - 1) = 0 \iff$$

$$\iff f(x)(f^n(x) + 1)(f^n(x) - 1) = 0 \iff \begin{cases} f(x) = -1, \\ f(x) = 0, \\ f(x) = 1. \end{cases}$$

Решениями уравнения (2) являются те значения переменной x , при которых $f(x) = 0$ или $f(x) = \pm 1$.

Итак, при решении уравнения (2) используется равносильность

$$\boxed{{}^{2n+1}\sqrt{f(x)} = f(x) \iff \begin{cases} f(x) = -1, \\ f(x) = 0, \\ f(x) = 1 \end{cases} \text{ при } n \in \mathbb{N}.}$$

Пример 4. Решим уравнение

$${}^{2n+1}\sqrt{f(x)} = -f(x), \quad n \in \mathbb{N}. \quad (3)$$

Уравнение (3) при любом натуральном n равносильно уравнению

$$f(x) = (-f(x))^{2n+1} \iff f^{2n+1}(x) + f(x) = 0 \iff$$

$$\iff f(x)(f^{2n}(x) + 1) = 0 \iff f(x) = 0.$$

Решениями уравнения (3) являются нули функции f .

Итак, при решении уравнения (3) используется равносильность

$$\boxed{{}^{2n+1}\sqrt{f(x)} = -f(x) \iff f(x) = 0 \text{ при } n \in \mathbb{N}.}$$

При решении уравнений с радикалами третьей степени

$$\sqrt[3]{f(x)} + \sqrt[3]{g(x)} = h(x) \quad (4)$$

используем формулу сокращённого умножения куба суммы

$$(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b).$$

В результате возведения в куб обеих частей уравнения (4) получим равносильное уравнение

$$f(x) + g(x) + 3\sqrt[3]{f(x)g(x)} (\sqrt[3]{f(x)} + \sqrt[3]{g(x)}) = h^3(x). \quad (5)$$

Сумма $\sqrt[3]{f(x)} + \sqrt[3]{g(x)}$ является левой частью уравнения (4). Подставим вместо неё $h(x)$, расположенное в правой части уравнения (4). Получим новое уравнение

$$f(x) + g(x) + 3\sqrt[3]{f(x)g(x)} h(x) = h^3(x). \quad (6)$$

В уравнении (6) легко освободиться от радикала, приведя его к равносильному уравнению

$$27f(x)g(x)h^3(x) = (h^3(x) - f(x) - g(x))^3. \quad (7)$$

Допустим, что уравнение (6) решено. Являются ли корни уравнения (6) корнями уравнения (4)?

Переход от уравнения (5) к уравнению (6) осуществлён при тех значениях переменной x , при которых сумма $\sqrt[3]{f(x)} + \sqrt[3]{g(x)}$ равна выражению $h(x)$. Уравнения (4) и (5) равносильны. Поэтому любой корень уравнения (4) будет корнем уравнения (6).

Не каждый корень уравнения (6) должен быть корнем уравнения (4). Это следует из того, что уравнение (6), рассматриваемое как самостоятельное уравнение, в своём задании не предполагает равенства (4). Уравнение (6) лишь получено с учётом уравнения (4). Поэтому уравнение (6) может иметь «посторонние» корни по отношению к уравнению (4).

Например, если $f(x) = g(x) = -1$, а $h(x) = 1$, то на основании уравнения (4) получаем неверное равенство:

$$\sqrt[3]{-1} + \sqrt[3]{-1} = 1,$$

а на основании уравнения (6) получаем верное равенство:

$$-1 + (-1) + 3\sqrt[3]{(-1)(-1)} \cdot 1 = 1^3.$$

Пример 5. Решим уравнение

$$\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{2x-1} = \sqrt[3]{x+1}. \quad (8)$$

Обе части уравнения (8) возведём в куб и получим равносильное уравнение

$$\begin{aligned} & (\sqrt[3]{x-1})^3 + 3(\sqrt[3]{x-1})^2 \cdot \sqrt[3]{2x-1} + \\ & + 3\sqrt[3]{x-1} \cdot (\sqrt[3]{2x-1})^2 + (\sqrt[3]{2x-1})^3 = x+1 \iff \\ \iff & 3\sqrt[3]{(x-1)(2x-1)} \cdot (\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{2x-1}) = 3-2x. \end{aligned}$$

Отсюда, учитывая уравнение (8), получаем новое уравнение

$$3\sqrt[3]{(x-1)(2x-1)} \cdot \sqrt[3]{x+1} = 3-2x. \quad (9)$$

Обе части уравнения (9) возведём в куб и получим равносильное уравнение

$$\begin{aligned} & 27(x-1)(2x-1)(x+1) = (3-2x)^3 \iff \\ \iff & 62x^3 - 63x^2 = 0 \iff x^2(62x-63) = 0 \iff \begin{cases} x = 0, \\ x = 1\frac{1}{62}. \end{cases} \end{aligned}$$

Переход от уравнения (8) к уравнению (9) осуществлён при тех значениях переменной x , при которых сумма $\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{2x-1}$ равна кубическому корню $\sqrt[3]{x+1}$. Поэтому любое решение уравнения (8) будет решением уравнения (9).

Однако не каждый корень уравнения (9) должен быть корнем уравнения (8). Это следует из того, что уравнение (9) в своём задании не предполагает равенства (8). Уравнение (9) лишь получено с учётом уравнения (8). Поэтому необходима проверка.

При $x = 0$ выражение $\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{2x-1}$, расположенное в левой части уравнения (8), принимает значение -2 . Выражение $\sqrt[3]{x+1}$, расположенное в правой части уравнения (8), при $x = 0$ принимает значение 1 . Ввиду того, что $-2 \neq 1$, число 0 не является корнем уравнения (8).

При $x = 1\frac{1}{62}$ выражение $\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{2x-1}$ принимает значение

$$\sqrt[3]{\frac{63}{62}} - 1 + \sqrt[3]{2 \cdot \frac{63}{62} - 1} = \frac{1}{\sqrt[3]{62}} + \sqrt[3]{\frac{64}{62}} = \frac{1}{\sqrt[3]{62}} + \frac{4}{\sqrt[3]{62}} = \frac{5}{\sqrt[3]{62}}.$$

Такое же значение принимает выражение $\sqrt[3]{x+1}$ при $x = 1\frac{1}{62}$:

$$\sqrt[3]{\frac{63}{62} + 1} = \sqrt[3]{\frac{125}{62}} = \frac{5}{\sqrt[3]{62}}.$$

Значит, $1\frac{1}{62}$ — корень уравнения (8).

4. Специальные методы

При решении уравнений с радикалами иногда удобно использовать свойства функции.

Рассмотрим возможность использования монотонности.

Теорема 1. Если $f(x_0) = a$, а функция f возрастает (убывает), то x_0 — единственный корень уравнения

$$f(x) = a.$$

Доказательство. Если функция f возрастает на числовом промежутке I , то для любых x_1 и x_2 , принадлежащих числовому промежутку I , из неравенства $x_1 < x_2$ следует, что

$$f(x_1) < f(x_2).$$

Тогда

$$f(x) < f(x_0) = a$$

при всех тех x из I , которые меньше x_0 ; а




Рис. 1

$$f(x) > f(x_0) = a$$

при всех $x > x_0$ и $x \in I$.

Значит, только при $x = x_0$ значение функции f равно a (рис. 1). А это соответствует тому, что уравнение

$$f(x) = a$$

имеет только одно решение, каковым будет число x_0 .

В случае убывания функции f на числовом промежутке I доказательство аналогично и основано на том, что для любых x_1 и x_2 , принадлежащих I , из неравенства $x_1 < x_2$ следует, что $f(x_1) > f(x_2)$. ■

К закономерности, выраженной в теореме 1, приводится

Теорема 2. Если $f(x_0) = g(x_0)$, функция f возрастает, а функция g убывает, то x_0 — единственный корень уравнения

$$f(x) = g(x).$$

Доказательство. Если функция f возрастает на числовом промежутке I , а функция g убывает на числовом промежутке I , то функция $h = f - g$ возрастает на числовом промежутке I . Кроме того,

$$h(x_0) = f(x_0) - g(x_0) = 0.$$

В соответствии с теоремой 1 число x_0 — единственный корень уравнения

$$h(x) = 0,$$

или, что то же, x_0 — единственный корень уравнения

$$f(x) = g(x). \blacksquare$$

Пример 1. Уравнение¹ (3) из пункта 1 равносильно уравнению

$$\sqrt{x+1} + x - 1 = 0.$$

Пусть

$$f(x) = \sqrt{x+1} \quad \forall x \in [-1; +\infty), \quad g(x) = x - 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Тогда уравнение (3) из пункта 1 будет иметь вид

$$h(x) = 0,$$

где

$$h(x) = f(x) + g(x) \quad \forall x \in [-1; +\infty).$$

Функция h является возрастающей как сумма $f + g$ двух возрастающих на числовом луче $[-1; +\infty)$ функций f и g .

Функция g возрастает на $[-1; +\infty)$, будучи сужением линейной функции с положительным угловым коэффициентом $k = 1$.

Функция f является сложной функцией

$$f(x) = s(\varphi(x))$$

с областью определения $D(f) = [-1; +\infty)$, у которой внутренняя функция

$$\varphi(x) = x + 1 \quad \forall x \in [-1; +\infty)$$

возрастает (как сужение на $[-1; +\infty)$ линейной функции $\xi(x) = x + 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ с положительным угловым коэффициентом $k = 1$) и внешняя функция

$$s(x) = \sqrt{x} \quad \forall x \in [0; +\infty)$$

возрастает. Поэтому f — возрастающая функция.

¹Другие способы решения даны в примерах 1 и 3 из пункта 1 и примере 9.

Значение $h(0) = 0$. Следовательно, число 0 является корнем уравнения $h(x) = 0$.

Других корней нет, так как у возрастающей функции, если есть нуль, то только один.

Уравнение (3) из пункта 1 имеет единственное решение $x = 0$.

Пример 2. Уравнение¹ (4) из пункта 1 равносильно уравнению

$$\sqrt{5-x} - (x-3) = 0.$$

Функция

$$f_1(x) = \sqrt{5-x} \quad \forall x \in (-\infty; 5]$$

убывает, а функция

$$f_2(x) = x - 3 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

возрастает.

Следовательно, функция

$$f(x) = f_1(x) - f_2(x) \quad \forall x \in (-\infty; 5]$$

убывает, как разность убывающей функции-уменьшаемого и возрастающей функции-вычитаемого.

В принятых обозначениях уравнение (4) из пункта 1 будет иметь вид

$$f(x) = 0.$$

Значение $f(4) = 0$.

Итак, $x = 4$ — решение уравнения (4) из пункта 1.

Других корней нет, так как убывающая функция, если имеет нуль, то только один.

Пример 3. Иррациональные функции²

$$f_1(x) = \sqrt{x+5} \quad \forall x \in [-5; +\infty) \quad \text{и} \quad f_2(x) = \sqrt[3]{4x-4} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

возрастают. Тогда функция

$$f(x) = f_1(x) + f_2(x) \quad \forall x \in [-5; +\infty)$$

¹Другие способы решения даны в примерах 2 и 4 из пункта 1 и примере 10.

²Другой способ решения дан в примере 5 из пункта 2.

возрастает, как сумма возрастающих функций на $[-5; +\infty)$.

В принятых обозначениях уравнение (6) из пункта 2 будет иметь вид

$$f(x) = 0.$$

Значение $f(-1) = 0$.

Итак, $x = -1$ — решение уравнения (6) из пункта 2.

Других корней нет, так как у возрастающей функции может быть не более одного нуля.

Рассмотрим возможность использования свойства ограниченности, а также наименьшего и наибольшего значений функции при решении уравнений с радикалами. Выделим две ситуации, которые сформулируем в виде следующих правил.

Правило 1. Пусть функция f при $x = a$ принимает наименьшее значение, равное A , и пусть функция g при $x = a$ принимает наибольшее значение, равное A . Тогда уравнение

$$f(x) = g(x)$$

имеет единственное решение $x = a$.

В соответствии с этим правилом достаточно доказать, что на множестве задания уравнения

$$f(x) = g(x)$$

имеют место оценки $f(x) \geq A$, $g(x) \leq A$, и найти такое значение a переменной x , что

$$f(a) = g(a) = A.$$

Правило 2. Пусть уравнение

$$f(x) = g(x)$$

имеет смысл на множестве D . Функции f и g таковы, что

$$f(x) \leq A < B \leq g(x) \quad \forall x \in D.$$

Тогда уравнение

$$f(x) = g(x)$$

решений не имеет.

Пример 4. Решим уравнение

$$\sqrt{3x^2 + 6x + 7} + \sqrt{5x^2 + 10x + 14} = 4 - 2x - x^2. \quad (1)$$

Выделив полные квадраты, уравнение (1) приведём к равносильному уравнению

$$\sqrt{3(x+1)^2 + 4} + \sqrt{5(x+1)^2 + 9} = 5 - (x+1)^2. \quad (2)$$

Заметим, что

$$\sqrt{3(x+1)^2 + 4} \geq 2 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad \sqrt{5(x+1)^2 + 9} \geq 3 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

и, следовательно, сумма

$$\sqrt{3(x+1)^2 + 4} + \sqrt{5(x+1)^2 + 9} \geq 5 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad (3)$$

а выражение, расположенное в правой части уравнения (2),

$$5 - (x+1)^2 \leq 5 \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (4)$$

При этом в каждом нестрогом неравенстве равенство возможно в единственном случае, когда $x+1=0$, т.е. $x=-1$.

Из неравенств (3) и (4) следует, что уравнение (2) обращается в верное равенство лишь при тех значениях x , при которых в (3) и (4) имеет место равенство. То есть при $x=-1$.

Следовательно, $x=-1$ является единственным корнем уравнения (2), а значит, и уравнения (1).

Пример 5. Решим уравнение

$$x^2 - 2 + \sqrt{x-2} = \sqrt{-x^2 + 6x - 8}. \quad (5)$$

Уравнение (5) имеет смысл при

$$\begin{cases} x - 2 \geq 0, \\ x^2 - 6x + 8 \leq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x - 2 \geq 0, \\ (x - 2)(x - 4) \leq 0 \end{cases} \iff 2 \leq x \leq 4.$$

Функции

$$s(x) = \sqrt{x-2} \quad \forall x \in [2; +\infty) \quad \text{и} \quad r(x) = x^2 - 2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

возрастают на отрезке $[2; 4]$.

Значит, возрастающей будет и функция-сумма

$$f(x) = s(x) + r(x) \quad \forall x \in [2; 4].$$

Из того, что $f(2) = 2$, следует оценка

$$f(x) \geq 2 \quad \forall x \in [2; 4].$$

Поскольку

$$-x^2 + 6x - 8 = -(x^2 - 6x + 9) + 1 = 1 - (x - 3)^2 \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

то функция

$$g(x) = \sqrt{-x^2 + 6x - 8} \leq 1 \quad \forall x \in [2; 4].$$

Итак,

$$g(x) \leq 1 < 2 \leq f(x) \quad \forall x \in [2; 4].$$

В принятых обозначениях уравнение (5) будет иметь вид

$$f(x) = g(x),$$

и, следовательно, у него нет решений.

При решении уравнений с радикалами весьма часто встречаются задачи, в которых используется

Правило 3. *Произведение двух выражений равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один из сомножителей равен нулю, при условии, что произведение имеет смысл.*

Руководствуясь этим правилом, устанавливаем следующую равносильность для уравнений с радикалом вида

$$g(x) \sqrt[2n]{f(x)} = 0 \iff \begin{cases} f(x) = 0, \\ x \in D(g), \\ f(x) > 0, \\ g(x) = 0 \end{cases} \text{ при } n \in \mathbb{N}.$$

Пример 6. Уравнение

$$(x^2 - 1) \sqrt[2n]{2x - 1} = 0$$

при любом натуральном n равносильно совокупности

$$\begin{cases} 2x - 1 = 0, \\ \begin{cases} 2x - 1 > 0, \\ x^2 - 1 = 0 \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0,5, \\ \begin{cases} x > 0,5, \\ |x| = 1 \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0,5, \\ x = 1. \end{cases}$$

Пример 7. Уравнение

$$\sqrt[3]{x-2} - \sqrt{x-1} = -1 \iff \sqrt[3]{x-2} = \sqrt{x-1} - 1.$$

Возведением в куб получим равносильное уравнение

$$\begin{aligned} x - 2 &= (\sqrt{x-1} - 1)^3 \iff (x + 2) \sqrt{x-1} - 4(x - 1) = 0 \iff \\ &\iff \sqrt{x-1} (x + 2 - 4\sqrt{x-1}) = 0. \end{aligned}$$

В соответствии с правилом 3 уравнение равносильно совокупности двух уравнений:

$$\begin{aligned} \sqrt{x-1} = 0 &\iff x - 1 = 0 \iff x = 1; \\ 4\sqrt{x-1} = x + 2 &\iff \begin{cases} x + 2 \geq 0, \\ 16(x - 1) = (x + 2)^2 \end{cases} \iff \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2, \\ (x-2)(x-10) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2, \\ x = 10. \end{cases}$$

Множество решений $\{1, 2, 10\}$.

Пример 8. В соответствии с правилом 3 уравнение

$$\sqrt{x^2 - 4x + 3} \cdot \sqrt{-x^2 + 6x - 8} = 0$$

равносильно совокупности двух систем:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x^2 - 4x + 3 = 0, \\ -x^2 + 6x - 8 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 4x + 3 = 0, \\ x^2 - 6x + 8 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} (x-1)(x-3) = 0, \\ (x-2)(x-4) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x = 1, \\ (x-2)(x-4) \leq 0, \end{cases} \\ \begin{cases} x = 3, \\ (x-2)(x-4) \leq 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow x = 3; \\ & \begin{cases} -x^2 + 6x - 8 = 0, \\ x^2 - 4x + 3 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 6x + 8 = 0, \\ x^2 - 4x + 3 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} (x-2)(x-4) = 0, \\ (x-1)(x-3) \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x = 2, \\ (x-1)(x-3) \geq 0, \end{cases} \\ \begin{cases} x = 4, \\ (x-1)(x-3) \geq 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow x = 4. \end{aligned}$$

Множество решений $\{3; 4\}$.

Широко распространён метод подстановки (замены переменной) при решении уравнений с радикалами. Например, уравнение

$$a \cdot \sqrt{f(x)} + b \cdot f(x) = c$$

подстановкой

$$\sqrt{f(x)} = z$$

приводится к квадратному уравнению

$$bz^2 + az - c = 0,$$

которое надо решить при $z \geq 0$.

Пример 9. Уравнение¹ (3) из пункта 1 равносильно уравнению

$$\sqrt{x+1} + x - 1 = 0 \iff (x+1) + \sqrt{x+1} - 2 = 0.$$

Подстановкой

$$\sqrt{x+1} = z$$

уравнение приводим к квадратному уравнению

$$z^2 + z - 2 = 0 \iff (z+2)(z-1) = 0, \quad (6)$$

у которого один неотрицательный корень — число 1. Тогда

$$\sqrt{x+1} = 1 \iff x+1 = 1 \iff x = 0.$$

Множеством решений уравнения (3) из пункта 1 является одноэлементное множество $\{0\}$.

Пример 10. Уравнение² (4) из пункта 1 подстановкой

$$\sqrt{5-x} = z,$$

при которой

$$5-x = z^2 \iff x = 5 - z^2,$$

приводим к квадратному уравнению (6), имеющему один неотрицательный корень — число 1.

Тогда уравнение (4) пункта 1 равносильно уравнению

$$\sqrt{5-x} = 1 \iff 5-x = 1 \iff x = 4.$$

¹Другие способы решения даны в примерах 1 и 3 из пункта 1 и примере 1.

²Другие способы решения даны в примерах 2 и 4 из пункта 1 и примере 2.

Пример 11. Уравнение¹ (8) из пункта 1 равносильно уравнению

$$(3x - x^2 - 2) + \sqrt{3x - x^2 - 2} + 2 = 0.$$

Подстановкой

$$\sqrt{3x - x^2 - 2} = z$$

уравнение приводим к квадратному уравнению

$$z^2 + z + 2 = 0,$$

у которого отрицательный дискриминант $D = 1 - 8 = -7$, а значит, оно не имеет корней.

Следовательно, уравнение (8) из пункта 1 решений не имеет.

Пример 12. Решим уравнение

$$\sqrt{2x^2 - 5x + 12} + 2x^2 = 5x. \quad (7)$$

Способ 1. Уравнение (7) равносильно уравнению

$$\sqrt{2x^2 - 5x + 12} = 5x - 2x^2.$$

Полагая $2x^2 - 5x = t$, получаем уравнение

$$\begin{aligned} \sqrt{t+12} = -t &\iff \begin{cases} t \leq 0, \\ t+12 = (-t)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} t \leq 0, \\ t^2 - t - 12 = 0 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} t \leq 0, \\ (t+3)(t-4) = 0 \end{cases} \iff t = -3. \end{aligned}$$

Тогда уравнение (7) равносильно квадратному уравнению

$$2x^2 - 5x + 3 = 0 \iff (x-1)(2x-3) = 0 \iff \begin{cases} x = 1, \\ x = 1,5. \end{cases}$$

Способ 2. Уравнение (7) равносильно уравнению

$$(2x^2 - 5x + 12) + \sqrt{2x^2 - 5x + 12} - 12 = 0.$$

¹Другой способ решения приведён в примере 5 из пункта 1.

Пусть $\sqrt{2x^2 - 5x + 12} = u$. Тогда уравнение (7) равносильно квадратному уравнению

$$u^2 + u - 12 = 0 \iff (u + 4)(u - 3) = 0,$$

неотрицательным корнем которого является число 3.

Следовательно, уравнение (7) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} \sqrt{2x^2 - 5x + 12} = 3 &\iff 2x^2 - 5x + 12 = 9 \iff \\ \iff 2x^2 - 5x + 3 = 0 &\iff (x - 1)(2x - 3) = 0 \iff \begin{cases} x = 1, \\ x = 1,5. \end{cases} \end{aligned}$$

5. Задачи

Задача 1. Решите уравнение

$$1 + \sqrt{1 + 4x - x^2} = x. \tag{1}$$

Решение. Способ 1. Уравнение (1) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} \sqrt{1 + 4x - x^2} = x - 1 &\iff \begin{cases} x - 1 \geq 0, \\ 1 + 4x - x^2 = (x - 1)^2 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} x - 1 \geq 0, \\ x^2 - 3x = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x \geq 1, \\ x(x - 3) = 0 \end{cases} \iff x = 3. \end{aligned}$$

Способ 2. Уравнение (1) равносильно уравнению

$$\sqrt{1 + 4x - x^2} = x - 1.$$

Возведём в квадрат левую и правую части этого уравнения:

$$1 + 4x - x^2 = (x - 1)^2 \iff x(x - 3) = 0 \iff \begin{cases} x = 0, \\ x = 3. \end{cases}$$

При $x = 0$ выражение $1 + \sqrt{1 + 4x - x^2}$, расположенное в левой части уравнения (1), принимает значение 2; а выражение x , расположенное в правой части уравнения (1), принимает значение 0.

Следовательно, $x = 0$ не является решением уравнения (1).

В случае, когда $x = 3$, уравнение (1) обращается в верное равенство: $1 + \sqrt{1 + 12 - 9} = 3$.

Значит, $x = 3$ — решение уравнения (1). *Ответ:* {3}.

Задача 2. Решите уравнение:

а) $\sqrt{2x-1} = x$; б) $x-1 = \sqrt{x+5}$; в) $\sqrt{2x+7} - 2 = x$;

г) $2\sqrt{1-x^2} = x-2$; д) $\sqrt{8x^2-40x+50} = 7-3x$;

е) $\sqrt{3x^2-25x+51} = 7-2x$.

Ответ: а) {1}; б) {4}; в) {1}; г) \emptyset ; д) $\{1-\sqrt{2}\}$; е) $\left\{\frac{3-\sqrt{17}}{2}\right\}$.

Задача 3. Решите уравнение

$$\sqrt[3]{x+5} = \sqrt{x+1}. \quad (2)$$

Решение. Уравнение (2) равносильно системе

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x+5 \geq 0, \\ (\sqrt[3]{x+5})^6 = (\sqrt{x+1})^6 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq -5, \\ (x+5)^2 = (x+1)^3 \end{cases} \iff \\ \iff & \begin{cases} x \geq -5, \\ x^3 + 2x^2 - 7x - 24 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq -5, \\ (x-3)(x^2 + 5x + 8) = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Так как у квадратного трёхчлена $x^2 + 5x + 8$ дискриминант $D = 25 - 32 = -7 < 0$, то уравнение (2) равносильно системе

$$\begin{cases} x \geq -5, \\ x-3 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq -5, \\ x = 3 \end{cases} \iff x = 3. \quad \text{Ответ: } \{3\}.$$

Задача 4. Решите уравнение

$$\sqrt{x^2 - 1\frac{1}{3}} - \sqrt[3]{x^3 - 2x} = 0. \quad \text{Ответ: } \left\{-1\frac{1}{3}\right\}.$$

Задача 5. Решите уравнение

$$x - 4 = \sqrt{21 - 4x}. \quad (3)$$

Решение. Способ 1. Уравнение (3) равносильно системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} x - 4 \geq 0, \\ (x - 4)^2 = 21 - 4x \end{cases} &\iff \begin{cases} x - 4 \geq 0, \\ x^2 - 4x - 5 = 0 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} x - 4 \geq 0, \\ (x + 1)(x - 5) = 0 \end{cases} \iff x = 5. \end{aligned}$$

Способ 2. Функция

$$f_1(x) = \sqrt{21 - 4x} \quad \forall x \in (-\infty; 5,25]$$

убывает, а функция

$$f_2(x) = x - 4 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

возрастает.

Следовательно, функция

$$f(x) = f_1(x) - f_2(x) \quad \forall x \in (-\infty; 5,25]$$

убывает, как разность убывающей и возрастающей функций.

В принятых обозначениях уравнение (3) будет иметь вид

$$f_2(x) = f_1(x)$$

и равносильно уравнению

$$f(x) = 0.$$

Значение $f(5) = 0$.

Итак, $x = 5$ — решение уравнения (3). Других корней нет, так как убывающая функция, если имеет нуль, то только один.

Способ 3. Уравнение (3) равносильно уравнению

$$4x - 16 = 4\sqrt{21 - 4x} \iff (21 - 4x) + 4\sqrt{21 - 4x} - 5 = 0.$$

Пусть $\sqrt{21 - 4x} = t$. Тогда получаем квадратное уравнение

$$t^2 + 4t - 5 = 0 \iff (t + 5)(t - 1) = 0,$$

имеющее один неотрицательный корень — число 1.

Следовательно, уравнение (3) равносильно уравнению

$$\sqrt{21 - 4x} = 1 \iff 21 - 4x = 1 \iff x = 5. \quad \text{Ответ: } \{5\}.$$

Задача 6. Решите уравнение:

а) $\sqrt{-3x + 3} - x = -1$; б) $\sqrt{1 + 3x} = 1 - x$; в) $\sqrt{x - 1} - 3 = -x$.

Ответ: а) $\{1\}$; б) $\{0\}$; в) $\{2\}$.

Задача 7. Решите уравнение

$$x\sqrt{(6-x)^2+4} + (x-6)\sqrt{x^2+4} = 0. \quad (4)$$

Решение. Способ 1. Уравнение (4) равносильно уравнению

$$x\sqrt{(6-x)^2+4} = (6-x)\sqrt{x^2+4}. \quad (5)$$

Возведём обе части уравнения (5) в квадрат:

$$\begin{aligned} x^2((6-x)^2+4) &= (6-x)^2(x^2+4) \iff \\ \iff x^2(6-x)^2 + 4x^2 &= (6-x)^2x^2 + 4(6-x)^2 \iff \\ \iff x^2 - (6-x)^2 = 0 &\iff (x-6+x)(x+6-x) = 0 \iff x = 3. \end{aligned}$$

Число 3 является корнем уравнения (4), так как

$$3\sqrt{(6-3)^2+4} + (3-6)\sqrt{3^2+4} = 3\sqrt{13} - 3\sqrt{13} = 0.$$

Способ 2. Уравнение (4) равносильно уравнению (5).

При любом фиксированном действительном x выражения x и $6-x$ таковы, что выполняется одна из трёх возможностей:

$$x(6-x) < 0, \quad \text{или} \quad x(6-x) = 0, \quad \text{или} \quad x(6-x) > 0.$$

Поскольку $\sqrt{(6-x)^2+4} > 0$ и $\sqrt{x^2+4} > 0$ при любом x , то для уравнения (5) случай $x(6-x) < 0$ невозможен.

Значит, уравнение (5) равносильно совокупности двух систем:

$$\begin{cases} x(6-x) = 0, \\ x\sqrt{(6-x)^2+4} = (6-x)\sqrt{x^2+4}, \end{cases}$$

у которой нет решений, так как при $x = 0$ и при $x = 6$ второе уравнение этой системы обращается в неверное равенство $0 = 12$;

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x(6-x) > 0, \\ x\sqrt{(6-x)^2+4} = (6-x)\sqrt{x^2+4} \end{cases} \iff \\ \iff & \begin{cases} x(6-x) > 0, \\ x^2((6-x)^2+4) = (6-x)^2(x^2+4) \end{cases} \iff \\ \iff & \begin{cases} x(6-x) > 0, \\ x^2(6-x)^2 + 4x^2 = x^2(6-x)^2 + 4(6-x)^2 \end{cases} \iff \\ \iff & \begin{cases} x(6-x) > 0, \\ x^2 - (6-x)^2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x(6-x) > 0, \\ (x-6+x)(x+6-x) = 0 \end{cases} \iff \\ \iff & \begin{cases} x(6-x) > 0, \\ x-3 = 0 \end{cases} \iff x = 3. \quad \text{Ответ: } \{3\}. \end{aligned}$$

Задача 8. Решите уравнение

$$\sqrt{x^2+4} + \sqrt{x^2+1} = \sqrt{2x^2+9}. \quad (6)$$

Решение. Уравнение (6) имеет смысл при любом действительном x , а в его левой и правой частях расположены положительные выражения. Поэтому уравнение (6) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} (\sqrt{x^2+4} + \sqrt{x^2+1})^2 = 2x^2+9 & \iff \sqrt{(x^2+4)(x^2+1)} = 2 \iff \\ \iff (x^2+4)(x^2+1) = 4 & \iff x^2(x^2+5) = 0 \iff x = 0. \end{aligned}$$

Ответ: $\{0\}$.

Задача 9. Решите уравнение

$$\sqrt{x+1} = \sqrt{3x+12} - \sqrt{4x+13}. \quad (7)$$

Решение. Уравнение (7) приведём к виду

$$\sqrt{x+1} + \sqrt{4x+13} = \sqrt{3x+12},$$

добиваясь тем самым, чтобы в обеих частях уравнения были расположены неотрицательные выражения при условии их существования. Тогда уравнение (7) равносильно системе уравнений

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x+1 \geq 0, \\ 4x+13 \geq 0, \\ x+1 + 2\sqrt{(x+1)(4x+13)} + 4x+13 = 3x+12 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} x+1 \geq 0, \\ 4(x+1) + 9 \geq 0, \\ \sqrt{(x+1)(4x+13)} = -(x+1) \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} x+1 \geq 0, \\ x+1 \leq 0, \\ (x+1)(4x+13) = (x+1)^2 \end{cases} \iff x+1=0 \iff x=-1. \end{aligned}$$

Ответ: $\{-1\}$.

Задача 10. Решите уравнение

$$\sqrt{2x+3} + \sqrt{3x} = 3\sqrt{x+1}. \quad \text{Ответ: } \{3\}.$$

Задача 11. Решите уравнение

$$\sqrt{2x+5} + \sqrt{x-1} = 8. \quad (8)$$

Решение. Способ 1. Заметим, что $x=10$ является корнем уравнения (8):

$$\sqrt{2 \cdot 10 + 5} + \sqrt{10 - 1} = \sqrt{25} + \sqrt{9} = 5 + 3 = 8.$$

Докажем, что других корней у уравнения (8) нет.

Так как иррациональные функции

$$f_1(x) = \sqrt{2x+5} \quad \forall x \in [-2,5; +\infty)$$

и

$$f_2(x) = \sqrt{x-1} \quad \forall x \in [1; +\infty)$$

возрастают, то функция

$$f(x) = f_1(x) + f_2(x) \quad \forall x \in [1; +\infty)$$

возрастает, как сумма возрастающих функций.

Значение $f(10) = \sqrt{25} + \sqrt{9} = 8$.

Итак, $x = 10$ — решение уравнения

$$f(x) = 8,$$

которое соответствует уравнению (8).

Других корней нет, так как графики функций, возрастающей f и постоянной

$$\varphi(x) = 8 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

если пересекаются, то только в одной точке.

Способ 2. Уравнение (8) равносильно системе

$$\begin{cases} 2x + 5 \geq 0, \\ x - 1 \geq 0, \\ 2x + 5 + 2\sqrt{(2x+5)(x-1)} + x - 1 = 64 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x \geq 1, \\ 2\sqrt{(2x+5)(x-1)} = -3(x-20) \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x \geq 1, \\ x - 20 \leq 0, \\ 4(2x+5)(x-1) = 9(x-20)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} 1 \leq x \leq 20, \\ x^2 - 372x + 3620 = 0 \end{cases} \iff$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq x \leq 20, \\ (x-10)(x-362) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 10. \quad \text{Ответ: } \{10\}.$$

Задача 12. Решите уравнение:

а) $\sqrt{x-2} + \sqrt{x-1} = 1$; б) $\sqrt{x+5} + \sqrt{2x+8} = 7$;

в) $\sqrt{2x-3} + \sqrt{4x+1} = 4$; г) $2\sqrt{x-1} + \sqrt{x+3} = 2$.

Ответ: а) {2}; б) {4}; в) {2}; г) {1}.

Задача 13. Решите уравнение

$$\sqrt{3x+1} - \sqrt{x+4} = 1. \quad (9)$$

Решение. Уравнение (9) приведём к виду

$$\sqrt{3x+1} = 1 + \sqrt{x+4},$$

добываясь тем самым, чтобы в обеих частях уравнения были расположены неотрицательные выражения при условии их существования.

Это уравнение равносильно уравнению

$$3x+1 = (1 + \sqrt{x+4})^2 \Leftrightarrow 3x+1 = 1 + 2\sqrt{x+4} + x + 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x+4} = x-2 \Leftrightarrow \begin{cases} x-2 \geq 0, \\ x+4 = (x-2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2, \\ x(x-5) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 5. \quad \text{Ответ: } \{5\}.$$

Задача 14. Решите уравнение:

а) $\sqrt{x+2} - \sqrt{x-6} = 2$; б) $\sqrt{x-3} - \sqrt{x+1} + 2 = 0$.

Ответ: а) {7}; б) {3}.

Задача 15. Решите уравнение

$$\sqrt{x+3} - \sqrt{7-x} = 2. \quad (10)$$

Решение. Способ 1. Уравнение (10) приведём к виду

$$\sqrt{x+3} = 2 + \sqrt{7-x},$$

добиваясь тем самым, чтобы в обеих частях уравнения были расположены неотрицательные выражения при условии их существования.

Это уравнение равносильно уравнению

$$x+3 = (2 + \sqrt{7-x})^2 \iff x+3 = 4 + 4\sqrt{7-x} + 7-x \iff$$

$$\iff 2\sqrt{7-x} = x-4 \iff \begin{cases} x-4 \geq 0, \\ 4(7-x) = (x-4)^2 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x \geq 4, \\ (x+2)(x-6) = 0 \end{cases} \iff x = 6.$$

Способ 2. Функция

$$f_1(x) = \sqrt{x+3} \quad \forall x \in [-3; +\infty)$$

возрастает, а функция

$$f_2(x) = \sqrt{7-x} \quad \forall x \in (-\infty; 7]$$

убывает.

Следовательно, функция

$$f(x) = f_1(x) - f_2(x) \quad \forall x \in [-3; 7]$$

возрастает, как разность возрастающей функции-уменьшаемого и убывающей функции-вычитаемого.

В принятых обозначениях уравнение (10) будет иметь вид

$$f(x) = 2.$$

Значение $f(6) = 2$.

Следовательно, $x = 6$ — решение уравнения (10). Других корней нет, так как графики возрастающей функции и постоянной функции (в данном случае $c(x) = 2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$), если пересекаются, то только в одной точке.

Ответ: $\{6\}$.

Задача 16. Решите уравнение

$$\sqrt{3x} - \sqrt{10 - x^2} = 0. \quad (11)$$

Решение. Способ 1. Уравнение (11) равносильно уравнению, у которого в левой и правой частях расположены неотрицательные выражения при условии их существования,

$$\begin{aligned} \sqrt{3x} = \sqrt{10 - x^2} &\iff \begin{cases} 3x \geq 0, \\ 3x = 10 - x^2 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} x \geq 0, \\ (x + 5)(x - 2) = 0 \end{cases} \iff x = 2. \end{aligned}$$

Способ 2. Непосредственно подстановкой убеждаемся, что $x = 2$ является корнем уравнения (11).

Докажем, что других корней у уравнения (11) нет.

Уравнение (11) определено на отрезке $[0; \sqrt{10}]$, так как

$$\begin{cases} x \geq 0, \\ 10 - x^2 \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 0, \\ |x| \leq \sqrt{10} \end{cases} \iff 0 \leq x \leq \sqrt{10}.$$

Функции

$$f_1(x) = \sqrt{3x} \quad \text{и} \quad f_2(x) = \sqrt{10 - x^2} \quad \forall x \in [0; \sqrt{10}]$$

таковы, что f_1 — возрастающая, а f_2 — убывающая.

Тогда функция-разность

$$f(x) = f_1(x) - f_2(x) \quad \forall x \in [0; \sqrt{10}]$$

является возрастающей.

Значение $f(2) = 0$.

Следовательно, $x = 2$ является корнем уравнения

$$f(x) = 0,$$

которое соответствует уравнению (11).

Это единственное решение, так как возрастающая функция имеет не более одного нуля.

Ответ: $\{2\}$.

Задача 17. Решите уравнение

$$\sqrt{3x} = \sqrt{4 - x^2}. \quad \text{Ответ: } \{1\}.$$

Задача 18. Решите уравнение

$$\sqrt{x^2 + x - 2} + \sqrt{x^3 - 2x^2 - 5x + 6} = 0. \quad (12)$$

Решение. Сумма двух неотрицательных выражений равна нулю тогда и только тогда, когда оба слагаемых равны нулю. Поэтому уравнение (12) равносильно системе

$$\begin{cases} \sqrt{x^2 + x - 2} = 0, \\ \sqrt{x^3 - 2x^2 - 5x + 6} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 + x - 2 = 0, \\ x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x^2 + x - 2 = 0, \\ (x - 3)(x^2 + x - 2) = 0 \end{cases} \iff x^2 + x - 2 = 0 \iff$$

$$\iff (x + 2)(x - 1) = 0 \iff \begin{cases} x = -2, \\ x = 1. \end{cases} \quad \text{Ответ: } \{-2; 1\}.$$

Задача 19. Решите уравнение

$$(16 - x^2)\sqrt{3 - x} = 0. \quad (13)$$

Решение. Левая часть уравнения (13) представляет произведение двух выражений. Данное произведение равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один из входящих в него сомножителей равен нулю, а остальные при этом имеют смысл. Следовательно, уравнение (13) выполняется в двух случаях:

$$\begin{cases} 16 - x^2 = 0, \\ 3 - x \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} (x + 4)(x - 4) = 0, \\ x \leq 3 \end{cases} \iff \begin{cases} \begin{cases} x = -4, \\ x = 4, \end{cases} \\ x \leq 3 \end{cases} \iff x = -4;$$

$$3 - x = 0 \iff x = 3.$$

Значит, $x = -4$ и $x = 3$ — корни уравнения (13).

Ответ: $\{-4; 3\}$.

Задача 20. Решите уравнение

$$(x^2 - 1)\sqrt{2x - 1} = 0. \quad \text{Ответ: } \{0, 5; 1\}.$$

Задача 21. Решите уравнение

$$\frac{x + 3}{\sqrt{x}} = 4. \quad (14)$$

Решение. Уравнение (14) имеет смысл при $x > 0$ и равносильно уравнению

$$\begin{aligned} x + 3 = 4\sqrt{x} &\iff (\sqrt{x})^2 - 4\sqrt{x} + 3 = 0 \iff \\ \iff (\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} - 3) = 0 &\iff \begin{cases} \sqrt{x} = 1, \\ \sqrt{x} = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1, \\ x = 9. \end{cases} \end{aligned}$$

Ответ: $\{1; 9\}$.

Задача 22. Решите уравнение

$$2x\sqrt{x} + \sqrt[4]{x^3} - 1 = 0. \quad (15)$$

Решение. Уравнение (15) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} 2(\sqrt[4]{x^3})^2 + \sqrt[4]{x^3} - 1 = 0 &\iff (\sqrt[4]{x^3} + 1)(2\sqrt[4]{x^3} - 1) = 0 \iff \\ \iff 2\sqrt[4]{x^3} - 1 = 0 &\iff x = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{4}{3}} \iff x = \frac{\sqrt[3]{4}}{4}. \quad \text{Ответ: } \left\{\frac{\sqrt[3]{4}}{4}\right\}. \end{aligned}$$

Задача 23. Решите уравнение

$$\frac{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x}}{\sqrt{x} - \sqrt[4]{x}} = 3.$$

Решение. Уравнение

$$\frac{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x}}{\sqrt{x} - \sqrt[4]{x}} = 3 \iff \frac{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x} - 3\sqrt{x} + 3\sqrt[4]{x}}{\sqrt{x} - \sqrt[4]{x}} = 0 \iff$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{x} - 2 \sqrt[4]{x}}{\sqrt[4]{x}(\sqrt[4]{x} - 1)} = 0 \Leftrightarrow \frac{\sqrt[4]{x}(\sqrt[4]{x} - 2)}{\sqrt[4]{x}(\sqrt[4]{x} - 1)} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sqrt[4]{x} - 2 = 0 \Leftrightarrow \sqrt[4]{x} = 2 \Leftrightarrow x = 2^4 \Leftrightarrow x = 16.$$

Ответ: {16}.

Задача 24. Решите уравнение

$$\frac{\sqrt{6-x-x^2}}{2x-5} = \frac{\sqrt{6-x-x^2}}{x-2}. \quad (16)$$

Решение. Уравнение (16) равносильно уравнению

$$\frac{\sqrt{6-x-x^2}}{2x-5} - \frac{\sqrt{6-x-x^2}}{x-2} = 0 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{6-x-x^2}(3-x)}{(x-2)(2x-5)} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{(2-x)(x+3)}(3-x)}{(x-2)(x-2,5)} = 0 \Leftrightarrow x = -3. \quad \text{Ответ: } \{-3\}.$$

Задача 25. Решите уравнение

$$\sqrt{2-|x|} = x. \quad (17)$$

Решение. Уравнение (17) равносильно системе

$$\begin{cases} x \geq 0, \\ 2 - |x| = x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0, \\ 2 - x = x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0, \\ (x+2)(x-1) = 0, \end{cases}$$

а значит, $x = 1$. Ответ: {1}.

Задача 26. Решите уравнение

$$\sqrt{2-x^2} = |x| - 1. \quad (18)$$

Решение. С учётом того, что

$$x^2 = |x|^2 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

уравнение (18) равносильно системе

$$\begin{aligned} & \begin{cases} |x| - 1 \geq 0, \\ 2 - |x|^2 = (|x| - 1)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} |x| \geq 1, \\ 2|x|^2 - 2|x| - 1 = 0 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} |x| \geq 1, \\ \left(|x| - \frac{1 + \sqrt{3}}{2}\right) \left(|x| - \frac{1 - \sqrt{3}}{2}\right) = 0 \end{cases} \iff |x| = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}, \end{aligned}$$

а значит, $x = \pm \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$. Ответ: $\left\{ \pm \frac{1 + \sqrt{3}}{2} \right\}$.

Задача 27. Решите уравнение

$$\sqrt{|x^2 - 1| + 1} = x. \quad (19)$$

Решение. Левая часть уравнения (19) при любом x больше нуля, поэтому $x > 0$. Уравнение (19) равносильно системе

$$\begin{cases} x > 0, \\ |x^2 - 1| + 1 = x^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 0, \\ |x^2 - 1| = x^2 - 1. \end{cases}$$

Используя формулу

$$|f(x)| = f(x) \iff f(x) \geq 0,$$

получаем систему:

$$\begin{cases} x > 0, \\ x^2 - 1 \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 0, \\ x^2 \geq 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 0, \\ |x| \geq 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 0, \\ x \geq 1 \end{cases} \iff x \geq 1.$$

Ответ: $[1; +\infty)$.

Задача 28. Решите уравнение

$$x^2 = \sqrt{4x^2 - 4x + 1} + 3. \quad (20)$$

Решение. Поскольку $4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2$, то уравнение (20) равносильно уравнению

$$x^2 = \sqrt{(2x - 1)^2} + 3 \iff x^2 = |2x - 1| + 3 \iff |2x - 1| = x^2 - 3.$$

На основании равносильностного перехода

$$|f(x)| = g(x) \iff \begin{cases} g(x) \geq 0, \\ \begin{cases} f(x) = -g(x), \\ f(x) = g(x) \end{cases} \end{cases}$$

получаем, что уравнение (20) равносильно системе

$$\begin{cases} x^2 - 3 \geq 0, \\ \begin{cases} 2x - 1 = -(x^2 - 3), \\ 2x - 1 = x^2 - 3 \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 \geq 3, \\ \begin{cases} x^2 + 2x - 4 = 0, \\ x^2 - 2x - 2 = 0 \end{cases} \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} |x| \geq \sqrt{3}, \\ \begin{cases} (x - 1 + \sqrt{3})(x - 1 - \sqrt{3}) = 0, \\ (x + 1 + \sqrt{5})(x + 1 - \sqrt{5}) = 0 \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1 + \sqrt{3}, \\ x = -1 - \sqrt{5}, \end{cases}$$

так как

$$|1 - \sqrt{3}| = \sqrt{3} - 1 < \sqrt{3}, \quad |-1 + \sqrt{5}| = \sqrt{5} - 1 < \sqrt{3},$$

ибо

$$1 < 2\sqrt{3} \iff 5 < 3 + 2\sqrt{3} + 1 \iff \sqrt{5} < \sqrt{3} + 1 \iff \sqrt{5} - 1 < \sqrt{3}.$$

Ответ: $\{-1 - \sqrt{5}, 1 + \sqrt{3}\}$.

Задача 29. Решите уравнение

$$\sqrt{7 - \sqrt{x^2 - 4x + 4}} = x - 3. \quad (21)$$

Решение. Так как

$$\sqrt{x^2 - 4x + 4} = \sqrt{(x - 2)^2} = |x - 2| \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

то уравнение (21) равносильно уравнению

$$\sqrt{7 - |x - 2|} = x - 3 \iff \begin{cases} x - 3 \geq 0, \\ 7 - |x - 2| = (x - 3)^2. \end{cases}$$

Поскольку при $x - 3 \geq 0$ разность $x - 2 = (x - 3) + 1 > 0$, то модуль $|x - 2| = x - 2$, а уравнение (21) равносильно системе

$$\begin{cases} x \geq 3, \\ 7 - (x - 2) = (x - 3)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 3, \\ x(x - 5) = 0 \end{cases} \iff x = 5.$$

Ответ: {5}.

Задача 30. Решите уравнение:

а) $2 + \sqrt{3 - \sqrt{x^2 - 2x + 1}} = x$; б) $x + \sqrt{3 - \sqrt{x^2 - 6x + 9}} = 2$;

в) $\sqrt{6 - \sqrt{x^2 + 4x + 4}} - x = 2$.

Ответ: а) {3}; б) {1}; в) {0}.

Задача 31. Решите уравнение

$$x + \sqrt{7 + \sqrt{x^2 - 6x + 9}} = 4.$$

Решение. Так как

$$\sqrt{x^2 - 6x + 9} = \sqrt{(x - 3)^2} = |x - 3|,$$

то

$$\begin{aligned} x + \sqrt{7 + |x - 3|} = 4 &\iff \sqrt{7 + |x - 3|} = 4 - x \iff \\ \iff \begin{cases} 4 - x \geq 0, \\ 7 + |x - 3| = (4 - x)^2 \end{cases} &\iff \begin{cases} x \leq 4, \\ |x - 3| = x^2 - 8x + 9. \end{cases} \end{aligned}$$

Раскрывая модуль, получаем две системы. Первая система

$$\begin{cases} x \leq 3, \\ 3 - x = x^2 - 8x + 9 \end{cases} \iff \begin{cases} x \leq 3, \\ x^2 - 7x + 6 = 0 \end{cases} \iff$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 3, \\ (x-1)(x-6) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 3, \\ \begin{cases} x = 1, \\ x = 6 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow x = 1.$$

Вторая система

$$\begin{aligned} & \begin{cases} 3 < x \leq 4, \\ x - 3 = x^2 - 8x + 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 < x \leq 4, \\ x^2 - 9x + 12 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} 3 < x \leq 4, \\ \left(x - \frac{9 - \sqrt{33}}{2}\right) \left(x - \frac{9 + \sqrt{33}}{2}\right) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 < x \leq 4, \\ \begin{cases} x = \frac{9 - \sqrt{33}}{2}, \\ x = \frac{9 + \sqrt{33}}{2} \end{cases} \end{cases} \end{aligned}$$

не имеет решений, так как

$$\frac{9 + \sqrt{33}}{2} > \frac{9 + \sqrt{25}}{2} = 7 > 4, \quad \frac{9 - \sqrt{33}}{2} < \frac{9 - \sqrt{25}}{2} = 2 < 3.$$

Ответ: $\{1\}$.

Задача 32. Решите уравнение

$$x + \sqrt{3 + \sqrt{x^2 - 2x + 1}} = 4. \quad \text{Ответ: } \{2\}.$$

Задача 33. Решите уравнение

$$|1 - x| - \sqrt{x^2 + 4x + 4} = |x + 3|. \quad (22)$$

Решение. Поскольку

$$\sqrt{x^2 + 4x + 4} = \sqrt{(x + 2)^2} = |x + 2| \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

то уравнение (22) равносильно уравнению

$$|x - 1| - |x + 2| - |x + 3| = 0. \quad (23)$$

Раскрывая модули, устанавливаем, что уравнение (23) равносильно

совокупности четырёх систем.

Первая система

$$\begin{cases} x \leq -3, \\ -x + 1 + x + 2 + x + 3 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \leq -3, \\ x = -6 \end{cases} \iff x = -6.$$

Вторая система

$$\begin{cases} -3 < x \leq -2, \\ -x + 1 + x + 2 - x - 3 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -3 < x \leq -2, \\ x = 0 \end{cases}$$

не имеет решений.

Третья система

$$\begin{cases} -2 < x \leq 1, \\ -x + 1 - x - 2 - x - 3 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -2 < x \leq 1, \\ x = -\frac{4}{3} \end{cases} \iff x = -\frac{4}{3}.$$

Четвёртая система

$$\begin{cases} x > 1, \\ x - 1 - x - 2 - x - 3 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 1, \\ -x - 6 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 1, \\ x = -6 \end{cases}$$

не имеет решений.

Ответ: $\left\{ -6, -1\frac{1}{3} \right\}$.

Задача 34. Решите уравнение:

а) $\sqrt{x^2 + 4x + 4} + |x - 3| = 5$; б) $\sqrt{x^2 - 2x + 1} + \sqrt{x^2 + 2x + 1} = 2$;

в) $\sqrt{x^2 + 2x + 1} + \sqrt{x^2 - 4x + 4} = 3$.

Ответ: а) $[-2; 3]$; б) $[-1; 1]$; в) $[-1; 2]$.

Задача 35. Решите уравнение

$$1 + \sqrt{1 + x\sqrt{x^2 - 24}} = x. \quad (24)$$

Решение. Уравнение (24) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} \sqrt{1+x\sqrt{x^2-24}}=x-1 &\Leftrightarrow \begin{cases} x-1 \geq 0, \\ 1+x\sqrt{x^2-24}=(x-1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1, \\ 1+x\sqrt{x^2-24}=x^2-2x+1 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1, \\ x\sqrt{x^2-24}=x(x-2) \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1, \\ \sqrt{x^2-24}=x-2 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1, \\ x-2 \geq 0, \\ x^2-24=(x-2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2, \\ x^2-24=x^2-4x+4 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2, \\ 4x=28 \end{cases} \Leftrightarrow x=7. \end{aligned}$$

Ответ: {7}.

Задача 36. Решите уравнение

$$\sqrt{x} + \sqrt{x - \sqrt{1-x}} = 1. \quad (25)$$

Решение. Уравнение (25) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} \sqrt{x - \sqrt{1-x}} = 1 - \sqrt{x} &\Leftrightarrow \begin{cases} 1 - \sqrt{x} \geq 0, \\ x - \sqrt{1-x} = (1 - \sqrt{x})^2 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x} - 1 \leq 0, \\ \sqrt{1-x} = 2\sqrt{x} - 1 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x} - 1 \leq 0, \\ 2\sqrt{x} - 1 \geq 0, \\ 1 - x = (2\sqrt{x} - 1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 0,5 \leq \sqrt{x} \leq 1, \\ 4\sqrt{x} - 5x = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 0,5 \leq \sqrt{x} \leq 1, \\ \sqrt{x}(4 - 5\sqrt{x}) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \sqrt{x} = 0,8 &\Leftrightarrow x = 0,64. \end{aligned}$$

Ответ: {0,64}.

Задача 37. Решите уравнение

$$\sqrt{x-1} - \sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}} = 2.$$

Решение. Выделяя полный квадрат¹, получим:

$$\sqrt{(\sqrt{x-1})^2 - 4\sqrt{x-1} + 4} = \sqrt{x-1} - 2 \iff$$

$$\iff \sqrt{(\sqrt{x-1} - 2)^2} = \sqrt{x-1} - 2 \iff |\sqrt{x-1} - 2| = \sqrt{x-1} - 2.$$

Используя формулу

$$|f(x)| = f(x) \iff f(x) \geq 0,$$

имеем:

$$\sqrt{x-1} - 2 \geq 0 \iff \sqrt{x-1} \geq 2 \iff x-1 \geq 4 \iff x \geq 5.$$

Ответ: $[5; +\infty)$.

Задача 38. Решите уравнение

$$\sqrt{3x^2 - 6x + 7} + x^2 = 2x + 7. \quad (26)$$

Решение. Способ 1. Уравнение (26) равносильно уравнению

$$\sqrt{3x^2 - 6x + 7} = -x^2 + 2x + 7 \iff$$

$$\iff \begin{cases} -x^2 + 2x + 7 \geq 0, \\ 3x^2 - 6x + 7 = (-x^2 + 2x + 7)^2 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x^2 - 2x - 7 \leq 0, \\ (x^2 - 2x - 7)^2 - 3(x^2 - 2x - 7) - 28 = 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x^2 - 2x - 7 \leq 0, \\ (x^2 - 2x - 7 + 4)(x^2 - 2x - 7 - 7) = 0 \end{cases} \iff$$

¹ Можно использовать подстановку $\sqrt{x-1} = y$.

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2x - 7 \leq 0, \\ (x+1)(x-3)((x^2 - 2x - 7) - 7) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2x - 7 \leq 0, \\ (x+1)(x-3) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} (x - (1 - 2\sqrt{2}))(x - (1 + 2\sqrt{2})) \leq 0, \\ (x+1)(x-3) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 1 - 2\sqrt{2} \leq x \leq 1 + 2\sqrt{2}, \\ \begin{cases} x = -1, \\ x = 3 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1, \\ x = 3, \end{cases} \end{aligned}$$

так как

$$2 - 2\sqrt{2} < 0 \Leftrightarrow 1 - 2\sqrt{2} < -1,$$

а

$$2 - 2\sqrt{2} < 0 \Leftrightarrow 2 < 2\sqrt{2} \Leftrightarrow 3 < 1 + 2\sqrt{2}.$$

Способ 2. Подстановкой $\sqrt{3(x^2 - 2x) + 7} = t$, при которой

$$x^2 - 2x = \frac{1}{3}(t^2 - 7),$$

уравнение (26) приведём к квадратному уравнению

$$t + \frac{1}{3}(t^2 - 7) - 7 = 0 \Leftrightarrow t^2 + 3t - 28 = 0 \Leftrightarrow (t+7)(t-4) = 0.$$

Неотрицательным корнем является число 4.

Следовательно, уравнение (26) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} \sqrt{3x^2 - 6x + 7} = 4 &\Leftrightarrow 3x^2 - 6x + 7 = 16 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x+1)(x-3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3. \end{cases} \end{aligned}$$

Способ 3. Пусть $x^2 - 2x = y$. Тогда уравнение (26) приводим к уравнению

$$\begin{aligned} \sqrt{3y+7} = 7-y &\iff \begin{cases} 7-y \geq 0, \\ 3y+7 = (7-y)^2 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} y \leq 7, \\ y^2 - 17y + 42 = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} y \leq 7, \\ (y-3)(y-14) = 0 \end{cases} \iff y = 3. \end{aligned}$$

Уравнение (26) равносильно уравнению

$$x^2 - 2x = 3 \iff (x+1)(x-3) = 0 \iff \begin{cases} x = -1 \\ x = 3. \end{cases} \text{ Ответ: } \{-1; 3\}.$$

Задача 39. Решите уравнение

$$\sqrt{x-1} + \sqrt{x-2\sqrt{x-1}} = 1. \quad (27)$$

Решение. Подстановкой $\sqrt{x-1} = t$, при которой $x = t^2+1$, уравнение (27) приводим к уравнению

$$t + \sqrt{(t-1)^2} = 1 \iff t + |t-1| - 1 = 0.$$

Поскольку $t \geq 0$, то полученное уравнение равносильно совокупности двух систем:

$$\begin{cases} 0 \leq t \leq 1, \\ t - (t-1) - 1 = 0 \end{cases} \iff 0 \leq t \leq 1; \\ \begin{cases} t > 1, \\ t + (t-1) - 1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} t > 1, \\ t = 1 \end{cases} \iff \emptyset.$$

Следовательно, уравнение (27) равносильно неравенству

$$0 \leq \sqrt{x-1} \leq 1 \iff \sqrt{x-1} \leq 1 \iff \begin{cases} x-1 \geq 0, \\ x-1 \leq 1 \end{cases} \iff 1 \leq x \leq 2.$$

Ответ: $[1; 2]$.

Задача 40. Решите уравнение

$$2\sqrt[4]{x-2} + 3 = \sqrt{x-2}. \quad (28)$$

Решение. Пусть $\sqrt[4]{x-2} = t$. Тогда

$$2t + 3 = t^2 \iff t^2 - 2t - 3 = 0 \iff (t+1)(t-3) = 0.$$

Неотрицательным корнем является $t = 3$.

Уравнение (28) равносильно уравнению

$$\sqrt[4]{x-2} = 3 \iff x-2 = 3^4 \iff x = 83. \quad \text{Ответ: } \{83\}.$$

Задача 41. Решите уравнение

$$2x^2 + 3x + \sqrt{2x^2 + 3x + 9} = 33. \quad (29)$$

Решение. Квадратный трёхчлен

$$2x^2 + 3x + 9 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

так как коэффициент 2 при старшей степени x^2 положительный, а дискриминант $D = 9 - 72 = -63 < 0$.

Уравнение (29) имеет смысл при любом действительном x .

Заменой $\sqrt{2x^2 + 3x + 9} = y$, при которой $2x^2 + 3x = y^2 - 9$, иррациональное уравнение (29) приводим к квадратному уравнению

$$y^2 - 9 + y = 33 \iff y^2 + y - 42 = 0 \iff (y+7)(y-6) = 0 \iff$$

$$\iff \begin{cases} y = -7, \\ y = 6. \end{cases}$$

Замена предполагает, что $y \geq 0$. Следовательно, уравнение (29) равносильно уравнению

$$\sqrt{2x^2 + 3x + 9} = 6 \iff 2x^2 + 3x + 9 = 36 \iff 2x^2 + 3x - 27 = 0 \iff$$

$$\iff (2x+9)(x-3) = 0 \iff \begin{cases} x = -4,5, \\ x = 3. \end{cases} \quad \text{Ответ: } \{-4,5; 3\}.$$

Задача 42. Решите уравнение

$$\sqrt{x^2 + 5x + 3} + \sqrt{x^2 + 5x - 5} = 3. \quad (30)$$

Решение. Так как

$$\frac{(x^2 + 5x + 3) + (x^2 + 5x - 5)}{2} = x^2 + 5x - 1 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

то целесообразно использовать подстановку

$$x^2 + 5x - 1 = t,$$

с помощью которой иррациональное уравнение (30) приводим к более простому уравнению

$$\begin{aligned} \sqrt{t+4} + \sqrt{t-4} = 3 &\iff (\sqrt{t+4} + \sqrt{t-4})^2 = 3^2 \iff \\ \iff \begin{cases} t+4 \geq 0, \\ t-4 \geq 0, \\ 2\sqrt{t^2-16} = 9-2t \end{cases} &\iff \begin{cases} t \geq 4, \\ 9-2t \geq 0, \\ 4(t^2-16) = (9-2t)^2 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} 4 \leq t \leq 4,5, \\ 36t = 145 \end{cases} \iff t = \frac{145}{36}. \end{aligned}$$

Стало быть, уравнение (30) равносильно квадратному уравнению

$$x^2 + 5x - 1 = \frac{145}{36} \iff 36x^2 + 180x - 181 = 0,$$

корнями которого являются $x = \frac{-15 \pm \sqrt{406}}{6}$.

Ответ: $\left\{ \frac{-15 \pm \sqrt{406}}{6} \right\}$.

Задача 43. Решите уравнение

$$\sqrt{x+8+2\sqrt{x+7}} + \sqrt{x+1-\sqrt{x+7}} = 4. \quad (31)$$

Решение. Так как при любом $x \geq -7$

$$\begin{aligned}\sqrt{x+8} + 2\sqrt{x+7} &= \sqrt{x+7} + 2\sqrt{x+7} + 1 = \sqrt{(\sqrt{x+7} + 1)^2} = \\ &= |\sqrt{x+7} + 1| = \sqrt{x+7} + 1,\end{aligned}$$

то уравнение (31) равносильно уравнению

$$\sqrt{x+7} + \sqrt{x+1 - \sqrt{x+7}} = 3. \quad (32)$$

Подстановкой $\sqrt{x+7} = u$ уравнение (32) приводим к виду

$$\begin{aligned}u + \sqrt{u^2 - 6 - u} = 3 &\iff \sqrt{u^2 - u - 6} = 3 - u \iff \\ \iff \begin{cases} 3 - u \geq 0, \\ u^2 - u - 6 = (3 - u)^2 \end{cases} &\iff \begin{cases} u \leq 3, \\ 5u = 15 \end{cases} \iff u = 3.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\sqrt{x+7} = 3 \iff x+7 = 9 \iff x = 2. \quad \text{Ответ: } \{2\}.$$

Задача 44. Решите уравнение

$$\sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}} + \sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}} = 1. \quad (33)$$

Решение. Положим, что

$$\sqrt{x-1} = y \geq 0.$$

Откуда $x = y^2 + 1$ при $y \geq 0$.

Тогда из уравнения (33) получим уравнение

$$\begin{aligned}\sqrt{y^2 + 4 - 4y} + \sqrt{y^2 + 9 - 6y} = 1 &\iff \sqrt{(y-2)^2} + \sqrt{(y-3)^2} = 1 \iff \\ \iff |y-2| + |y-3| = 1,\end{aligned} \quad (34)$$

которое будем решать при $y \geq 0$.

Поскольку $y - 2 - (y - 3) = 1$, то согласно формуле

$$|f(x)| + |g(x)| = f(x) - g(x) \iff \begin{cases} f(x) \geq 0, \\ g(x) \leq 0 \end{cases}$$

уравнение (34) равносильно системе

$$\begin{cases} y - 2 \geq 0, \\ y - 3 \leq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y \geq 2, \\ y \leq 3 \end{cases} \iff 2 \leq y \leq 3.$$

Следовательно, уравнение (33) равносильно двойному неравенству

$$2 \leq \sqrt{x-1} \leq 3 \iff 4 \leq x-1 \leq 9 \iff 5 \leq x \leq 10.$$

Ответ: $[5; 10]$.

Задача 45. Решите уравнение

$$\sqrt{x^2 + x + 4} + \sqrt{x^2 + x + 1} = \sqrt{2x^2 + 2x + 9}. \quad (35)$$

Решение. Подстановкой

$$x^2 + x + 4 = y$$

уравнение (35) приводим к уравнению более простого вида

$$\begin{aligned} \sqrt{y} + \sqrt{y-3} = \sqrt{2y+1} &\iff (\sqrt{y} + \sqrt{y-3})^2 = 2y+1 \iff \\ &\iff \begin{cases} y \geq 0, \\ y-3 \geq 0, \\ y + 2\sqrt{y(y-3)} + y - 3 = 2y+1 \end{cases} \iff \begin{cases} y \geq 0, \\ y \geq 3, \\ \sqrt{y(y-3)} = 2 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} y \geq 3, \\ y(y-3) = 4 \end{cases} \iff \begin{cases} y \geq 3, \\ (y+1)(y-4) = 0 \end{cases} \iff y = 4. \end{aligned}$$

Тогда уравнение (35) равносильно уравнению

$$x^2 + x + 4 = 4 \iff x(x+1) = 0 \iff \begin{cases} x = -1, \\ x = 0. \end{cases}$$

Ответ: $\{-1; 0\}$.

Задача 46. Найдите сумму корней (или корень, если он один) уравнения

$$3 \cdot \sqrt{\frac{6x-10}{x}} - 2 \cdot \sqrt{\frac{x}{6x-10}} = 5. \quad (36)$$

*Решение*¹. Пусть $\sqrt{\frac{6x-10}{x}} = t$. Тогда

$$\sqrt{\frac{x}{6x-10}} = \frac{1}{t} \quad (t > 0),$$

и уравнение (36) будет иметь вид

$$\begin{aligned} 3t - 2 \cdot \frac{1}{t} = 5 &\iff \frac{3t^2 - 5t - 2}{t} = 0 \iff \frac{(3t+1)(t-2)}{t} = 0 \iff \\ &\iff \begin{cases} t = -\frac{1}{3}, \\ t = 2. \end{cases} \end{aligned}$$

Так как $t > 0$, то $t = 2$.

Следовательно, уравнение (36) равносильно уравнению

$$\sqrt{\frac{6x-10}{x}} = 2 \iff \frac{6x-10}{x} = 4 \iff \frac{6x-10}{x} - 4 = 0 \iff$$

¹Если учесть равносильность

$$af(x) + \frac{b}{f(x)} = ac + \frac{b}{c} \iff \begin{cases} f(x) = c, \\ f(x) = \frac{b}{ac} \end{cases} \quad (abc \neq 0, b \neq ac^2)$$

при $a = 3$, $b = -2$, $c = 2$ и $f(x) > 0$, то относительно уравнения (36) имеем:

$$3 \cdot \sqrt{\frac{6x-10}{x}} + \frac{-2}{\sqrt{\frac{6x-10}{x}}} = 3 \cdot 2 + \frac{-2}{2} \iff \sqrt{\frac{6x-10}{x}} = 2.$$

$$\Leftrightarrow \frac{2x - 10}{x} = 0 \Leftrightarrow x = 5. \quad \text{Ответ: } 5.$$

Задача 47. Решите уравнение

$$\sqrt[3]{9-x} + \sqrt[3]{63+x} = 6. \quad (37)$$

Решение. Способ 1. Пусть $\sqrt[3]{9-x} = y$. Тогда $x = 9 - y^3$.
Уравнение (37) приведём к уравнению

$$y + \sqrt[3]{72 - y^3} = 6 \Leftrightarrow \sqrt[3]{72 - y^3} = 6 - y.$$

Возведя обе части полученного уравнения в куб, перейдём к равносильному квадратному уравнению

$$y^2 - 6y + 8 = 0 \Leftrightarrow (y - 2)(y - 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2, \\ y = 4. \end{cases}$$

Поскольку

$$\sqrt[3]{9-x} = 2 \Leftrightarrow 9-x = 8 \Leftrightarrow x = 1,$$

$$\sqrt[3]{9-x} = 4 \Leftrightarrow 9-x = 64 \Leftrightarrow x = -55,$$

то решениями уравнения (37) будут числа -55 и 1 .

Способ 2. Обе части уравнения (37) возведём в куб и получим равносильное уравнение

$$\begin{aligned} & (\sqrt[3]{9-x})^3 + 3(\sqrt[3]{9-x})^2 \cdot \sqrt[3]{63+x} + 3\sqrt[3]{9-x} \cdot (\sqrt[3]{63+x})^2 + \\ & \quad + (\sqrt[3]{63+x})^3 = 216 \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \sqrt[3]{(9-x)(63+x)} \cdot (\sqrt[3]{9-x} + \sqrt[3]{63+x}) = 48. \end{aligned}$$

Отсюда, учитывая уравнение (37), получаем новое уравнение

$$\sqrt[3]{(9-x)(63+x)} = 8. \quad (38)$$

Обе части уравнения (38) возведём в куб и получим равносильное уравнение

$$(9 - x)(63 + x) = 512 \iff x^2 + 54x - 55 = 0 \iff$$

$$\iff (x + 55)(x - 1) = 0 \iff \begin{cases} x = -55, \\ x = 1. \end{cases}$$

Переход от уравнения (37) к уравнению (38) осуществлён при тех значениях переменной x , при которых сумма $\sqrt[3]{9-x} + \sqrt[3]{63+x}$ равна 6. Поэтому любое решение уравнения (37) будет решением иррационального уравнения (38).

Однако не каждый корень уравнения (38) должен быть корнем уравнения (37). Это следует из того, что уравнение (38) в своём задании не предполагает равенства (37). Уравнение (38) лишь получено с учётом уравнения (37). Поэтому необходима проверка.

При $x = -55$ выражение $\sqrt[3]{9-x} + \sqrt[3]{63+x}$ принимает значение равное 6.

Значит, -55 — корень уравнения (37).

При $x = 1$ выражение $\sqrt[3]{9-x} + \sqrt[3]{63+x}$ принимает значение 6.

Значит, 1 — корень уравнения (37).

Следовательно, решениями уравнения (37) будут числа -55 и 1 .

Ответ: $\{-55; 1\}$.

Задача 48. Решите уравнение

$$\sqrt[3]{\frac{2x}{x^2 - 15}} + \sqrt[3]{\frac{x^2 - 15}{2x}} = \frac{5}{2}. \quad (39)$$

Решение. Пусть $\sqrt[3]{\frac{2x}{x^2 - 15}} = t$. Тогда

$$t + \frac{1}{t} = \frac{5}{2} \iff t + \frac{1}{t} = 2 + \frac{1}{2} \iff \begin{cases} t = 2, \\ t = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Уравнение (39) равносильно совокупности двух уравнений:

$$\sqrt[3]{\frac{2x}{x^2 - 15}} = 2 \iff \frac{2x}{x^2 - 15} = 8 \iff \frac{2x - 8x^2 + 120}{x^2 - 15} = 0 \iff$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{961}}{8};$$

$$\sqrt[3]{\frac{2x}{x^2 - 15}} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{2x}{x^2 - 15} = \frac{1}{8} \Leftrightarrow \frac{16x - x^2 + 15}{x^2 - 15} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = 8 \pm \sqrt{79}. \quad \text{Ответ: } \left\{ 8 \pm \sqrt{79}, \frac{1 \pm \sqrt{961}}{8} \right\}.$$

Задача 49. Решите уравнение

$$\sqrt[3]{x-2} + \sqrt{x+1} = 3. \quad (40)$$

Решение. Введём новые переменные

$$u = \sqrt[3]{x-2}, \quad v = \sqrt{x+1}.$$

Тогда из уравнения (40) следует равенство

$$u + v = 3.$$

Кроме этого

$$u^3 - v^2 = (\sqrt[3]{x-2})^3 - (\sqrt{x+1})^2 = x - 2 - (x + 1) = -3.$$

Следовательно, u и v такие, что

$$\begin{aligned} \begin{cases} u + v = 3, \\ u^3 - v^2 = -3 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} v = 3 - u, \\ u^3 - (3 - u)^2 = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} v = 3 - u, \\ u^3 - u^2 + 6u - 6 = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} v = 3 - u, \\ (u - 1)(u^2 + 6) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} v = 3 - u, \\ u = 1. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = 1, \\ v = 2. \end{cases} \end{aligned}$$

Из равенства $\sqrt[3]{x-2} = u$ при $u = 1$ получаем уравнение (можно рассмотреть равенство $\sqrt{x+1} = v$ при $v = 2$)

$$\sqrt[3]{x-2} = 1 \Leftrightarrow x - 2 = 1 \Leftrightarrow x = 3. \quad \text{Ответ: } \{3\}.$$

Задача 50. Решите уравнение

$$\sqrt[4]{17-x} + \sqrt[4]{80+x} = 5. \quad (41)$$

Решение. Пусть

$$\sqrt[4]{17-x} = u, \quad \sqrt[4]{80+x} = v.$$

Тогда $u \geq 0$ и $v \geq 0$, а сумма

$$u^4 + v^4 = 17 - x + 80 + x = 97.$$

Из уравнения (41) следует система

$$\begin{cases} u + v = 5, \\ u^4 + v^4 = 97. \end{cases} \quad (42)$$

Уравнение

$$\begin{aligned} u^4 + v^4 = 97 &\iff (u^2 + v^2)^2 - 2u^2v^2 = 97 \iff \\ &\iff ((u + v)^2 - 2uv)^2 - 2u^2v^2 = 97. \end{aligned}$$

Поэтому система (42) равносильна системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} u + v = 5, \\ (25 - 2uv)^2 - 2u^2v^2 = 97 \end{cases} &\iff \begin{cases} u + v = 5, \\ (uv)^2 - 50uv + 264 = 0 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} u + v = 5, \\ (uv - 6)(uv - 44) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \begin{cases} u + v = 5, \\ uv = 6, \end{cases} \\ \begin{cases} u + v = 5, \\ uv = 44. \end{cases} \end{cases} \end{aligned}$$

Из первой системы

$$\begin{cases} u + v = 5, \\ uv = 6 \end{cases}$$

в соответствии с обратной теоремой Виета следует, что u и v — корни квадратного уравнения

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0 \iff (\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0 \iff \begin{cases} \lambda = 2, \\ \lambda = 3. \end{cases}$$

То есть $u = 2, v = 3$ и $u = 3, v = 2$.

Из второй системы

$$\begin{cases} u + v = 5, \\ uv = 44 \end{cases}$$

в соответствии с обратной теоремой Виета следует, что u и v — корни квадратного уравнения

$$\lambda^2 - 5\lambda + 44 = 0.$$

Но дискриминант $D = 25 - 176 = -151 < 0$, а значит, у этого уравнения нет корней.

Итак, решениями системы (42) будут две пары чисел $(2, 3)$ и $(3, 2)$.

Уравнение (41) равносильно совокупности двух систем:

$$\begin{cases} \sqrt[4]{17-x} = 2, \\ \sqrt[4]{80+x} = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} 17-x = 16, \\ 80+x = 81 \end{cases} \iff x = 1;$$

$$\begin{cases} \sqrt[4]{17-x} = 3, \\ \sqrt[4]{80+x} = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} 17-x = 81, \\ 80+x = 16 \end{cases} \iff x = -64.$$

Ответ: $\{-64; 1\}$.

Задача 51. Решите уравнение

$$\sqrt[4]{\frac{x+1}{3-x}} + \sqrt[4]{\frac{3-x}{x+1}} = 2,5. \quad (43)$$

Решение. Согласно формуле

$$af(x) + \frac{b}{f(x)} = ac + \frac{b}{c} \iff \begin{cases} f(x) = c, \\ f(x) = \frac{b}{ac} \end{cases} \quad (abc \neq 0, b \neq ac^2)$$

при $a = 1, b = 1, c = 2$ и $f(x) > 0$, иррациональное уравнение (43)

равносильно уравнению

$$\begin{aligned} \sqrt[4]{\frac{x+1}{3-x}} + \frac{1}{\sqrt[4]{\frac{x+1}{3-x}}} = 2 + \frac{1}{2} &\iff \begin{cases} \sqrt[4]{\frac{x+1}{3-x}} = \frac{1}{2}, \\ \sqrt[4]{\frac{x+1}{3-x}} = 2 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} \frac{x+1}{3-x} = \frac{1}{16}, \\ \frac{x+1}{3-x} = 16 \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{17x+13}{16(3-x)} = 0, \\ \frac{17x-47}{16(3-x)} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \neq 3, \\ \begin{cases} 17x+13=0, \\ 17x-47=0 \end{cases} \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} x \neq 3, \\ \begin{cases} x = -\frac{13}{17}, \\ x = \frac{47}{17} \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} x = -\frac{13}{17}, \\ x = \frac{47}{17} \end{cases} \quad \text{Ответ: } \left\{ -\frac{13}{17}, \frac{47}{17} \right\}. \end{aligned}$$

Задача 52. Решите уравнение

$$x^2 + \sqrt{x-2} = 3. \quad (44)$$

Решение. Уравнение (44) имеет смысл при $x \geq 2$.

Функции

$$s(x) = \sqrt{x-2} \quad \forall x \in [2; +\infty) \quad \text{и} \quad g(x) = x^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

возрастают на полуоткрытом числовом луче $[2; +\infty)$. Значит, функция-сумма

$$f(x) = s(x) + g(x) \quad \forall x \in [2; +\infty)$$

является возрастающей.

Из того, что $f(2) = 4$, следует оценка

$$f(x) \geq 4 \quad \forall x \in [2; +\infty).$$

Следовательно, уравнение $f(x) = 3$ не имеет решений.

В принятых обозначениях уравнение (44) будет иметь вид

$$f(x) = 3,$$

и у него нет решений. *Ответ:* \emptyset .

Задача 53. Решите уравнение

$$x^2 + x + \sqrt{x-2} = 6. \quad (45)$$

Решение. *Способ 1.* Непосредственно подстановкой убеждаемся, что $x = 2$ является корнем уравнения (45).

Докажем, что других корней у уравнения (45) нет.

Уравнение (45) имеет смысл при $x \geq 2$.

Функции

$$s(x) = \sqrt{x-2} \quad \forall x \in [2; +\infty) \quad \text{и} \quad g(x) = x^2 + x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

возрастают на полуоткрытом числовом луче $[2; +\infty)$.

Значит, функция-сумма

$$f(x) = s(x) + g(x) \quad \forall x \in [2; +\infty)$$

является возрастающей¹.

В принятых обозначениях уравнение (45) имеет вид

$$f(x) = 6.$$

Значение² $f(2) = 6$.

Итак, $x = 2$ — решение уравнения (45).

Других корней нет, так как график возрастающей функции и график постоянной функции (в данном случае $c(x) = 6 \quad \forall x \in \mathbb{R}$) пересекаются не более чем в одной точке.

Способ 2. Подстановкой $\sqrt{x-2} = y$, при которой $x = y^2 + 2$, уравнение (45) приводим к уравнению

¹То, что функция f возрастает, можно установить, исходя из непрерывности функции f и того, что производная

$$f'(x) = 2x + 1 + \frac{1}{2\sqrt{x-2}} \quad \forall x \in (2; +\infty)$$

является положительной функцией.

²Заметим, что 6 — наименьшее значение функции f , которое она принимает при $x = 2$.

$$y^4 + 5y^2 + y = 0 \iff y(y^3 + 5y + 1) = 0,$$

которое при $y \geq 0$ имеет единственный корень $y = 0$, так как

$$y^3 + 5y + 1 > 0 \quad \forall y \in [0; +\infty).$$

Следовательно, уравнение (45) равносильно уравнению

$$\sqrt{x-2} = 0 \iff x-2 = 0 \iff x = 2. \quad \text{Ответ: } \{2\}.$$

Задача 54. Решите уравнение

$$\sqrt{x^2+4} + \sqrt{x^2+1} = 3 - 5x^2. \quad (46)$$

Решение. Для выражений, расположенных в левой части уравнения (46), имеют место оценки:

$$\sqrt{x^2+4} \geq 2 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{и} \quad \sqrt{x^2+1} \geq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

из которых следует, что левая часть

$$\sqrt{x^2+4} + \sqrt{x^2+1} \geq 3 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

В то же время выражение, расположенное в правой части,

$$3 - 5x^2 \leq 3 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Следовательно, равенство (46) возможно только в том случае, когда обе его части равны 3, то есть

$$\begin{cases} \sqrt{x^2+4} + \sqrt{x^2+1} = 3, \\ 3 - 5x^2 = 3 \end{cases} \iff x = 0. \quad \text{Ответ: } \{0\}.$$

Задача 55. Решите уравнение

$$\sqrt{x} - 1 = x^2 + x. \quad (47)$$

Решение. Уравнение (47) равносильно уравнению

$$x^2 + x + 1 - \sqrt{x} = 0.$$

Рассмотрим функцию

$$f(x) = x^2 + x + 1 - \sqrt{x} \quad \forall x \in [0; +\infty).$$

В принятых обозначениях уравнение будет иметь вид

$$f(x) = 0.$$

Поэтому корнями уравнения (47) будут нули функции f .

Если $0 \leq x < 1$, то $0 \leq \sqrt{x} < 1$ и

$$f(x) = x^2 + x + (1 - \sqrt{x}) > 0 \quad \forall x \in [0; 1).$$

Если $x \geq 1$, то $\sqrt{x} \geq 1$ и

$$f(x) = x^2 + 1 + \sqrt{x}(\sqrt{x} - 1) \geq 2 \quad \forall x \in [1; +\infty).$$

Следовательно,

$$f(x) > 0 \quad \forall x \in [0; +\infty),$$

а значит, у функции f нет нулей.

Стало быть, уравнение (47) не имеет решений. *Ответ:* \emptyset .

Задача 56. *Определите число корней уравнения*

$$5 - x = (x + 2)\sqrt{x-1}. \quad (48)$$

Решение. Уравнение (48) имеет смысл при $x \geq 1$.

Рассмотрим функции

$$f(x) = 5 - x \quad \forall x \in [1; +\infty)$$

и

$$g(x) = (x + 2)\sqrt{x-1} \quad \forall x \in [1; +\infty).$$

Тогда уравнение (48) будет иметь вид

$$f(x) = g(x).$$

Отсюда следует, что уравнение (48) имеет столько корней, в скольких точках пересекаются графики функций f и g .

Функция f — непрерывная убывающая, так как является сужением линейной функции

$$l(x) = -x + 5 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

с отрицательным угловым коэффициентом $k = -1$.

Множество значений

$$E(f) = (-\infty; f(1)] = (-\infty; 4].$$

Функция g возрастает и непрерывна, как произведение непрерывных, неотрицательных и возрастающих функций

$$g_1(x) = x + 2 \quad \text{и} \quad g_2(x) = \sqrt{x-1}, \quad D(g_1) = D(g_2) = [1; +\infty).$$

Множество значений

$$E(g) = [g(1); +\infty) = [0; +\infty).$$

Числовые промежутки $(-\infty; 4]$ и $[0; +\infty)$ пересекаются, а значит, пересекаются графики функций f и g .

Поскольку функция f убывает, а функция g возрастает, то их графики пересекаются только в одной точке.

Таким образом, уравнение (48) имеет один корень. *Ответ:* 1.

Задача 57. *Определите число корней уравнения*

$$1 + x = (5 - x)\sqrt{x - 4}. \quad (49)$$

Решение. Уравнение (49) имеет смысл при $x \geq 4$.

Пусть

$$f(x) = 1 + x \quad \forall x \in [4; +\infty),$$

а

$$g(x) = (5 - x)\sqrt{x - 4} \quad \forall x \in [4; +\infty).$$

Тогда уравнение (49) будет иметь вид

$$f(x) = g(x).$$

Функция f возрастает, как сужение линейной функции

$$l(x) = x + 1, \quad D(l) = \mathbb{R},$$

с положительным угловым коэффициентом $k = 1$.

Множество значений

$$E(f) = [f(4); +\infty) = [5; +\infty).$$

Производная функция

$$g'(x) = -\sqrt{x-4} + \frac{5-x}{2\sqrt{x-4}} = \frac{-2(x-4) + 5-x}{2\sqrt{x-4}} = -\frac{3x-13}{2\sqrt{x-4}}$$

определена на открытом числовом луче $(4; +\infty)$ и обращается в нуль в единственной точке $x = 4\frac{1}{3}$.

Следовательно, непрерывная функция g имеет одну точку экстремума $x = 4\frac{1}{3}$, которая является точкой максимума, ибо при переходе через эту точку производная меняет знак с плюса на минус.

Наибольшее значение

$$\max_{[4;+\infty)} g(x) = g\left(4\frac{1}{3}\right) = \frac{2\sqrt{3}}{9}.$$

$$\text{Множество значений } E(g) = \left(-\infty; \frac{2\sqrt{3}}{9}\right].$$

Числовые промежутки $[5; +\infty)$ и $\left(-\infty; \frac{2\sqrt{3}}{9}\right]$ не пересекаются.

Поэтому график функции f не пересекает график функции g , а уравнение (49) не имеет корней. *Ответ:* \emptyset .

Задача 58. Если x_0 — корень уравнения

$$\sqrt{6+x} - \sqrt{4-x} = 2, \tag{50}$$

то значение выражения $x_0(x_0 - 7)$ равно:

$$1) -\frac{33}{4}; \quad 2) -12; \quad 3) 8; \quad 4) 18; \quad 5) -10.$$

Решение. *Способ 1.* Заметим, что 3 является корнем иррационального уравнения (50):

$$\sqrt{6+3} - \sqrt{4-3} = \sqrt{9} - \sqrt{1} = 3 - 1 = 2.$$

Уравнение (50) имеет смысл при

$$\begin{cases} 6+x \geq 0, \\ 4-x \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq -6, \\ x \leq 4 \end{cases} \iff -6 \leq x \leq 4.$$

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \sqrt{6+x} - \sqrt{4-x} \quad \forall x \in [-6; 4].$$

Так как функция

$$f_1(x) = \sqrt{6+x} \quad \forall x \in [-6; 4]$$

возрастает, а функция

$$f_2(x) = \sqrt{4-x} \quad \forall x \in [-6; 4]$$

убывает, то функция f возрастает.

Поэтому уравнение (50), если имеет решения, то только одно.

Следовательно, $x_0 = 3$.

Тогда выражение

$$x_0(x_0 - 7) = 3(3 - 7) = -12.$$

Способ 2. Уравнение (50) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} \sqrt{6+x} &= 2 + \sqrt{4-x} \iff 6+x = (2 + \sqrt{4-x})^2 \iff \\ \iff 6+x &= 4 + 4\sqrt{4-x} + 4-x \iff 2\sqrt{4-x} = x-1 \iff \\ \iff 2\sqrt{4-x} &= x-1 \iff \begin{cases} x-1 \geq 0, \\ 4(4-x) = (x-1)^2 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} x \geq 1, \\ x^2 + 2x - 15 = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x \geq 1, \\ (x+5)(x-3) = 0 \end{cases} \iff x = 3. \end{aligned}$$

Следовательно, $x_0 = 3$.

Тогда выражение

$$x_0(x_0 - 7) = 3(3 - 7) = -12.$$

Способ 3. Уравнение

$$x_0(x_0 - 7) = -12 \iff x_0^2 - 7x_0 + 12 = 0 \iff$$

$$\iff (x_0 - 3)(x_0 - 4) = 0 \iff \begin{cases} x_0 = 3, \\ x_0 = 4. \end{cases}$$

Подставляя $x = 3$ в уравнение (50), получаем верное равенство:

$$\sqrt{6+3} - \sqrt{4-3} = 2.$$

Значит, $x = 3$ — корень уравнения (50), а выражение

$$x_0(x_0 - 7) = -12. \quad \text{Ответ: } 2).$$

Задача 59. Решите уравнение

$$2\sqrt{x+18} + \sqrt{4x-3} = 15. \quad (51)$$

В ответ запишите корень или сумму корней.

Решение. Способ 1. Уравнение

$$2\sqrt{x+18} + \sqrt{4x-3} = 15 \iff 2\sqrt{x+18} = 15 - \sqrt{4x-3} \iff$$

$$\iff \begin{cases} 15 - \sqrt{4x-3} \geq 0, \\ 4(x+18) = 225 - 30\sqrt{4x-3} + 4x - 3 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} \sqrt{4x-3} \leq 15, \\ 30\sqrt{4x-3} = 150 \end{cases} \iff \begin{cases} \sqrt{4x-3} \leq 15, \\ \sqrt{4x-3} = 5 \end{cases} \iff$$

$$\iff \sqrt{4x-3} = 5 \iff 4x - 3 = 25 \iff x = 7.$$

Способ 2. Заметим, что $x = 7$ — корень уравнения (51).

Функция

$$y(x) = 2\sqrt{x+18} + \sqrt{4x-3} \quad \forall x \in \left[\frac{3}{4}; +\infty\right)$$

является возрастающей. А поэтому значение 15 она принимает только один раз — при $x = 7$.

Следовательно, $x = 7$ — единственный корень уравнения (51).

Ответ: 7.

Задача 60. Увеличенная в 7 раз сумма всех корней уравнения

$$\sqrt{9x-32} - \sqrt{2(x-3)} = \sqrt{x+2} \quad (52)$$

равна...

Решение. Уравнение (52) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} \sqrt{9x-32} &= \sqrt{2(x-3)} + \sqrt{x+2} \iff \\ \iff 9x-32 &= 2(x-3) + 2\sqrt{2(x-3)}\sqrt{x+2} + x+2 \iff \\ \iff 3x-14 &= \sqrt{2(x-3)}\sqrt{x+2} \iff \\ \iff \begin{cases} 2(x-3) \geq 0, \\ x+2 \geq 0, \\ 3x-14 \geq 0, \\ (3x-14)^2 = 2(x-3)(x+2) \end{cases} &\iff \begin{cases} x \geq 3, \\ x \geq -2, \\ x \geq 4\frac{2}{3}, \\ 7x^2 - 82x + 208 = 0 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} x \geq 4\frac{2}{3}, \\ 7\left(x - \frac{26}{7}\right)(x-8) = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x \geq 4\frac{2}{3}, \\ x-8 = 0 \end{cases} \iff x = 8. \end{aligned}$$

Следовательно, увеличенная в 7 раз сумма всех корней уравнения (52) равна $8 \cdot 7 = 56$. *Ответ:* 56.

Задача 61. *Среднее арифметическое корней уравнения*

$$2x^2 + 3x - 5\sqrt{2x^2 + 3x + 9} = -3 \quad (53)$$

равно:

1) 2,5; 2) -0,75; 3) -1,5; 4) *правильный ответ не указан.*

Решение. Уравнение (53) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} 2x^2 + 3x + 9 - 5\sqrt{2x^2 + 3x + 9} - 6 &= 0 \iff \\ \iff (\sqrt{2x^2 + 3x + 9} + 1)(\sqrt{2x^2 + 3x + 9} - 6) &= 0 \iff \\ \iff \begin{cases} \sqrt{2x^2 + 3x + 9} = -1, \\ \sqrt{2x^2 + 3x + 9} = 6 \end{cases} &\iff \sqrt{2x^2 + 3x + 9} = 6 \iff \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + 3x + 9 = 36 \Leftrightarrow 2x^2 + 3x - 27 = 0.$$

По теореме Виета, сумма корней полученного квадратного уравнения равна $-1,5$.

Тогда среднее арифметическое корней уравнения (53) равно $-1,5 : 2 = -0,75$. *Ответ:* 2).

Задача 62. Решите уравнение

$$\sqrt{9x^2 - 30x + 25} - 2x = \sqrt{x^2 + 4x + 4}.$$

а) $\frac{7}{4}$; б) 0; в) $\frac{1}{2}$; г) $\frac{5}{3}$; д) -2 .

Решение. Задача облегчается тем, что под радикалами имеем полные квадраты, и, следовательно, уравнение можно переписать в виде $|3x - 5| - 2x = |x + 2|$ или $|x + 2| - |3x - 5| = -2x$. Это уравнение решается методом числовых промежутков (рис. 1).




Рис. 1

I. Если $x < -2$, то

$$|x + 2| = -(x + 2), \quad |3x - 5| = -(3x - 5),$$

и приходим к уравнению

$$-x - 2 + 3x - 5 = -2x.$$

Отсюда $x = \frac{7}{4}$ — посторонний корень, так как он не удовлетворяет

условию $\frac{7}{4} < -2$.

II. $-2 \leq x < \frac{5}{3}$. При этом условии получаем уравнение

$$x + 2 + 3x - 5 = -2x.$$

Отсюда $x = \frac{1}{2}$ — корень, так как $\frac{1}{2} \in \left[-2; \frac{5}{3}\right)$.

III. $x \geq \frac{5}{3}$. Имеем

$$x + 2 - 3x + 5 = -2x \iff 0 \cdot x = 7.$$

Это уравнение не имеет корней. *Ответ:* в).

Задача 63. Какое из чисел отличается менее чем на $\frac{1}{4}$ от корня уравнения

$$\sqrt{x^2 + x + 4} + \sqrt{x^2 + x + 1} = \sqrt{2x^2 + 2x + 9} : \quad (54)$$

$1) -\frac{5}{6}; 2) -\frac{2}{3}; 3) \frac{1}{3}; 4) \frac{5}{6}; 5) -\frac{4}{7} ?$

Решение. Пусть $x^2 + x + 1 = z$. Тогда

$$\sqrt{z+3} + \sqrt{z} = \sqrt{2z+7} \iff z+3+2\sqrt{z+3} \cdot \sqrt{z} + z = 2z+7 \iff$$

$$\iff \sqrt{z+3} \cdot \sqrt{z} = 2 \iff \begin{cases} z+3 \geq 0, \\ z \geq 0, \\ z(z+3) = 4 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} z \geq 0, \\ z^2 + 3z - 4 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} z \geq 0, \\ (z+4)(z-1) = 0 \end{cases} \iff z = 1.$$

Значит, уравнение (54) равносильно уравнению

$$x^2 + x + 1 = 1 \iff x^2 + x = 0 \iff x(x+1) = 0 \iff \begin{cases} x = -1, \\ x = 0. \end{cases}$$

Поскольку

$$\left| -1 - \left(-\frac{5}{6}\right) \right| = \frac{1}{6} < \frac{1}{4}, \quad \left| 0 - \left(-\frac{5}{6}\right) \right| = \frac{5}{6} > \frac{1}{4},$$

то $-\frac{5}{6}$ отличается менее чем на $\frac{1}{4}$ от корня $x = -1$ уравнения (54).

Остальные числа $-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{5}{6}$ и $-\frac{4}{7}$ отличаются от каждого корня уравнения (54) более чем на $\frac{1}{4}$. *Ответ:* 1).

Задача 64. Число различных корней уравнения

$$\sqrt{\sqrt{11x^2 + 1} - 2x} = x - 1 \quad (55)$$

равно:

$$\boxed{1) 1; 2) 3; 3) 5; 4) 4; 5) 2.}$$

Решение. Уравнение (55) равносильно системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} x - 1 \geq 0, \\ \sqrt{\sqrt{11x^2 + 1} - 2x} = (x - 1)^2 \end{cases} &\iff \begin{cases} x \geq 1, \\ \sqrt{\sqrt{11x^2 + 1} - 2x} = x^2 + 1 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} x \geq 1, \\ 11x^2 + 1 = x^4 + 2x^2 + 1 \end{cases} &\iff \begin{cases} x \geq 1, \\ x^4 - 9x^2 = 0 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} x \geq 1, \\ x^2(x - 3)(x + 3) = 0 \end{cases} &\iff x - 3 = 0 \iff x = 3. \end{aligned}$$

Следовательно, число корней равно 1. *Ответ:* 1).

Задача 65. Решите уравнение

$$\frac{(1 + \sqrt{x})(x^2 + 3x + 2)}{(x - 1)(x^2 - 16)} \cdot \sqrt{x^2 - 7x + 12} = 0$$

и укажите число его корней.

$$\boxed{а) 0; б) 1; в) 2; г) 3; д) 4.}$$

Решение. Рассматривая данное уравнение как дробное, заключаем, что его корни должны находиться среди корней числителя и при этом не обращать в нуль знаменатель.

- 1) $1 + \sqrt{x}$ в нуль не обращается.
- 2) $x^2 + 3x + 2 = 0$ при $x = -1$ и $x = -2$.
- 3) $x^2 - 7x + 12 = 0$ при $x = 3$ и $x = 4$.

Корень $x = 4$ — посторонний, поскольку при этом $x^2 - 16 = 0$. Так как уравнение содержит радикалы, то найденные корни должны принадлежать области определения этих радикалов. Корни $x = -1$ и $x = -2$

не удовлетворяют условию $x \geq 0$, т.е. \sqrt{x} не определён при этих значениях x .

Остался один корень $x = 3$. Ответ: б).

Задача 66. Пара чисел (x_0, y_0) является решением уравнения

$$(3 + 2y - y^2)\sqrt{x} = y - 3. \quad (56)$$

Найдите наименьшее значение выражения

$$(y_0 + 1)^2 + x_0. \quad (57)$$

1) 0; 2) 1; 3) 2; 4) 5.

Решение. Уравнение (56) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} y - 3 + (y^2 - 2y - 3)\sqrt{x} = 0 &\iff y - 3 + (y + 1)(y - 3)\sqrt{x} = 0 \iff \\ &\iff (y - 3)(1 + (y + 1)\sqrt{x}) = 0. \end{aligned}$$

Произведение двух выражений равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один из сомножителей равен нулю, а произведение имеет смысл.

Поэтому уравнение (56) равносильно совокупности, состоящей из системы

$$\begin{cases} x \geq 0, \\ y - 3 = 0 \end{cases} \quad (58)$$

и уравнения

$$1 + (y + 1)\sqrt{x} = 0. \quad (59)$$

Пусть выполняется система (58).

Тогда при $x_0 \geq 0$, $y_0 = 3$ выражение (57) имеет вид

$$16 + x_0$$

и принимает наименьшее значение, равное 16, когда $x_0 = 0$.

Пусть выполняется равенство (59).

Заметим, что пара чисел (x_0, y_0) является решением уравнения (59) при условии $x_0 \neq 0$.

Следовательно, в уравнении (59) неизвестная $x > 0$, и оно равносильно уравнению

$$y = -\frac{1}{\sqrt{x}} - 1.$$

Если

$$x_0 > 0, \quad y_0 = -\frac{1}{\sqrt{x_0}} - 1,$$

то выражение (57) будет суммой двух положительных взаимно обратных чисел

$$\frac{1}{x_0} + x_0.$$

Известно, что сумма двух положительных взаимно обратных чисел не меньше двух и принимает наименьшее значение, равное 2, когда эти числа равны единице. В данном случае при $x_0 = 1$.

Следовательно, при выполнении равенства (59) наименьшим значением выражения (57) является число 2.

Итак, наименьшим значением выражения (57) будет

$$\min\{16; 2\} = 2. \quad \text{Ответ: } 3).$$

Задача 67. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x} + y = 4, \\ y\sqrt{x} = -21. \end{cases}$$

Решение. В соответствии с теоремой Виета y и \sqrt{x} должны быть корнями приведённого квадратного уравнения

$$z^2 - 4z - 21 = 0 \iff (z + 3)(z - 7) = 0 \iff \begin{cases} z = -3, \\ z = 7. \end{cases}$$

Учитывая, что

$$\sqrt{x} \geq 0 \quad \forall x \in [0; +\infty),$$

получаем:

$$\begin{cases} \sqrt{x} + y = 4, \\ y\sqrt{x} = -21 \end{cases} \iff \begin{cases} \sqrt{x} = 7, \\ y = -3 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 49, \\ y = -3. \end{cases}$$

Ответ: $\{(49, -3)\}$.

Задача 68. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x} + y = 7, \\ y\sqrt{x} = -18. \end{cases}$$

Ответ: $\{(81, -2)\}$.

Задача 69. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x} + y = 5, \\ 2\sqrt{x} - y = -2. \end{cases} \quad (60)$$

Решение. Система (60) равносильна системе

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \sqrt{x} + 2\sqrt{x} = 5 + (-2), \\ 2y - (-y) = 2 \cdot 5 - (-2) \end{cases} \iff \\ \iff & \begin{cases} 3\sqrt{x} = 3, \\ 3y = 12 \end{cases} \iff \begin{cases} \sqrt{x} = 1, \\ y = 4 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1, \\ y = 4. \end{cases} \end{aligned}$$

Ответ: $\{(1, 4)\}$.

Задача 70. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 5y + 4x = \sqrt{16x^2 - 25y^2}, \\ \sqrt{x+8} = x + 2. \end{cases}$$

Решение. Второе уравнение системы

$$\begin{aligned} & \sqrt{x+8} = x + 2 \iff \begin{cases} x + 2 \geq 0, \\ x + 8 = x^2 + 4x + 4 \end{cases} \iff \\ \iff & \begin{cases} x \geq -2, \\ x^2 + 3x - 4 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq -2, \\ (x+4)(x-1) = 0 \end{cases} \iff x = 1. \end{aligned}$$

При $x = 1$ первое уравнение системы примет вид

$$5y + 4 = \sqrt{16 - 25y^2} \iff \begin{cases} 5y + 4 \geq 0, \\ 25y^2 + 40y + 16 = 16 - 25y^2 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} y \geq -\frac{4}{5}, \\ (5y + 4)y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = -\frac{4}{5}, \\ y = 0. \end{cases}$$

Тогда решениями системы будут пары чисел $(1, -\frac{4}{5})$ и $(1, 0)$.

Ответ: $\{(1, -\frac{4}{5}), (1, 0)\}$.

Задача 71. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 4x + y = \sqrt{16x^2 - y^2}, \\ \sqrt{x + 15} = x + 3. \end{cases} \quad \text{Ответ: } \{(1, -4), (1, 0)\}.$$

Задача 72. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{2xy} = 8\sqrt{2}, \\ \sqrt{x} + \sqrt{y} = 4. \end{cases} \quad (61)$$

Решение. Уравнение

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} = 4 \iff \begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \\ x + y + 2\sqrt{xy} = 16. \end{cases}$$

Тогда, умножив обе части первого уравнения системы (61) на $\sqrt{2}$, составляем равносильную ей систему

$$\begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \\ \sqrt{2x^2 + 2y^2} + 2\sqrt{xy} = 16, \\ x + y + 2\sqrt{xy} = 16. \end{cases} \quad (62)$$

Вычитая почленно из первого уравнения системы (62) второе уравнение, получим иррациональное уравнение

$$\sqrt{2x^2 + 2y^2} = x + y,$$

которое в силу условий $x \geq 0$ и $y \geq 0$ равносильно уравнению второй степени

$$\begin{aligned} 2x^2 + 2y^2 = (x + y)^2 &\iff 2x^2 + 2y^2 = x^2 + 2xy + y^2 \iff \\ &\iff x^2 - 2xy + y^2 = 0 \iff (x - y)^2 = 0 \iff y = x. \end{aligned}$$

Тогда система (62) равносильна системе

$$\begin{cases} x \geq 0, \\ y = x, \\ x + y + 2\sqrt{xy} = 16 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 0, \\ y = x, \\ x = 4 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 4, \\ y = 4. \end{cases}$$

Ответ: $\{(4, 4)\}$.

Задача 73. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt[4]{x+y} - \sqrt[4]{x-y} = 2, \\ \sqrt{x+y} - \sqrt{x-y} = 8. \end{cases} \quad (63)$$

Решение. Пусть

$$\sqrt[4]{x+y} = u, \quad \text{а} \quad \sqrt[4]{x-y} = v.$$

Тогда система (63) примет вид

$$\begin{aligned} \begin{cases} u - v = 2, \\ u^2 - v^2 = 8 \end{cases} &\iff \begin{cases} u - v = 2, \\ (u - v)(u + v) = 8 \end{cases} \iff \begin{cases} u - v = 2, \\ u + v = 4 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} (u - v) + (u + v) = 2 + 4, \\ (u + v) - (u - v) = 4 - 2 \end{cases} \iff \begin{cases} u = 3, \\ v = 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Следовательно, система (63) равносильна системе

$$\begin{cases} \sqrt[4]{x+y} = 3, \\ \sqrt[4]{x-y} = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x+y = 81, \\ x-y = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 41, \\ y = 40. \end{cases}$$

Ответ: $\{(41, 40)\}$.

Задача 74. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt[4]{x+y} + \sqrt[4]{x-y} = 4, \\ \sqrt{x+y} - \sqrt{x-y} = 8. \end{cases} \quad \text{Ответ: } \{(41, 40)\}.$$

Задача 75. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \frac{x-y\sqrt{x^2-y^2}}{\sqrt{1-x^2+y^2}} = 2, \\ \frac{y-x\sqrt{x^2-y^2}}{\sqrt{1-x^2+y^2}} = \frac{7}{4}. \end{cases} \quad (64)$$

Решение. Сложением и вычитанием уравнений систему (64) приводим к равносильной системе

$$\begin{cases} \frac{(x+y)(1-\sqrt{x^2-y^2})}{\sqrt{1-x^2+y^2}} = \frac{15}{4}, \\ \frac{(x-y)(1+\sqrt{x^2-y^2})}{\sqrt{1-x^2+y^2}} = \frac{1}{4}. \end{cases} \quad (65)$$

Перемножим уравнения системы (65):

$$\frac{(x^2-y^2)(1-x^2+y^2)}{1-x^2+y^2} = \frac{15}{16} \implies x^2-y^2 = \frac{15}{16}.$$

Тогда из первого уравнения системы (65) получаем, что

$$\frac{(x+y)\left(1-\frac{\sqrt{15}}{4}\right)}{\frac{1}{4}} = \frac{15}{4} \iff x+y = \frac{15}{4(4-\sqrt{15})} \iff$$

$$\Leftrightarrow x + y = \frac{15(4 + \sqrt{15})}{4}.$$

Из второго уравнения системы (65) получаем¹, что

$$\frac{(x - y)\left(1 + \frac{\sqrt{15}}{4}\right)}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow x - y = \frac{1}{4(4 + \sqrt{15})} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x - y = \frac{4 - \sqrt{15}}{4}.$$

Следовательно, система (64) равносильна системе

$$\begin{cases} x + y = \frac{15(4 + \sqrt{15})}{4}, \\ x - y = \frac{4 - \sqrt{15}}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{32 + 7\sqrt{15}}{4}, \\ y = 7 + 2\sqrt{15}. \end{cases}$$

Ответ: $\left\{ \left(\frac{32 + 7\sqrt{15}}{4}, 7 + 2\sqrt{15} \right) \right\}$.

Задача 76. Сумма $x + y$ решений системы уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{\frac{x+1}{y}} + \sqrt{\frac{y}{x+1}} = 2, \\ x + y = xy - 1 \end{cases} \quad (66)$$

равна...

Решение. Учитывая, что $y \neq 0$, второе уравнение системы (66) приводим к виду

$$x + 1 = y(x - 1) \Leftrightarrow \frac{x + 1}{y} = x - 1.$$

¹Можно использовать, что $x^2 - y^2 = \frac{15}{4}$, а $x + y = \frac{15(4 + \sqrt{15})}{4}$.

Тогда из первого уравнения системы (66) получаем уравнение¹ :

$$\sqrt{x-1} + \frac{1}{\sqrt{x-1}} = 2 \iff \sqrt{x-1} = 1 \iff x-1 = 1 \iff x = 2,$$

так как сумма двух взаимно обратных чисел не превышает двух, и равна двум, когда эти числа равны единице.

¹Уравнение можно решить с помощью равносильностного перехода

$$f(x) + \frac{1}{f(x)} = c + \frac{1}{c} \iff \begin{cases} f(x) = c, \\ f(x) = \frac{1}{c}. \end{cases}$$

Уравнение можно решить и непосредственно:

$$\begin{aligned} \sqrt{x-1} + \frac{1}{\sqrt{x-1}} = 2 &\iff \frac{(\sqrt{x-1})^2 - 2\sqrt{x-1} + 1}{\sqrt{x-1}} = 0 \iff \\ &\iff \frac{(\sqrt{x-1} - 1)^2}{\sqrt{x-1}} = 0 \iff \sqrt{x-1} = 1 \iff x-1 = 1 \iff x = 2. \end{aligned}$$

Также можно использовать связь между средним арифметическим и средним геометрическим положительных чисел $a = \sqrt{x-1}$ и $b = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$, заключающуюся в том, что

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab},$$

причём равенство имеет место лишь при $b = a$.

При этом учитывается, что

$$ab = \sqrt{x-1} \cdot \frac{1}{\sqrt{x-1}} = 1,$$

а $b = a$ при $\sqrt{x-1} = 1$.

Заметим, что аналогичным образом решается первое уравнение системы (66):

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{x+1}{y}} + \sqrt{\frac{y}{x+1}} = 2 &\iff \sqrt{\frac{x+1}{y}} + \frac{1}{\sqrt{\frac{x+1}{y}}} = 2 \iff \\ &\iff \sqrt{\frac{x+1}{y}} = 1 \iff \frac{x+1}{y} = 1. \end{aligned}$$

Теперь из того, что $y = \frac{x+1}{x-1}$, при $x = 2$ находим $y = 3$.

Итак, решением системы (66) будет упорядоченная пара $(2, 3)$.
Сумма $x + y = 2 + 3 = 5$. *Ответ:* 5.

Задача 77. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \frac{12}{\sqrt{2x-3}} + \frac{5}{\sqrt{3y-1}} = 5, \\ \frac{8}{\sqrt{2x-3}} + \frac{15}{\sqrt{3y-1}} = 8 \end{cases}$$

и в ответе укажите значение y .

а) 2; б) $\frac{49}{32}$; в) $\frac{15}{4}$; г) $\frac{29}{12}$; д) 5.

Решение. Замены

$$\begin{cases} \frac{4}{\sqrt{2x-3}} = u, \\ \frac{5}{\sqrt{3y-1}} = v \end{cases}$$

приводят к линейной системе

$$\begin{cases} 3u + v = 5 \\ 2u + 3v = 8. \end{cases}$$

Отсюда $u = 1$, $v = 2$. Неизвестные x и y найдём из системы

$$\begin{cases} \frac{4}{\sqrt{2x-3}} = 1, \\ \frac{5}{\sqrt{3y-1}} = 2 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} \sqrt{2x-3} = 4, \\ \sqrt{3y-1} = \frac{5}{2}. \end{cases}$$

Получаем $x = \frac{19}{2}$, $y = \frac{29}{12}$. *Ответ:* г).

§ 2. НЕРАВЕНСТВА С РАДИКАЛАМИ

1. Неравенство $\sqrt{f(x)} < g(x)$

Неравенство, содержащее радикал,

$$\sqrt{f(x)} < g(x) \quad (1)$$

будем решать методом эквивалентных преобразований. При этом будем основываться на следующем свойстве числовых неравенств: если числа a и b неотрицательные, то $a > b$ тогда и только тогда, когда $a^2 > b^2$. Это свойство составляет равносильность¹

$$a > b \geq 0 \iff a^2 > b^2, a > 0, b \geq 0. \quad (2)$$

Сначала установим условия, при которых неравенство (1) имеет смысл. Это $f(x) \geq 0$.

Если $f(x) \geq 0$, то и $\sqrt{f(x)} \geq 0$. Тогда из строгого неравенства (1) следует, что $g(x) > 0$.

Если $f(x) \geq 0$ и $g(x) > 0$, то неравенство (1) есть строгое неравенство двух неотрицательных выражений $\sqrt{f(x)} \geq 0$ и $g(x) > 0$. В соответствии с равносильностью (2) заключаем, что неравенство

¹Эта равносильность может быть доказана с использованием свойств возрастающей (обратимой) функции.

Функция

$$y(x) = x^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

является возрастающей на числовом луче $[0; +\infty)$. Поэтому для её значений справедлива равносильность

$$x_1 > x_2 \geq 0 \iff x_1^2 > x_2^2, x_1 > 0, x_2 \geq 0.$$

$$\boxed{\sqrt{f(x)} < g(x) \iff \begin{cases} f(x) \geq 0, \\ g(x) > 0, \\ f(x) < g^2(x). \end{cases}} \quad (3)$$

Аналогично решается неравенство с радикалом чётной степени

$$\boxed{{}^{2n}\sqrt{f(x)} < g(x) \iff \begin{cases} f(x) \geq 0, \\ g(x) > 0, \\ f(x) < g^{2n}(x) \end{cases} \quad \text{при } n \in \mathbb{N}.} \quad (4)$$

Частным видом является неравенство

$$\boxed{{}^{2n}\sqrt{f(x)} < {}^{2n}\sqrt{h(x)} \iff \begin{cases} f(x) \geq 0, \\ h(x) > 0, \\ f(x) < h(x) \end{cases} \iff} \quad (5)$$

$$\iff \begin{cases} f(x) \geq 0, \\ f(x) < h(x) \end{cases} \quad \text{при } n \in \mathbb{N}.$$

Пример 1. Неравенство¹

$$\sqrt{2x-1} < x-2 \quad (6)$$

в соответствии с (3) равносильно системе

$$\begin{cases} 2x-1 \geq 0, \\ x-2 > 0, \\ 2x-1 < (x-2)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 0,5, \\ x > 2, \\ x^2 - 6x + 5 > 0 \end{cases} \iff$$

¹Другой способ решения приведён в примере 3 из пункта 6.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x > 2, \\ (x-1)(x-5) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 2, \\ \begin{cases} x < 1, \\ x > 5 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow x > 5.$$

Пример 2. При любом натуральном n согласно равносильности (5) строгое неравенство

$$\begin{aligned} 2\sqrt[n]{x-2} - 2\sqrt[n]{2x-1} < 0 &\Leftrightarrow 2\sqrt[n]{x-2} < 2\sqrt[n]{2x-1} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x-2 \geq 0, \\ x-2 < 2x-1 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2, \\ x > -1 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 2. \end{aligned}$$

2. Неравенство $\sqrt{f(x)} \leq g(x)$

Неравенство с радикалом

$$\sqrt{f(x)} \leq g(x) \tag{1}$$

имеет смысл при $f(x) \geq 0$.

Если $f(x) \geq 0$, то и $\sqrt{f(x)} \geq 0$. Тогда из нестрогого неравенства (1) следует, что $g(x) \geq 0$.

При $f(x) \geq 0$ и $g(x) \geq 0$ неравенство (1) есть нестрогое неравенство двух неотрицательных выражений $\sqrt{f(x)}$ и $g(x)$. На основании равносильностей (5) из пункта 1 параграфа 1:

$$a = b \geq 0 \Leftrightarrow a^2 = b^2, a \geq 0, b \geq 0,$$

и (2) из пункта 1:

$$a > b \geq 0 \Leftrightarrow a^2 > b^2, a > 0, b \geq 0,$$

закключаем, что неравенство

$$\sqrt{f(x)} \leq g(x) \iff \begin{cases} f(x) \geq 0, \\ g(x) \geq 0, \\ f(x) \leq g^2(x). \end{cases} \quad (2)$$

Аналогично решается неравенство с радикалом чётной степени

$${}^{2n}\sqrt{f(x)} \leq g(x) \iff \begin{cases} f(x) \geq 0, \\ g(x) \geq 0, \\ f(x) \leq g^{2n}(x) \end{cases} \quad \text{при } n \in \mathbb{N}. \quad (3)$$

Частным видом является неравенство

$$\begin{aligned} {}^{2n}\sqrt{f(x)} \leq {}^{2n}\sqrt{h(x)} &\iff \begin{cases} f(x) \geq 0, \\ h(x) \geq 0, \\ f(x) \leq h(x) \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} f(x) \geq 0, \\ f(x) \leq h(x) \end{cases} \quad \text{при } n \in \mathbb{N}. \end{aligned} \quad (4)$$

Пример 1. Неравенство¹

$$\sqrt{7+x} \leq 5-x \quad (5)$$

в соответствии с (2) равносильно системе

$$\begin{cases} 7+x \geq 0, \\ 5-x \geq 0, \\ 7+x \leq (5-x)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} -7 \leq x \leq 5, \\ x^2 - 11x + 18 \geq 0 \end{cases} \iff$$

¹Другой способ решения приведён в примере 4 из пункта 6.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -7 \leq x \leq 5, \\ (x-2)(x-9) \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -7 \leq x \leq 5, \\ \begin{cases} x \leq 2, \\ x \geq 9 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow -7 \leq x \leq 2.$$

Пример 2. При любом натуральном n согласно (4) неравенство

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{2x+1} \geq \sqrt[n]{3-x} &\Leftrightarrow \begin{cases} 3-x \geq 0, \\ 2x+1 \geq 3-x \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 3, \\ x \geq \frac{2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \frac{2}{3} \leq x \leq 3. \end{aligned}$$

3. Неравенство $\sqrt{f(x)} > g(x)$

Неравенство, содержащее радикал,

$$\sqrt{f(x)} > g(x) \tag{1}$$

имеет смысл при $f(x) \geq 0$.

Если $f(x) \geq 0$, то и $\sqrt{f(x)} \geq 0$.

Относительно выражения $g(x)$ рассмотрим две логические возможности, когда $g(x) < 0$ и когда $g(x) \geq 0$.

Если $g(x) < 0$, то неравенство (1) выполняется всегда, если только оно имеет смысл.

Если $g(x) \geq 0$, то неравенство (1) есть строгое неравенство двух неотрицательных выражений $\sqrt{f(x)}$ и $g(x)$. В этом случае на основании равносильности (2) из пункта 1

$$a > b \geq 0 \Leftrightarrow a^2 > b^2, \quad a > 0, \quad b \geq 0,$$

неравенство (1) приводим к равносильному неравенству

$$f(x) > g^2(x).$$

Итак, неравенство

$$\sqrt{f(x)} > g(x) \iff \left[\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} f(x) \geq 0, \\ g(x) < 0, \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} f(x) \geq 0, \\ g(x) \geq 0, \\ f(x) > g^2(x). \end{array} \right. \end{array} \right. \quad (2)$$

Из неравенства

$$f(x) > g^2(x),$$

входящего во вторую систему равносильности (2), следует, что $f(x) > 0$. Значит, система

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) \geq 0, \\ g(x) \geq 0, \\ f(x) > g^2(x) \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} g(x) \geq 0, \\ f(x) > g^2(x). \end{array} \right.$$

Следовательно, для неравенства (1) имеет место равносильность

$$\sqrt{f(x)} > g(x) \iff \left[\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} f(x) \geq 0, \\ g(x) < 0, \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} g(x) \geq 0, \\ f(x) > g^2(x). \end{array} \right. \end{array} \right. \quad (3)$$

Неравенство (1) будем решать, используя равносильностные переходы (2) и (3):

$$\sqrt{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0, \\ g(x) < 0, \\ f(x) \geq 0, \\ g(x) \geq 0, \\ f(x) > g^2(x). \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0, \\ g(x) < 0, \\ g(x) \geq 0, \\ f(x) > g^2(x). \end{cases}$$

Аналогично решается неравенство с радикалом чётной степени

$${}^{2n}\sqrt{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0, \\ g(x) < 0, \\ f(x) \geq 0, \\ g(x) \geq 0, \\ f(x) > g^{2n}(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0, \\ g(x) < 0, \\ g(x) \geq 0, \\ f(x) > g^{2n}(x) \end{cases} \quad (4)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0, \\ g(x) < 0, \\ g(x) \geq 0, \\ f(x) > g^{2n}(x) \end{cases} \quad \text{при } n \in \mathbb{N}.$$

Пример 1. Неравенство¹

$$\sqrt{10 - u^2} > 4 - u \quad (5)$$

в соответствии с равносильностью (3) равносильно совокупности, состоящей из двух систем

¹Другой способ решения приведён в примере 5 из пункта 6.

$$\begin{aligned} & \left[\begin{cases} 10 - u^2 \geq 0, \\ 4 - u < 0, \end{cases} \iff \left[\begin{cases} |u| \leq \sqrt{10}, \\ u > 4, \end{cases} \iff \right. \\ & \left. \left[\begin{cases} 4 - u \geq 0, \\ 10 - u^2 > (4 - u)^2 \end{cases} \iff \left[\begin{cases} u \leq 4, \\ u^2 - 4u + 3 < 0 \end{cases} \iff \right. \right. \\ & \iff \left. \begin{cases} u \leq 4, \\ (u - 1)(u - 3) < 0 \end{cases} \iff \begin{cases} u \leq 4, \\ 1 < u < 3 \end{cases} \iff 1 < u < 3. \right. \end{aligned}$$

4. Неравенство $\sqrt{f(x)} \geq g(x)$

Неравенство, содержащее радикал,

$$\sqrt{f(x)} \geq g(x) \tag{1}$$

имеет смысл при $f(x) \geq 0$.

Если $f(x) \geq 0$, то и $\sqrt{f(x)} \geq 0$.

Относительно выражения $g(x)$ рассмотрим две логические возможности, когда $g(x) < 0$ и когда $g(x) \geq 0$.

Если $g(x) < 0$, то неравенство (1) выполняется всегда, если только оно имеет смысл.

Если $g(x) \geq 0$, то неравенство (1) есть нестрогое неравенство двух неотрицательных выражений $\sqrt{f(x)}$ и $g(x)$. В этом случае на основании равносильностей (5) из пункта 1 параграфа 1:

$$a = b \geq 0 \iff a^2 = b^2, a \geq 0, b \geq 0,$$

и (2) пункта 1:

$$a > b \geq 0 \iff a^2 > b^2, a > 0, b \geq 0,$$

неравенство (1) приводим к равносильному нестрогому

неравенству

$$f(x) \geq g^2(x).$$

Итак, неравенство

$$\sqrt{f(x)} \geq g(x) \iff \left[\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} f(x) \geq 0, \\ g(x) < 0, \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} f(x) \geq 0, \\ g(x) \geq 0, \\ f(x) \geq g^2(x). \end{array} \right. \end{array} \right. \quad (2)$$

Из неравенства

$$f(x) \geq g^2(x),$$

входящего во вторую систему равносильности (2), следует, что $f(x) \geq 0$. Значит, система

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) \geq 0, \\ g(x) \geq 0, \\ f(x) \geq g^2(x) \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} g(x) \geq 0, \\ f(x) \geq g^2(x). \end{array} \right.$$

Следовательно, для неравенства (1) имеет место равносильность

$$\sqrt{f(x)} \geq g(x) \iff \left[\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} f(x) \geq 0, \\ g(x) < 0, \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} g(x) \geq 0, \\ f(x) \geq g^2(x). \end{array} \right. \end{array} \right. \quad (3)$$

Неравенство (1) будем решать, используя равносильностные переходы (2) и (3):

$$\begin{aligned} & \left[\begin{cases} x^2 - 1 \geq 0, \\ x - 2 < 0, \\ x - 2 \geq 0, \\ x^2 - 1 \geq (x - 2)^2 \end{cases} \right] \iff \left[\begin{cases} |x| \geq 1, \\ x < 2, \\ x - 2 \geq 0, \\ 4x - 5 \geq 0 \end{cases} \right] \iff \\ \iff & \left[\begin{cases} \left[\begin{cases} x \leq -1, \\ x \geq 1, \\ x < 2, \end{cases} \right] \\ \left[\begin{cases} x \geq 2, \\ x \geq 1,25 \end{cases} \right] \end{cases} \right] \iff \left[\begin{cases} x \leq -1, \\ 1 \leq x < 2, \\ x \geq 2 \end{cases} \right] \iff \left[\begin{cases} x \leq -1, \\ x \geq 1. \end{cases} \right] \end{aligned}$$

5. Неравенства с радикалами нечётной степени

Неравенства с радикалом нечётной степени

$${}^{2n+1}\sqrt{f(x)} < g(x) \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad (1)$$

$${}^{2n+1}\sqrt{f(x)} \leq g(x) \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad (2)$$

$${}^{2n+1}\sqrt{f(x)} > g(x) \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad (3)$$

$${}^{2n+1}\sqrt{f(x)} \geq g(x) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (4)$$

имеют смысл при всех тех значениях переменной x , при которых определены выражения $f(x)$ и $g(x)$. Это следует из того, что корень нечётной степени извлекается из любого действительного числа.

Функция

$$y(x) = x^{2n+1} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

при любом фиксированном натуральном n является возрастающей с множеством значений $E(y) = \mathbb{R}$.

Поэтому при любом натуральном n имеют место равносильности

$$x_1^{2n+1} = x_2^{2n+1} \iff x_1 = x_2$$

и

$$x_1^{2n+1} < x_2^{2n+1} \iff x_1 < x_2.$$

Тогда при любом натуральном n неравенства (1) — (4) могут быть решены на основании следующих равносильностей:

$$\boxed{2n+1\sqrt{f(x)} < g(x) \iff f(x) < g^{2n+1}(x) \text{ при } n \in \mathbb{N};} \quad (5)$$

$$\boxed{2n+1\sqrt{f(x)} \leq g(x) \iff f(x) \leq g^{2n+1}(x) \text{ при } n \in \mathbb{N};} \quad (6)$$

$$\boxed{2n+1\sqrt{f(x)} > g(x) \iff f(x) > g^{2n+1}(x) \text{ при } n \in \mathbb{N};} \quad (7)$$

$$\boxed{2n+1\sqrt{f(x)} \geq g(x) \iff f(x) \geq g^{2n+1}(x) \text{ при } n \in \mathbb{N}.} \quad (8)$$

Пример 1. В соответствии с равносильностью (7) неравенство

$$\sqrt[3]{x(x^2 + 3)} > x - 1 \iff x(x^2 + 3) > (x - 1)^3 \iff 3x^2 + 1 > 0.$$

Решением является любое действительное число.

Пример 2. В соответствии с равносильностью (8) неравенство

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{x^3 + 2x^2 - 1} \geq x + 1 &\iff x^3 + 2x^2 - 1 \geq (x + 1)^3 \iff \\ \iff x^3 + 2x^2 - 1 \geq x^3 + 3x^2 + 3x + 1 &\iff x^2 + 3x + 2 \leq 0 \iff \\ \iff (x + 2)(x + 1) \leq 0 &\iff -2 \leq x \leq -1. \end{aligned}$$

6. Специальные методы

Исходя из условий, при которых произведение двух выражений является отрицательным, положительным, неположительным, неотрицательным и всякий раз имеет смысл, укажем равносильности для решения неравенств с радикалом видов:

$$g(x) \sqrt[2n]{f(x)} < 0 \iff \begin{cases} f(x) > 0, \\ g(x) < 0 \end{cases} \text{ при } n \in \mathbb{N}; \quad (1)$$

$$g(x) \sqrt[2n]{f(x)} > 0 \iff \begin{cases} f(x) > 0, \\ g(x) > 0 \end{cases} \text{ при } n \in \mathbb{N}; \quad (2)$$

$$g(x) \sqrt[2n]{f(x)} \leq 0 \iff \begin{cases} f(x) = 0, \\ x \in D(g), \\ f(x) > 0, \\ g(x) \leq 0 \end{cases} \text{ при } n \in \mathbb{N}; \quad (3)$$

$$g(x) \sqrt[2n]{f(x)} \geq 0 \iff \begin{cases} f(x) = 0, \\ x \in D(g), \\ f(x) > 0, \\ g(x) \geq 0 \end{cases} \text{ при } n \in \mathbb{N}. \quad (4)$$

Пример 1. Решим неравенства

$$(x^2 - 1) \sqrt[2n]{x^2 + x - 2} < 0, \quad n \in \mathbb{N}, \quad (5)$$

и

$$(x^2 - 1) \sqrt[2n]{x^2 + x - 2} > 0, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (6)$$

При любом натуральном n неравенство (5) равносильно системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} x^2 + x - 2 > 0, \\ x^2 - 1 < 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} (x+2)(x-1) > 0, \\ (x+1)(x-1) < 0 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} \begin{cases} x-1 < 0, \\ x+2 < 0, \\ x+1 > 0, \end{cases} \\ \begin{cases} x-1 > 0, \\ x+2 > 0, \\ x+1 < 0 \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} \begin{cases} x < 1, \\ x < -2, \\ x > -1, \end{cases} \\ \begin{cases} x > 1, \\ x > -2, \\ x < -1, \end{cases} \end{cases} \end{aligned}$$

у которой нет решений; а неравенство (6) равносильно системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} x^2 + x - 2 > 0, \\ x^2 - 1 > 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} (x+2)(x-1) > 0, \\ (x+1)(x-1) > 0 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} \begin{cases} x-1 < 0, \\ x+2 < 0, \\ x+1 < 0, \end{cases} \\ \begin{cases} x-1 > 0, \\ x+2 > 0, \\ x+1 > 0 \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} \begin{cases} x < 1, \\ x < -2, \\ x < -1, \end{cases} \\ \begin{cases} x > 1, \\ x > -2, \\ x > -1 \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} x < -2, \\ x > 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Пример 2. Решим неравенства

$$(x^2 - 9)^{2n} \sqrt{x^2 + 3x - 10} \leq 0, \quad n \in \mathbb{N}, \quad (7)$$

и

$$(x^2 - 9)^{2n} \sqrt{x^2 + 3x - 10} \geq 0, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (8)$$

Неравенства (7) и (8) имеют смысл, когда

$$x^2 + 3x - 10 \geq 0 \iff \begin{cases} x^2 + 3x - 10 = 0, \\ x^2 + 3x - 10 > 0. \end{cases}$$

Если

$$x^2 + 3x - 10 = 0 \iff (x + 5)(x - 2) = 0 \iff \begin{cases} x = -5, \\ x = 2, \end{cases}$$

то при любом натуральном n выражения, расположенные в левой части неравенств (7) и (8), равны нулю, и неравенства (7) и (8), будучи нестрогими, выполняются.

Остаётся рассмотреть случай, когда $x^2 + 3x - 10 > 0$.

При любом натуральном n решениями неравенства (7) будут решения системы неравенств

$$\begin{aligned} \begin{cases} x^2 + 3x - 10 > 0, \\ x^2 - 9 \leq 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} (x + 5)(x - 2) > 0, \\ |x| \leq 3 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} \begin{cases} x < -5, \\ x > 2, \end{cases} \\ -3 \leq x \leq 3 \end{cases} \iff 2 < x \leq 3, \end{aligned}$$

а неравенства (8) — решения системы неравенств

$$\begin{aligned} \begin{cases} x^2 + 3x - 10 > 0, \\ x^2 - 9 \geq 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} (x + 5)(x - 2) > 0, \\ |x| \geq 3 \end{cases} \iff \begin{cases} \begin{cases} x < -5, \\ x > 2, \end{cases} \\ |x| \geq 3 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} \begin{cases} x < -5, \\ |x| \geq 3, \end{cases} \\ \begin{cases} x > 2, \\ |x| \geq 3 \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} \begin{cases} x < -5, \\ -x \geq 3, \end{cases} \\ \begin{cases} x > 2, \\ x \geq 3 \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} x < -5, \\ x \geq 3. \end{cases} \end{aligned}$$

Следовательно, при любом натуральном n множеством решений неравенства (7) будет множество $\{-5\} \cup [2; 3]$, а неравенства (8) — множество $(-\infty; -5] \cup \{2\} \cup [3; +\infty)$.

Для решения неравенств

$$f(x) > 0, \quad f(x) < 0, \quad f(x) \geq 0, \quad f(x) \leq 0$$

методом числовых промежутков поступаем следующим образом.

1. Находим область определения функции f .
2. Находим нули функции f .
3. Разбиваем область определения $D(f)$ нулями функции f на числовые промежутки, на каждом из которых функция f непрерывна.
4. Определяем знак функции f на каждом из выделенных числовых промежутков, исходя из того, что на каждом таком промежутке функция f сохраняет знак.
5. Составляем множество решений рассматриваемого неравенства.

Пример 3. Рассмотрим функцию¹

$$f(x) = \sqrt{2x-1} - x + 2 \quad \forall x \in [0,5; +\infty),$$

с помощью которой неравенство (6) из пункта 1 запишем в виде

$$f(x) < 0.$$

Тогда множеством решений неравенства (6) из пункта 1 будет множество тех значений аргумента x , при которых функция f принимает отрицательные значения.

Уравнение

$$\begin{aligned} \sqrt{2x-1} = x-2 &\iff \begin{cases} x-2 \geq 0, \\ 2x-1 = (x-2)^2 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} x \geq 2, \\ x^2 - 6x + 5 = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x \geq 2, \\ (x-1)(x-5) = 0 \end{cases} \iff x = 5. \end{aligned}$$

Функция f имеет один нуль $x = 5$ и является непрерывной. По-

¹Другой способ решения приведён в примере 1 из пункта 1.

этому на числовых промежутках $[0,5; 5)$ и $(5; +\infty)$ она сохраняет знак.

Так как

$$1 \in [0,5; 5), \quad \text{а} \quad f(1) = 1 - 1 + 2 = 2 > 0,$$

$$13 \in (5; +\infty), \quad \text{а} \quad f(13) = 5 - 13 + 2 = -6 < 0,$$

то

$$f(x) > 0 \quad \forall x \in [0,5; 5) \quad \text{и} \quad f(x) < 0 \quad \forall x \in (5; +\infty).$$

Следовательно, решением строгого неравенства (6) из пункта 1 будет открытый числовой луч $(5; +\infty)$.

Пример 4. Неравенство¹ (5) из пункта 2 запишем в виде

$$f(x) \leq 0,$$

где

$$f(x) = x - 5 + \sqrt{7+x} \quad \forall x \in [-7; +\infty).$$

Функция f возрастает и обращается в нуль при $x = 2$.

Поэтому решением нестрогого неравенства (5) из пункта 2 будет отрезок $[-7; 2]$.

Пример 5. Рассмотрим функцию²

$$f(u) = u - 4 + \sqrt{10 - u^2} \quad \forall u \in [-\sqrt{10}; \sqrt{10}],$$

с помощью которой неравенство (5) из пункта 3 запишем в виде

$$f(u) > 0.$$

Тогда множеством решений неравенства (5) из пункта 3 будет множество тех значений аргумента u , при которых функция f принимает положительные значения.

Уравнение

$$\sqrt{10 - u^2} = 4 - u \iff \begin{cases} 4 - u \geq 0, \\ 10 - u^2 = (4 - u)^2 \end{cases} \iff$$

¹Другой способ решения приведён в примере 1 из пункта 2.

²Другой способ решения приведён в примере 1 из пункта 3.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4 - u \geq 0, \\ u^2 - 4u + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u \leq 4, \\ (u - 1)(u - 3) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = 1, \\ u = 3. \end{cases}$$

Функция f имеет два нуля $u = 1$ и $u = 3$ и является непрерывной. Поэтому на числовых промежутках $[-\sqrt{10}; 1)$, $(1; 3)$ и $(3; \sqrt{10}]$ она сохраняет знак.

Так как

$$0 \in [-\sqrt{10}; 1), \quad \text{а} \quad f(0) = \sqrt{10} - 4 < 0,$$

$$2 \in (1; 3), \quad \text{а} \quad f(2) = \sqrt{6} + 2 - 4 = \sqrt{6} - 2 > 0,$$

$$\sqrt{10} \in (3; \sqrt{10}], \quad \text{а} \quad f(\sqrt{10}) = \sqrt{10} - 4 < 0,$$

то

$$f(x) < 0 \quad \forall x \in [-\sqrt{10}; 1) \cup (3; \sqrt{10}] \quad \text{и} \quad f(x) > 0 \quad \forall x \in (1; 3).$$

Следовательно, решением строгого неравенства (5) из пункта 3 будет интервал $(1; 3)$.

Пример 6. Рассмотрим функцию¹

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 1} - x + 2 \quad \forall x \in (-\infty; -1] \cup [1; +\infty),$$

с помощью которой неравенство (5) из пункта 4 запишем в виде

$$f(x) \geq 0.$$

Тогда множеством решений неравенства (5) из пункта 4 будет множество тех значений аргумента x , при которых функция f принимает неотрицательные значения.

Уравнение

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 - 1} = x - 2 &\Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 \geq 0, \\ x^2 - 1 = (x - 2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2, \\ 4x - 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2, \\ x = 1,25 \end{cases} \end{aligned}$$

¹Другой способ решения приведён в примере 1 из пункта 4.

и, следовательно, не имеет решений.

Функция f является непрерывной и не имеет нулей. Поэтому на числовых промежутках $(-\infty; -1]$ и $[1; +\infty)$ она сохраняет знак.

Так как

$$-2 \in (-\infty; -1], \quad \text{а} \quad f(-2) = \sqrt{3} + 2 + 2 = \sqrt{3} + 4 > 0,$$

$$2 \in [1; +\infty), \quad \text{а} \quad f(2) = \sqrt{3} - 2 + 2 = \sqrt{3} > 0,$$

то

$$f(x) > 0 \quad \forall x \in (-\infty; -1] \cup [1; +\infty).$$

Множеством решений нестрогого неравенства (5) из пункта 4 будет множество $(-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$.

Пример 7. Решим неравенство

$$\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{2x-1} \geq \sqrt[3]{x+1}. \quad (9)$$

Решение. Рассмотрим функцию

$$f(x) = \sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{2x-1} - \sqrt[3]{x+1} \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

с помощью которой неравенство (9) запишем в виде

$$f(x) \geq 0.$$

Тогда множеством решений неравенства (9) будет множество тех значений аргумента x , при которых функция f принимает неотрицательные значения.

Так как уравнение (8) из пункта 3 параграфа 1 имеет единственный корень $1\frac{1}{62}$, то непрерывная функция f имеет один нуль $x = 1\frac{1}{62}$.

Поэтому на числовых лучах $(-\infty; 1\frac{1}{62})$ и $(1\frac{1}{62}; +\infty)$ она сохраняет знак.

Так как

$$0 \in \left(-\infty; 1\frac{1}{62}\right), \quad \text{а} \quad f(0) = -1 - 1 - 1 = -3 < 0,$$

$$2 \in \left(1\frac{1}{62}; +\infty\right), \text{ а } f(2) = 1 + \sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{3} = 1 > 0,$$

то

$$f(x) < 0 \quad \forall x \in \left(-\infty; 1\frac{1}{62}\right) \text{ и } f(x) > 0 \quad \forall x \in \left(1\frac{1}{62}; +\infty\right).$$

Следовательно, множеством решений нестрогого неравенства (9) будет числовой луч $\left[1\frac{1}{62}; +\infty\right)$.

7. Задачи

Задача 1. Решите неравенство

$$\sqrt{2x+5} \leq 2x-1. \tag{1}$$

Решение. Способ 1. Неравенство (1) равносильно неравенству

$$\begin{aligned} (2x+5) - \sqrt{2x+5} - 6 &\geq 0 \iff \\ \iff (\sqrt{2x+5}+2)(\sqrt{2x+5}-3) &\geq 0 \iff \\ \iff \sqrt{2x+5} \geq 3 \iff 2x+5 &\geq 9 \iff x \geq 2. \end{aligned}$$

Способ 2. Уравнение (1) равносильно системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2x+5 \geq 0, \\ 2x-1 \geq 0, \\ 2x+5 \leq (2x-1)^2 \end{cases} &\iff \begin{cases} (2x-1)+6 \geq 0, \\ 2x-1 \geq 0, \\ 2x^2-3x-2 \geq 0 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} 2x-1 \geq 0, \\ (2x-1)(x-2) \geq 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} 2x-1 \geq 0, \\ x-2 \geq 0 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} 2(x-2)+3 \geq 0, \\ x-2 \geq 0 \end{cases} &\iff x-2 \geq 0 \iff x \geq 2. \end{aligned}$$

Способ 3. Уравнение

$$\begin{aligned} \sqrt{2x+5} = 2x-1 &\iff \begin{cases} 2x-1 \geq 0, \\ 2x+5 = (2x-1)^2 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} 2x-1 \geq 0, \\ 2x^2-3x-2=0 \end{cases} &\iff \begin{cases} 2x-1 \geq 0, \\ (2x+1)(x-2)=0 \end{cases} \iff x=2. \end{aligned}$$

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \sqrt{2x+5} - 2x + 1 \quad \forall x \in [-2,5; +\infty),$$

с помощью которой неравенство (1) запишем в виде

$$f(x) \leq 0.$$

Тогда множеством решений неравенства (1) будет множество тех значений аргумента x , при которых функция f принимает неположительные значения.

Функция f является непрерывной и имеет один нуль $x = 2$. Поэтому на числовых промежутках $[-2,5; 2)$ и $(2; +\infty)$ она сохраняет знак.

Так как

$$0 \in [-2,5; 2), \quad \text{а} \quad f(0) = \sqrt{5} + 1 > 0,$$

$$5 \in (2; +\infty), \quad \text{а} \quad f(5) = \sqrt{15} - 10 + 1 = \sqrt{15} - 9 < 0,$$

то

$$f(x) > 0 \quad \forall x \in [-2,5; 2) \quad \text{и} \quad f(x) < 0 \quad \forall x \in (2; +\infty).$$

Следовательно, множеством решений нестрогого неравенства (1) будет числовой луч $[2; +\infty)$.

Ответ: $[2; +\infty)$.

Задача 2. Решите неравенство

$$\sqrt{5x^2 + 61x} < 4\left(x + \frac{1}{2}\right). \quad (2)$$

Решение. Способ 1. Неравенство (2) имеет смысл при

$$\begin{cases} x + \frac{1}{2} > 0, \\ 5x^2 + 61x \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x + \frac{1}{2} > 0, \\ x(5x + 61) \geq 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x > -\frac{1}{2}, \\ \begin{cases} x \leq -12\frac{1}{5}, \\ x \geq 0 \end{cases} \end{cases} \iff x \geq 0.$$

Следовательно, неравенство (2) равносильно системе

$$\begin{cases} x \geq 0, \\ 5x^2 + 61x < 16\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 0, \\ 11x^2 - 45x + 4 > 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x \geq 0, \\ (11x - 1)(x - 4) > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 0, \\ \begin{cases} x < \frac{1}{11}, \\ x > 4 \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} 0 \leq x < \frac{1}{11}, \\ x > 4. \end{cases}$$

Способ 2. Уравнение

$$\sqrt{5x^2 + 61x} = 2(2x + 1) \iff \begin{cases} 2x + 1 \geq 0, \\ 5x^2 + 61x = 4(2x + 1)^2 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} 2x + 1 \geq 0, \\ 11x^2 - 45x + 4 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq -\frac{1}{2}, \\ (11x - 1)(x - 4) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{1}{11}, \\ x = 4. \end{cases}$$

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \sqrt{5x^2 + 61x} - 4x - 2 \quad \forall x \in \left(-\infty; -12\frac{1}{5}\right] \cup [0; +\infty),$$

с помощью которой неравенство (2) запишем в виде

$$f(x) < 0.$$

Тогда множеством решений неравенства (2) будет множество значений аргумента x , при которых функция f принимает отрицательные значения.

Функция f имеет два нуля $x = \frac{1}{11}$ и $x = 4$ и является непрерывной. Поэтому на числовых промежутках $(-\infty; -12\frac{1}{5}]$, $[0; \frac{1}{11})$, $(\frac{1}{11}; 4)$ и $(4; +\infty)$ она сохраняет знак.

Так как

$$-13 \in \left(-\infty; -12\frac{1}{5}\right], \quad \text{а} \quad f(-13) = \sqrt{52} + 52 - 2 = 50 + \sqrt{52} > 0,$$

$$0 \in \left[0; \frac{1}{11}\right), \quad \text{а} \quad f(0) = -2 < 0,$$

$$1 \in \left(\frac{1}{11}; 4\right), \quad \text{а} \quad f(1) = \sqrt{66} - 4 - 2 = \sqrt{66} - 6 > 0,$$

$$5 \in (4; +\infty), \quad \text{а} \quad f(5) = \sqrt{430} - 22 = \sqrt{430} - \sqrt{484} < 0,$$

то

$$f(x) > 0 \quad \forall x \in \left(-\infty; -12\frac{1}{5}\right] \cup \left(\frac{1}{11}; 4\right)$$

и

$$f(x) < 0 \quad \forall x \in \left[0; \frac{1}{11}\right) \cup (4; +\infty).$$

Следовательно, множеством решений строгого неравенства (2) будет множество $\left[0; \frac{1}{11}\right) \cup (4; +\infty)$. *Ответ:* $\left[0; \frac{1}{11}\right) \cup (4; +\infty)$.

Задача 3. Решите неравенство

$$\sqrt{1+8x^2} < 2x-1. \tag{3}$$

Решение. Неравенство (3) равносильно системе

$$\begin{cases} 1 + 8x^2 \geq 0, \\ 2x - 1 > 0, \\ 1 + 8x^2 < (2x - 1)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 0,5, \\ x(x + 1) < 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 0,5, \\ -1 < x < 0, \end{cases}$$

и не имеет решений. Ответ: \emptyset .

Задача 4. Решите неравенство:

а) $\sqrt{x^2 + x - 1} \leq x - 1$; б) $\sqrt{1 + 8x^2} \leq 2x - 1$.

Ответ: а) \emptyset ; б) \emptyset .

Задача 5. Решите неравенство

$$\sqrt{x^2 - 5x + 6} \leq 3x - 6. \quad (4)$$

Решение. Способ 1. Неравенство (4) равносильно системе

$$\begin{cases} 3x - 6 \geq 0, \\ x^2 - 5x + 6 \geq 0, \\ x^2 - 5x + 6 \leq (3x - 6)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x - 2 \geq 0, \\ (x - 2)(x - 3) \geq 0, \\ 8x^2 - 31x + 30 \geq 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x - 2 \geq 0, \\ (x - 2)(x - 3) \geq 0, \\ (8x - 15)(x - 2) \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2, \\ \begin{cases} x - 3 \geq 0, \\ 8x - 15 \geq 0 \end{cases} \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x = 2, \\ \begin{cases} x - 3 \geq 0, \\ 8(x - 3) + 9 \geq 0 \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2, \\ x \geq 3. \end{cases}$$

Способ 2. Уравнение

$$\sqrt{x^2 - 5x + 6} = 3x - 6 \iff \begin{cases} x - 2 \geq 0, \\ x^2 - 5x + 6 = 9(x - 2)^2 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x - 2 \geq 0, \\ (x - 2)(x - 3) - 9(x - 2)^2 = 0 \end{cases} \iff$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2, \\ (x-2)(8x-15) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 2.$$

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 6} - 3x + 6 \quad \forall x \in (-\infty; 2] \cup [3; +\infty),$$

с помощью которой неравенство (4) запишем в виде

$$f(x) \leq 0.$$

Тогда множеством решений неравенства (4) будет множество значений аргумента x , при которых функция f принимает неположительные значения.

Функция f является непрерывной и имеет один нуль $x = 2$. Поэтому на числовых лучах $(-\infty; 2)$ и $[3; +\infty)$ она сохраняет знак.

Так как

$$0 \in (-\infty; 2), \quad \text{а} \quad f(0) = \sqrt{6} + 6 > 0,$$

$$4 \in [3; +\infty), \quad \text{а} \quad f(4) = \sqrt{2} - 12 + 6 = \sqrt{2} - 6 < 0,$$

то

$$f(x) > 0 \quad \forall x \in (-\infty; 2) \quad \text{и} \quad f(x) < 0 \quad \forall x \in [3; +\infty).$$

Следовательно, множеством решений нестрогого неравенства (4) будет множество $\{2\} \cup [3; +\infty)$.

Ответ: $\{2\} \cup [3; +\infty)$.

Задача 6. Решите неравенство

$$x > \sqrt{x(1 + \sqrt{x(x-3)})}. \quad (5)$$

Решение. Из неравенства (5) следует, что

$$\begin{cases} x > 0, \\ x(x-3) \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0, \\ x \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 3.$$

Поэтому неравенство (5) равносильно системе

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x \geq 3, \\ x^2 > x(1 + \sqrt{x(x-3)}) \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 3, \\ \sqrt{x(x-3)} < x-1 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} x \geq 3, \\ x(x-3) < x^2 - 2x + 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 3, \\ x > -1 \end{cases} \iff x \geq 3. \end{aligned}$$

Ответ: $[3; +\infty)$.

Задача 7. Решите неравенство

$$\sqrt{\frac{(x+1)^2}{x-3}} > -2. \quad (6)$$

Решение. Неравенство (6) выполняется при всех тех значениях x , при которых оно имеет смысл.

Поэтому неравенство (6) равносильно нестроговому неравенству

$$\frac{(x+1)^2}{x-3} \geq 0 \iff \begin{cases} x = -1, \\ x > 3. \end{cases} \quad \text{Ответ: } \{-1\} \cup (3; +\infty).$$

Задача 8. Решите неравенство

$$\sqrt{x+11} > 9-x. \quad (7)$$

Решение. Способ 1. Неравенство (7) равносильно неравенству

$$\begin{aligned} (x+11) + \sqrt{x+11} - 20 > 0 & \iff (\sqrt{x+11}+5)(\sqrt{x+11}-4) > 0 \iff \\ & \iff \sqrt{x+11} > 4 \iff x+11 > 16 \iff x > 5. \end{aligned}$$

Способ 2. Неравенство (7) запишем в виде

$$f(x) > 0,$$

где

$$f(x) = x - 9 + \sqrt{x+11} \quad \forall x \in [-11; +\infty).$$

Функция f возрастает и обращается в нуль при $x = 5$. Поэтому

$$f(x) > 0 \quad \forall x \in (5; +\infty).$$

Способ 3. Неравенство (7) равносильно совокупности двух систем

$$\begin{aligned} & \left[\begin{cases} x + 11 \geq 0, \\ 9 - x < 0, \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq -11, \\ x > 9, \end{cases} \iff \\ & \left[\begin{cases} 9 - x \geq 0, \\ x + 11 > (9 - x)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x \leq 9, \\ x^2 - 19x + 70 < 0 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} x > 9, \\ \begin{cases} x \leq 9, \\ (x - 5)(x - 14) < 0 \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} x > 9, \\ \begin{cases} x \leq 9, \\ 5 < x < 14 \end{cases} \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} x > 9, \\ 5 < x \leq 9 \end{cases} \iff x > 5. \quad \text{Ответ: } (5; +\infty). \end{aligned}$$

Задача 9. Решите неравенство:

а) $\sqrt{x+5} > 7-x$; б) $\sqrt{x+3} \geq x+1$.

Ответ: а) $(4; +\infty)$; б) $[-3; 1]$.

Задача 10. Решите неравенство

$$\sqrt{(x+5)(3x+4)} > 4(x-1). \quad (8)$$

Решение. Способ 1. Неравенство (8) равносильно совокупности двух систем:

$$\begin{aligned} & \left\{ \begin{aligned} 4(x-1) < 0, \\ (x+5)(3x+4) \geq 0 \end{aligned} \right. \iff \begin{cases} x < 1, \\ \begin{cases} x \leq -5, \\ x \geq -1\frac{1}{3} \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} x \leq -5, \\ -1\frac{1}{3} \leq x < 1; \end{cases} \\ & \left\{ \begin{aligned} 4(x-1) \geq 0, \\ (x+5)(3x+4) > 16(x-1)^2 \end{aligned} \right. \iff \begin{cases} x-1 \geq 0, \\ 13x^2 - 51x - 4 < 0 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} x \geq 1, \\ (13x+1)(x-4) < 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 1, \\ -\frac{1}{13} < x < 4 \end{cases} \iff 1 \leq x < 4. \end{aligned}$$

Следовательно, множеством решений неравенства (8) будет множество $(-\infty; -5] \cup \left[-1\frac{1}{3}; 4\right)$.

Способ 2. Уравнение

$$\begin{aligned} \sqrt{(x+5)(3x+4)} = 4(x-1) &\iff \begin{cases} x-1 \geq 0, \\ (x+5)(3x+4) = 16(x-1)^2 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} x-1 \geq 0, \\ 13x^2 - 51x - 4 = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x \geq 1, \\ (13x+1)(x-4) = 0 \end{cases} \iff x = 4. \end{aligned}$$

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \sqrt{(x+5)(3x+4)} - 4(x-1) \quad \forall x \in (-\infty; -5] \cup \left[-1\frac{1}{3}; +\infty\right),$$

с помощью которой неравенство (8) запишем в виде

$$f(x) > 0.$$

Тогда множеством решений неравенства (8) будет множество значений аргумента x , при которых функция f принимает положительные значения.

Функция f является непрерывной и имеет один нуль $x = 4$. Поэтому на числовых промежутках $(-\infty; -5]$, $\left[-1\frac{1}{3}; 4\right)$ и $(4; +\infty)$ она сохраняет знак.

Так как

$$-6 \in (-\infty; -5], \quad \text{а} \quad f(-6) = \sqrt{14} + 28 > 0,$$

$$0 \in \left[-1\frac{1}{3}; 4\right), \quad \text{а} \quad f(0) = \sqrt{20} + 4 > 0,$$

$$5 \in (4; +\infty), \quad \text{а} \quad f(5) = \sqrt{190} - 16 < 0,$$

то

$$f(x) > 0 \quad \forall x \in (-\infty; -5] \cup \left[-1\frac{1}{3}; 4\right)$$

и

$$f(x) < 0 \quad \forall x \in (4; +\infty).$$

Следовательно, множеством решений неравенства (8) будет множество $(-\infty; -5] \cup \left[-1\frac{1}{3}; 4\right)$. *Ответ:* $(-\infty; -5] \cup \left[-1\frac{1}{3}; 4\right)$.

Задача 11. Решите неравенство

$$\sqrt{x^2 + x - 1} \geq x - 1. \quad (9)$$

Решение. Неравенство (9) равносильно совокупности двух систем:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x^2 + x - 1 \geq 0, \\ x - 1 < 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} \left(x + \frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right) \left(x + \frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right) \geq 0, \\ x < 1 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} x \leq -\frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \\ \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \leq x < 1; \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x - 1 \geq 0, \\ x^2 + x - 1 \geq (x - 1)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 1, \\ x \geq \frac{2}{3} \end{cases} \iff x \geq 1.$$

Следовательно, множеством решений неравенства (9) будет множество $\left(-\infty; -\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right] \cup \left[\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}; +\infty\right)$.

Ответ: $\left(-\infty; -\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right] \cup \left[\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}; +\infty\right)$.

Задача 12. Решите неравенство:

а) $\sqrt{x^2 + x - 1} > x - 1$; б) $\sqrt{1 + 8x^2} \geq 2x - 1$;

в) $2x - 5 < 2\sqrt{x^2 - x - 6}$; г) $\sqrt{5 - x^2} \geq x + 1$.

Ответ: а) $\left(-\infty; -\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right] \cup \left[\frac{-1+\sqrt{5}}{2}; +\infty\right)$; б) \mathbb{R} ;

в) $(-\infty; -2] \cup \left(3\frac{1}{16}; +\infty\right)$; г) $[-\sqrt{5}; 1]$.

Задача 13. Решите неравенство

$$\frac{2}{x} - \frac{1}{2} \leq \sqrt{\frac{4}{x^2} - \frac{3}{4}}. \quad (10)$$

Решение. Неравенство (10) равносильно совокупности двух систем:

$$\begin{cases} \frac{4}{x^2} - \frac{3}{4} \geq 0, \\ \frac{2}{x} - \frac{1}{2} < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left|\frac{2}{x}\right| \geq \frac{\sqrt{3}}{2}, \\ \frac{2}{x} < \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \frac{2}{x} \leq -\frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow -\frac{4\sqrt{3}}{3} \leq x < 0;$$

$$\begin{cases} \frac{2}{x} - \frac{1}{2} \geq 0, \\ \frac{4}{x^2} - \frac{3}{4} \geq \left(\frac{2}{x} - \frac{1}{2}\right)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2}{x} \geq \frac{1}{2}, \\ \frac{2}{x} \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{2}{x} \geq 1 \Leftrightarrow 0 < x \leq 2.$$

Следовательно, множеством решений неравенства (10) будет множество $\left[-\frac{4\sqrt{3}}{3}; 0\right) \cup (0; 2]$. Ответ: $\left[-\frac{4\sqrt{3}}{3}; 0\right) \cup (0; 2]$.

Задача 14. Решите неравенство:

$$\text{а) } \frac{2}{x} - \frac{1}{2} < \sqrt{\frac{4}{x^2} - \frac{3}{4}}; \quad \text{б) } \frac{2}{x} - \frac{1}{2} \geq \sqrt{\frac{4}{x^2} - \frac{3}{4}}.$$

Ответ: а) $\left[-\frac{4\sqrt{3}}{3}; 0\right) \cup (0; 2)$; б) $\left[2; \frac{4\sqrt{3}}{3}\right]$.

Задача 15. Решите неравенство

$$\sqrt{1-3x} - \sqrt{x+5} > 1. \quad (11)$$

Решение. Неравенство (11) равносильно неравенству

$$\begin{aligned} \sqrt{1-3x} > 1 + \sqrt{x+5} &\iff 1-3x > (1 + \sqrt{x+5})^2 \iff \\ &\iff 2\sqrt{x+5} < -4x-5 \iff \\ &\iff \begin{cases} x+5 \geq 0, \\ 4x+5 < 0, \\ 4(x+5) < (4x+5)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x+5 \geq 0, \\ 4x+5 < 0, \\ 16x^2+36x+5 > 0 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} x \geq -5, \\ x < -1\frac{1}{4}, \\ \left(x + \frac{9 + \sqrt{61}}{8}\right) \left(x - \frac{-9 + \sqrt{61}}{8}\right) > 0 \end{cases} \iff \\ &\iff -5 \leq x < -\frac{9 + \sqrt{61}}{8}, \end{aligned}$$




Рис. 1

что устанавливаем с помощью числовой прямой, построенной на рис. 1, где

$$a = -\frac{9 + \sqrt{61}}{8}, \quad b = \frac{-9 + \sqrt{61}}{8},$$

учитывая оценки:

$$\sqrt{61} > -1 \iff -9 + \sqrt{61} > -10 \iff \frac{-9 + \sqrt{61}}{8} > -1\frac{1}{4},$$

$$61 < 31^2 \iff \sqrt{61} < 31 \iff 9 + \sqrt{61} < 40 \iff -\frac{9 + \sqrt{61}}{8} > -5,$$

$$\sqrt{61} > 1 \iff 9 + \sqrt{61} > 10 \iff -\frac{9 + \sqrt{61}}{8} < -1\frac{1}{4}.$$

Ответ: $\left[-5; -\frac{9 + \sqrt{61}}{8}\right)$.

Задача 16. Решите неравенство:

а) $\sqrt{x-5} - \sqrt{9-x} \geq 1$; б) $\sqrt{22-x} - \sqrt{10-x} > 2$;

в) $\sqrt{22-x} - \sqrt{10-x} \geq 2$; г) $\sqrt{x-6} - \sqrt{10-x} \geq 1$;

д) $2\sqrt{x+2} - \sqrt{x-1} > 3$.

Ответ: а) $\left[\frac{14+\sqrt{7}}{2}; 9\right]$; б) (6; 10]; в) [6; 10]; г) $\left[8 + \frac{\sqrt{7}}{2}; 10\right]$;

д) $[1; 2) \cup (2; +\infty)$.

Задача 17. Решите неравенство

$$\sqrt{x} - \sqrt{6x+1} > \sqrt{2x+1}. \quad (12)$$

Решение. Предварительно приведём неравенство (12) к равносильному неравенству, у которого в левой и правой частях расположены неотрицательные выражения при условии их существования:

$$\begin{aligned} & \sqrt{x} > \sqrt{6x+1} + \sqrt{2x+1} \iff \\ \iff & \begin{cases} x > 0, \\ x > 6x+1 + 2\sqrt{6x+1} \cdot \sqrt{2x+1} + 2x+1 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} x > 0, \\ 2\sqrt{6x+1} \cdot \sqrt{2x+1} < -(7x+2), \end{cases} \end{aligned}$$

и нет решений, так как $-(7x+2) < 0$, а

$$2\sqrt{6x+1} \cdot \sqrt{2x+1} > 0 \text{ при } x > 0. \quad \text{Ответ: } \emptyset.$$

Задача 18. Решите неравенство

$$\sqrt{2x+7} - \sqrt{5-x} > \sqrt{x}. \quad (13)$$

Решение. Предварительно приведём неравенство (13) к равносильному неравенству, у которого в левой и правой частях расположены неотрицательные выражения при условии их существования.

Тогда

$$\sqrt{2x+7} > \sqrt{x} + \sqrt{5-x} \iff 2x+7 > x+2\sqrt{x} \cdot \sqrt{5-x} + 5-x \iff$$

$$\iff \sqrt{x} \cdot \sqrt{5-x} < x+1 \iff \begin{cases} x \geq 0, \\ 5-x \geq 0, \\ x+1 > 0, \\ x(5-x) < (x+1)^2 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} 0 \leq x \leq 5, \\ 2x^2 - 3x + 1 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 0 \leq x \leq 5, \\ (2x-1)(x-1) > 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} 0 \leq x \leq 5, \\ \begin{cases} x < 0,5, \\ x > 1 \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} 0 \leq x < 0,5, \\ 1 < x \leq 5. \end{cases} \quad \text{Ответ: } [0; 0,5) \cup (1; 5].$$

Задача 19. Решите неравенство:

а) $\sqrt{x} - \sqrt{6x+1} \geq \sqrt{2x+1}$; б) $\sqrt{x} - \sqrt{6x+1} \leq \sqrt{2x+1}$;

в) $\sqrt{x+5} + \sqrt{x+3} < \sqrt{2x+7}$; г) $\sqrt{x+5} + \sqrt{x+3} \leq \sqrt{2x+7}$;

д) $\sqrt{x+5} + \sqrt{x+3} \geq \sqrt{2x+7}$; е) $\sqrt{2x+1} + \sqrt{2x-5} \geq \sqrt{5-2x}$.

Ответ: а) \emptyset ; б) $[0; +\infty)$; в) \emptyset ; г) \emptyset ; д) $[-3; +\infty)$; е) $\left\{2\frac{1}{2}\right\}$.

Задача 20. Решите неравенство

$$\sqrt{8-x^2} - \sqrt{25-x^2} \geq x. \quad (14)$$

Решение. Неравенство (14) равносильно неравенству

$$\sqrt{8-x^2} \geq x + \sqrt{25-x^2} \iff \begin{cases} \begin{cases} 8-x^2 \geq 0, \\ x + \sqrt{25-x^2} < 0, \end{cases} \\ \begin{cases} x + \sqrt{25-x^2} \geq 0, \\ 8-x^2 \geq (x + \sqrt{25-x^2})^2. \end{cases} \end{cases}$$

Система

$$\begin{cases} x^2 - 8 \leq 0, \\ \sqrt{25 - x^2} < -x \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 - 8 \leq 0, \\ 25 - x^2 \geq 0, \\ -x > 0, \\ 25 - x^2 < (-x)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x < 0, \\ x^2 \leq 8, \\ x^2 \leq 25, \\ x^2 > 12,5 \end{cases} \iff \emptyset.$$

Неравенство

$$8 - x^2 \geq (x + \sqrt{25 - x^2})^2 \iff 2x\sqrt{25 - x^2} \leq -(17 + x^2) \iff$$

$$\iff \begin{cases} 25 - x^2 \geq 0, \\ x < 0, \\ 4x^2(25 - x^2) \geq (-(17 + x^2))^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x < 0, \\ x^2 \leq 25, \\ 5x^4 - 66x^2 + 289 \leq 0, \end{cases}$$

и не имеет решений, так как

$$5x^4 - 66x^2 + 289 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Это следует из того, что у квадратного трёхчлена $5y^2 - 66y + 289$ дискриминант $D = 66^2 - 4 \cdot 5 \cdot 289 = 4356 - 5780 = -1424 < 0$, а при y^2 коэффициент $5 > 0$, и значит,

$$5y^2 - 66y + 289 > 0 \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

Следовательно, неравенство (14) решений не имеет. *Ответ:* \emptyset .

Задача 21. Решите неравенство

$$\sqrt{x + \sqrt{6x - 9}} + \sqrt{x - \sqrt{6x - 9}} < \sqrt{10}. \quad (15)$$

Решение. Поскольку

$$x - \sqrt{6x - 9} \leq x + \sqrt{6x - 9} \quad \text{при } 6x - 9 \geq 0,$$

то неравенство (15) имеет смысл при

$$\begin{cases} 6x - 9 \geq 0, \\ x - \sqrt{6x - 9} \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x - 3 \geq 0, \\ \sqrt{6x - 9} \leq x \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 1,5, \\ 6x - 9 \leq x^2 \end{cases} \iff$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1,5, \\ x^2 - 6x + 9 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1,5, \\ (x-3)^2 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 1,5.$$

Неравенство (15) равносильно системе

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x \geq 1,5, \\ \left(\sqrt{x + \sqrt{6x-9}} + \sqrt{x - \sqrt{6x-9}} \right)^2 < 10 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} x \geq 1,5, \\ x + \sqrt{6x-9} + 2\sqrt{x^2 - (6x-9)} + x - \sqrt{6x-9} < 10 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} x \geq 1,5, \\ \sqrt{x^2 - 6x + 9} < 5 - x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1,5, \\ \sqrt{(x-3)^2} < 5 - x \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} x \geq 1,5, \\ 5 - x > 0, \\ (x-3)^2 < (5-x)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1,5, \\ 5 - x > 0, \\ (x-3-5+x)(x-3+5-x) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 1,5 \leq x < 5, \\ x - 4 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1,5 \leq x < 5, \\ x < 4 \end{cases} \Leftrightarrow 1,5 \leq x < 4. \end{aligned}$$

Ответ: $[1,5; 4)$.

Задача 22. Решите неравенство:

а) $\sqrt{x + \sqrt{6x-9}} + \sqrt{x - \sqrt{6x-9}} \leq \sqrt{10}$;

б) $\sqrt{x + \sqrt{6x-9}} + \sqrt{x - \sqrt{6x-9}} > \sqrt{10}$;

в) $\sqrt{x + \sqrt{6x-9}} + \sqrt{x - \sqrt{6x-9}} \geq \sqrt{10}$.

Ответ: а) $[1,5; 4]$; б) $(4; +\infty)$; в) $[4; +\infty)$.

Задача 23. Решите неравенство

$$\sqrt{14 + \sqrt{x}} - \sqrt{14 - \sqrt{x}} \geq 3\sqrt{2}. \quad (16)$$

Решение. Неравенство (16) имеет смысл при

$$\begin{cases} x \geq 0, \\ 14 - \sqrt{x} \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 0, \\ \sqrt{x} \leq 14 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 0, \\ x \leq 14^2 \end{cases} \iff 0 \leq x \leq 196.$$

Если $x \geq 0$, то $14 + \sqrt{x} \geq 14 - \sqrt{x}$.

Значит, расположенное в левой части неравенства (16) выражение

$$\sqrt{14 + \sqrt{x}} - \sqrt{14 - \sqrt{x}} \geq 0 \quad \text{при} \quad 0 \leq x \leq 196.$$

Следовательно, неравенство (16) равносильно системе неравенств

$$\begin{aligned} & \begin{cases} 0 \leq x \leq 196, \\ \left(\sqrt{14 + \sqrt{x}} - \sqrt{14 - \sqrt{x}} \right)^2 \geq 18 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} 0 \leq x \leq 196, \\ 14 + \sqrt{x} - 2\sqrt{14^2 - x} + 14 - \sqrt{x} \geq 18 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} 0 \leq x \leq 196, \\ \sqrt{14^2 - x} \leq 5 \end{cases} \iff \begin{cases} 0 \leq x \leq 196, \\ 196 - x \leq 25 \end{cases} \iff 171 \leq x \leq 196. \end{aligned}$$

Ответ: [171; 196].

Задача 24. Решите неравенство

$$\sqrt{14 + \sqrt{x}} - \sqrt{14 - \sqrt{x}} \leq 3\sqrt{2}. \quad \text{Ответ: } [0; 171].$$

Задача 25. Решите неравенство

$$2\sqrt{x^2 + 3x} \geq 9 - 2x - \sqrt{x} - \sqrt{x + 3}. \quad (17)$$

Решение. Неравенство (17) равносильно неравенству

$$\begin{aligned}
 & x + 2\sqrt{x(x+3)} + x + 3 + \sqrt{x} + \sqrt{x+3} - 12 \geq 0 \iff \\
 & \iff (\sqrt{x} + \sqrt{x+3})^2 + (\sqrt{x} + \sqrt{x+3}) - 12 \geq 0 \iff \\
 & \iff (\sqrt{x} + \sqrt{x+3} + 4)(\sqrt{x} + \sqrt{x+3} - 3) \geq 0 \iff \\
 & \iff \sqrt{x} + \sqrt{x+3} \geq 3 \iff \begin{cases} x \geq 0, \\ x + 3 \geq 0, \\ x + 2\sqrt{x(x+3)} + x + 3 \geq 9 \end{cases} \iff \\
 & \iff \begin{cases} x \geq 0, \\ \sqrt{x(x+3)} \geq 3 - x \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 0, \\ \begin{cases} 3 - x < 0, \\ x(x+3) \geq 0, \end{cases} \\ \begin{cases} 3 - x \geq 0, \\ x(x+3) \geq (3-x)^2 \end{cases} \end{cases} \iff \\
 & \iff \begin{cases} \begin{cases} x \geq 0, \\ x > 3, \\ x(x+3) \geq 0, \end{cases} \\ \begin{cases} x \geq 0, \\ x \leq 3, \\ x \geq 1 \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} x > 3, \\ 1 \leq x \leq 3 \end{cases} \iff x \geq 1.
 \end{aligned}$$

Ответ: $[1; +\infty)$.

Задача 26. Решите неравенство:

а) $7 + 2x \geq 2\sqrt{x^2 + 9x} + \sqrt{x} - \sqrt{x+9}$;

б) $2x + 5 > 2\sqrt{x^2 + 5x} + \sqrt{x} - \sqrt{x+5}$.

Ответ: а) $[0; 16]$; б) $[0; +\infty)$.

Задача 27. Решите неравенство

$$(x^2 - 1) \cdot \sqrt{x^2 - 4x + 3} \geq 0. \tag{18}$$

Решение. Неравенство (18) имеет смысл, когда

$$x^2 - 4x + 3 \geq 0 \iff \begin{cases} x^2 - 4x + 3 = 0, \\ x^2 - 4x + 3 > 0. \end{cases}$$

Если

$$x^2 - 4x + 3 = 0 \iff (x - 1)(x - 3) = 0 \iff \begin{cases} x = 1, \\ x = 3, \end{cases}$$

то выражение в левой части неравенства (18) равно нулю и неравенство (18), будучи нестрогим, выполняется.

Остаётся рассмотреть случай, когда $x^2 - 4x + 3 > 0$. При этом решениями неравенства (18) будут решения системы неравенств

$$\begin{aligned} \begin{cases} x^2 - 4x + 3 > 0, \\ x^2 - 1 \geq 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} (x - 1)(x - 3) > 0, \\ (x - 1)(x + 1) \geq 0 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} \begin{cases} x - 1 < 0, \\ x - 3 < 0, \\ x + 1 \leq 0, \end{cases} \\ \begin{cases} x - 1 > 0, \\ x - 3 > 0, \\ x + 1 \geq 0 \end{cases} \end{cases} &\iff \begin{cases} \begin{cases} x < 1, \\ x < 3, \\ x \leq -1, \end{cases} \\ \begin{cases} x > 1, \\ x > 3, \\ x \geq -1 \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} x \leq -1, \\ x > 3. \end{cases} \end{aligned}$$

Следовательно, множеством решений неравенства (18) будет множество $(-\infty; -1] \cup \{1\} \cup [3; +\infty)$. *Ответ:* $(-\infty; -1] \cup \{1\} \cup [3; +\infty)$.

Задача 28. Решите неравенство:

а) $(x - 1)\sqrt{x^2 - x - 2} \geq 0$; б) $(x^2 - 3x - 40)\sqrt{2x - 3} \geq 0$;

в) $(x + 2) \cdot \sqrt{9 - x^2} \leq 0$; г) $(x^2 - 9) \cdot \sqrt{x^2 + 3x - 10} \leq 0$.

Ответ: а) $\{-1\} \cup [2; +\infty)$; б) $\left\{1\frac{1}{2}\right\} \cup [8; +\infty)$; в) $[-3; -2] \cup \{3\}$;

г) $\{-5\} \cup [2; 3]$.

Задача 29. Решите неравенство

$$\frac{(x-2)\sqrt{x^2-5x+4}}{5-x} \geq 0. \quad (19)$$

Решение. Из неравенства (19) следует, что

$$x^2 - 5x + 4 \geq 0 \iff \begin{cases} x^2 - 5x + 4 = 0, \\ x^2 - 5x + 4 > 0. \end{cases}$$

Если

$$x^2 - 5x + 4 = 0 \iff (x-1)(x-4) = 0 \iff \begin{cases} x = 1, \\ x = 4, \end{cases}$$

то выражение в левой части неравенства (19) равно нулю и неравенство (19), будучи нестрогим, выполняется.

Пусть $x^2 - 5x + 4 > 0$. Тогда решениями неравенства (19) будут решения системы неравенств

$$\begin{aligned} \begin{cases} x^2 - 5x + 4 > 0, \\ \frac{x-2}{5-x} \geq 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} (x-1)(x-4) > 0, \\ \frac{x-2}{x-5} \leq 0 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} \begin{cases} x < 1, \\ x > 4, \end{cases} \\ 2 \leq x < 5 \end{cases} \iff 4 < x < 5. \end{aligned}$$

Следовательно, множеством решений неравенства (19) является множество $\{1\} \cup [4; 5)$. *Ответ:* $\{1\} \cup [4; 5)$.

Задача 30. Решите неравенство

$$\frac{x+11}{\sqrt{x}+1} > 4 + \frac{\sqrt{x}-1}{2}. \quad (20)$$

Решение. Неравенство (20) имеет смысл при $x \geq 0$, а

$$\sqrt{x} + 1 > 0 \quad \forall x \in [0; +\infty).$$

Поэтому неравенство (20) равносильно неравенству

$$\begin{aligned}
 2(x+11) > 8(\sqrt{x}+1) + x - 1 &\iff x - 8\sqrt{x} + 15 > 0 \iff \\
 \iff (\sqrt{x})^2 - 8\sqrt{x} + 15 > 0 &\iff (\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}-5) > 0 \iff \\
 \iff \begin{cases} \sqrt{x} < 3, \\ \sqrt{x} > 5 \end{cases} &\iff \begin{cases} 0 \leq x < 9, \\ x > 25. \end{cases} \quad \text{Ответ: } [0; 9) \cup (25; +\infty).
 \end{aligned}$$

Задача 31. Решите неравенство

$$\frac{x-1}{\sqrt{x}+1} > 4 + \frac{\sqrt{x}-1}{2}. \quad (21)$$

Решение. Неравенство (21) имеет смысл при $x \geq 0$ и равносильно неравенству

$$\begin{aligned}
 \frac{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)}{\sqrt{x}+1} > 4 + \frac{\sqrt{x}-1}{2} &\iff \\
 \iff \sqrt{x}-1 > 4 + \frac{\sqrt{x}-1}{2} &\iff \sqrt{x} > 9 \iff x > 81.
 \end{aligned}$$

Ответ: $(81; +\infty)$.

Задача 32. Решите неравенство

$$\frac{14}{3-\sqrt{x}} \geq \sqrt{x} + 5.$$

Решение. Неравенство

$$\begin{aligned}
 \frac{14}{3-\sqrt{x}} \geq \sqrt{x} + 5 &\iff \frac{14}{3-\sqrt{x}} - (\sqrt{x} + 5) \geq 0 \iff \\
 \iff \frac{14 - (\sqrt{x} + 5)(3 - \sqrt{x})}{3 - \sqrt{x}} \geq 0 &\iff \frac{(\sqrt{x})^2 + 2\sqrt{x} - 1}{3 - \sqrt{x}} \geq 0 \iff \\
 \iff \frac{(\sqrt{x})^2 + 2\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - 3} \leq 0 &\iff
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \frac{(\sqrt{x} + 1 + \sqrt{2})(\sqrt{x} + 1 - \sqrt{2})}{\sqrt{x} - 3} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{x} + 1 - \sqrt{2}}{\sqrt{x} - 3} \leq 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left[\begin{cases} \sqrt{x} - 3 > 0, \\ \sqrt{x} + 1 - \sqrt{2} \leq 0, \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{cases} \sqrt{x} > 3, \\ \sqrt{x} \leq \sqrt{2} - 1, \end{cases} \Leftrightarrow \right. \\ &\left. \begin{cases} \sqrt{x} - 3 < 0, \\ \sqrt{x} + 1 - \sqrt{2} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{cases} \sqrt{x} < 3, \\ \sqrt{x} \geq \sqrt{2} - 1 \end{cases} \right. \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left[\begin{cases} \sqrt{x} < 3, \\ \sqrt{x} \geq \sqrt{2} - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{cases} 0 \leq x < 9, \\ x \geq (\sqrt{2} - 1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left[\begin{cases} 0 \leq x < 9, \\ x \geq 3 - 2\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow 3 - 2\sqrt{2} \leq x < 9. \quad \text{Ответ: } [3 - 2\sqrt{2}; 9). \end{aligned}$$

Задача 33. Решите неравенство

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} \geq \frac{1}{2-x}. \quad (22)$$

Решение. Неравенство (22) равносильно совокупности двух систем:

$$\begin{aligned} &\begin{cases} 1+x > 0, \\ 2-x < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -1, \\ x > 2 \end{cases} \Leftrightarrow x > 2; \\ &\begin{cases} 1+x > 0, \\ 2-x > 0, \\ 2-x \geq \sqrt{x+1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -1, \\ x < 2, \\ (2-x)^2 \geq x+1 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -1 < x < 2, \\ x^2 - 5x + 3 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 < x < 2, \\ \left[\begin{cases} x \leq \frac{5 - \sqrt{13}}{2}, \\ x \geq \frac{5 + \sqrt{13}}{2} \end{cases} \right. \end{cases} \Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow -1 < x \leq \frac{5 - \sqrt{13}}{2}.$$

Следовательно, множеством решений неравенства (22) будет множество $\left(-1; \frac{5 - \sqrt{13}}{2}\right] \cup (2; +\infty)$. Ответ: $\left(-1; \frac{5 - \sqrt{13}}{2}\right] \cup (2; +\infty)$.

Задача 34. Решите неравенство

$$\frac{2x}{\sqrt{2x+9}} < \sqrt{1+2x} - 1. \quad (23)$$

Решение. При $x > 0$ правая часть неравенства (23) положительна, так как в этом случае $\sqrt{1+2x} > 1$. Следовательно, при $x > 0$ неравенство (23) равносильно системе

$$\begin{cases} x > 0, \\ 2x + 9 > 0, \\ 1 + 2x \geq 0, \\ \frac{4x^2}{2x+9} < 1 + 2x - 2\sqrt{1+2x} + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0, \\ x > -\frac{9}{2}, \\ x \geq -\frac{1}{2}, \\ 1 + x - \frac{2x^2}{2x+9} > \sqrt{1+2x} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x > 0, \\ \frac{11x+9}{2x+9} > \sqrt{1+2x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0, \\ \frac{121x^2 + 198x + 81}{(2x+9)^2} > 1 + 2x \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x > 0, \\ \frac{-8x^3 + 45x^2}{(2x+9)^2} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0, \\ x^2(45 - 8x) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x > 0, \\ 45 - 8x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0, \\ x < \frac{45}{8} \end{cases} \Leftrightarrow 0 < x < \frac{45}{8}.$$

При $x = 0$ неравенство (23) не выполняется.

При $x < 0$ неравенство (23) равносильно системе

$$\begin{cases} x < 0, \\ 2x + 9 > 0, \\ 1 + 2x \geq 0, \\ \frac{2 \cdot (-x)}{\sqrt{2x+9}} > 1 - \sqrt{1+2x} \end{cases} \iff \begin{cases} x < 0, \\ x > -\frac{9}{2}, \\ x \geq -\frac{1}{2}, \\ \frac{4x^2}{2x+9} > 1 - 2\sqrt{1+2x} + 1 + 2x \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x < 0, \\ x \geq -\frac{1}{2}, \\ 1 + x - \frac{2x^2}{2x+9} < \sqrt{1+2x} \end{cases} \iff \begin{cases} x < 0, \\ x \geq -\frac{1}{2}, \\ \frac{11x+9}{2x+9} < \sqrt{1+2x} \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x < 0, \\ x \geq -\frac{1}{2}, \\ \frac{121x^2 + 198x + 81}{(2x+9)^2} < 1 + 2x \end{cases} \iff \begin{cases} x < 0, \\ x \geq -\frac{1}{2}, \\ \frac{-8x^3 + 45x^2}{(2x+9)^2} < 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x < 0, \\ x \geq -\frac{1}{2}, \\ x^2(-8x+45) < 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x < 0, \\ x \geq -\frac{1}{2}, \\ -8x+45 < 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x < 0, \\ x \geq -\frac{1}{2}, \\ x > \frac{45}{8}, \end{cases}$$

и не имеет решений. Ответ: $(0; 5\frac{5}{8})$.

Задача 35. Решите неравенство

$$\sqrt{9x^2 + 6x + 1} < 2 - x. \quad (24)$$

Решение. Выделяя полный квадрат

$$9x^2 + 6x + 1 = (3x + 1)^2 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

и учитывая, что

$$\sqrt{(3x + 1)^2} = |3x + 1| \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

неравенство (24) приводим к равносильному неравенству с модулем

$$|3x + 1| < 2 - x.$$

Далее, основываясь на формуле

$$|f(x)| < g(x) \iff -g(x) < f(x) < g(x),$$

получаем равносильное двойное неравенство

$$-(2 - x) < 3x + 1 < 2 - x \iff \begin{cases} 3x + 1 > x - 2, \\ 3x + 1 < 2 - x \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} 2x > -3, \\ 4x < 1 \end{cases} \iff -1,5 < x < 0,25. \quad \text{Ответ: } (-1,5; 0,25).$$

Задача 36. Решите неравенство

$$\sqrt{2 - |x|} < \frac{x}{|x|}. \quad (25)$$

Решение. В левой части неравенства (25) расположено неотрицательное выражение. Поэтому правая часть должна быть положительной, т.е. $x > 0$. Следовательно, $\frac{x}{|x|} = 1$, а неравенство (25) равносильно системе неравенств

$$\begin{cases} x > 0, \\ \sqrt{2 - x} < 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 0, \\ 0 \leq 2 - x < 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 0, \\ -1 < x - 2 \leq 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x > 0, \\ 1 < x \leq 2 \end{cases} \iff 1 < x \leq 2. \quad \text{Ответ: } (1; 2].$$

Задача 37. Решите неравенство

$$\sqrt{x^2 - |x|} < x. \quad (26)$$

Решение. В левой части неравенства (26) расположено неотрицательное выражение. Поэтому правая часть $x > 0$. Следовательно, $|x| = x$, а неравенство (26) равносильно неравенству

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 - x} < x &\Leftrightarrow \begin{cases} x > 0, \\ x^2 - x \geq 0, \\ x^2 - x < x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0, \\ x(x-1) \geq 0, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0, \\ x-1 \geq 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x > 0, \\ x \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 1. \quad \text{Ответ: } [1; +\infty). \end{aligned}$$

Задача 38. Решите неравенство

$$\sqrt{2 - |x|} < x - 1.$$

Решение. Неравенство строгое, а в левой части расположено неотрицательное выражение. Поэтому правая часть $x - 1 > 0$, а неравенство равносильно системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} x > 1, \\ \sqrt{2 - x} < x - 1 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x > 1, \\ 2 - x \geq 0, \\ 2 - x < (x - 1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 < x \leq 2, \\ x^2 - x - 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 1 < x \leq 2, \\ \left(x - \frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right) \left(x + \frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right) > 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \frac{1 + \sqrt{5}}{2} < x \leq 2. \end{aligned}$$

$$\text{Ответ: } \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}; 2\right].$$

Задача 39. Решите неравенство

$$\sqrt{4 - x^2} \leq \frac{1}{|x|}. \quad (27)$$

Решение. Неравенство (27) имеет смысл при

$$4 - x^2 \geq 0 \iff x^2 \leq 4 \iff |x| \leq 2 \iff -2 \leq x \leq 2.$$

Построим графики функций (рис. 2)

$$f(x) = \sqrt{4 - x^2} \quad \forall x \in [-2; 2]$$

и

$$g(x) = \frac{1}{|x|} \quad \forall x \in (-\infty; 0) \cup (0; +\infty),$$

которые являются чётными и положительными.




Рис. 2

Чётность следует из того, что

$$\begin{aligned} f(-x) &= \sqrt{4 - (-x)^2} = \\ &= \sqrt{4 - x^2} = f(x) \quad \forall x \in [-2; 2], \end{aligned}$$

$$g(-x) = \frac{1}{|-x|} = \frac{1}{|x|} = g(x)$$

$$\forall x \in (-\infty; 0) \cup (0; +\infty).$$

Неравенство (27) выполняется тогда и только тогда, когда переменная x принадлежит множеству

$$[-2; -b] \cup [-a; 0) \cup (0; a] \cup [b; 2],$$

где $a < b$ — положительные корни уравнения

$$\sqrt{4 - x^2} = \frac{1}{|x|}.$$

Система

$$\left\{ \begin{array}{l} x > 0, \\ \sqrt{4 - x^2} = \frac{1}{x} \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} x > 0, \\ 4 - x^2 \geq 0, \\ 4 - x^2 = \frac{1}{x^2} \end{array} \right. \iff$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0, \\ |x| \leq 2, \\ x^4 - 4x^2 + 1 = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 0 < x \leq 2, \\ (x^2 - 2)^2 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < x \leq 2, \\ |x^2 - 2| = \sqrt{3} \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 0 < x \leq 2, \\ \begin{cases} x^2 = 2 - \sqrt{3}, \\ x^2 = 2 + \sqrt{3} \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{2 - \sqrt{3}}, \\ x = \sqrt{2 + \sqrt{3}}. \end{cases} \end{aligned}$$

Следовательно, $a = \sqrt{2 - \sqrt{3}}$, $b = \sqrt{2 + \sqrt{3}}$, а множество

$$[-2; -\sqrt{2 + \sqrt{3}}] \cup [-\sqrt{2 - \sqrt{3}}; 0] \cup (0; \sqrt{2 - \sqrt{3}}] \cup [\sqrt{2 + \sqrt{3}}; 2]$$

является множеством решений неравенства (27). *Ответ:*

$$[-2; -\sqrt{2 + \sqrt{3}}] \cup [-\sqrt{2 - \sqrt{3}}; 0] \cup (0; \sqrt{2 - \sqrt{3}}] \cup [\sqrt{2 + \sqrt{3}}; 2].$$

Задача 40. Решите неравенство:

а) $\sqrt{4 - x^2} < \frac{1}{|x|}$; б) $\sqrt{4 - x^2} > \frac{1}{|x|}$; в) $\sqrt{4 - x^2} \geq \frac{1}{|x|}$. *Ответ:*

а) $[-2; -\sqrt{2 + \sqrt{3}}] \cup (-\sqrt{2 - \sqrt{3}}; 0) \cup (0; \sqrt{2 - \sqrt{3}}) \cup (\sqrt{2 + \sqrt{3}}; 2];$

б) $(-\sqrt{2 + \sqrt{3}}; -\sqrt{2 - \sqrt{3}}) \cup (\sqrt{2 - \sqrt{3}}; \sqrt{2 + \sqrt{3}});$

в) $[-\sqrt{2 + \sqrt{3}}; -\sqrt{2 - \sqrt{3}}] \cup [\sqrt{2 - \sqrt{3}}; \sqrt{2 + \sqrt{3}}].$

Задача 41. Решите неравенство

$$2\sqrt{x} < 7 - |x - 10|. \quad (28)$$

Решение. Из неравенства (28) следует, что

$$7 - |x - 10| > 0 \Leftrightarrow |x - 10| < 7 \Leftrightarrow -7 < x - 10 < 7 \Leftrightarrow 3 < x < 17.$$

Неравенство (28) равносильно совокупности двух систем:

$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} 3 < x \leq 10, \\ 2\sqrt{x} < 7 + x - 10 \end{cases} \iff \begin{cases} 3 < x \leq 10, \\ x - 2\sqrt{x} - 3 > 0 \end{cases} \iff \\
 & \iff \begin{cases} 3 < x \leq 10, \\ (\sqrt{x} + 1)(\sqrt{x} - 3) > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 3 < x \leq 10, \\ \sqrt{x} > 3 \end{cases} \iff \\
 & \iff \begin{cases} 3 < x \leq 10, \\ x > 9 \end{cases} \iff 9 < x \leq 10; \\
 & \begin{cases} 10 < x < 17, \\ 2\sqrt{x} < 7 - x + 10 \end{cases} \iff \begin{cases} 10 < x < 17, \\ x + 2\sqrt{x} - 17 < 0 \end{cases} \iff \\
 & \iff \begin{cases} 10 < x < 17, \\ (\sqrt{x} + 1 + 3\sqrt{2})(\sqrt{x} + 1 - 3\sqrt{2}) < 0 \end{cases} \iff \\
 & \iff \begin{cases} 10 < x < 17, \\ \sqrt{x} < 3\sqrt{2} - 1 \end{cases} \iff \begin{cases} 10 < x < 17, \\ x < 19 - 6\sqrt{2} \end{cases} \iff \\
 & \iff 10 < x < 19 - 6\sqrt{2}.
 \end{aligned}$$

Следовательно, множеством решений строгого неравенства (28) является интервал $(9; 19 - 6\sqrt{2})$. *Ответ:* $(9; 19 - 6\sqrt{2})$.

Задача 42. Решите неравенство

$$\sqrt{x-3} \leq 3 - |x-6|. \quad (29)$$

Решение. Неравенство (29) имеет смысл при

$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} x - 3 \geq 0, \\ 3 - |x - 6| \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 3, \\ |x - 6| \leq 3 \end{cases} \iff \\
 & \iff \begin{cases} x \geq 3, \\ -3 \leq x - 6 \leq 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 3, \\ 3 \leq x \leq 9 \end{cases} \iff 3 \leq x \leq 9.
 \end{aligned}$$

Неравенство (29) равносильно совокупности двух систем:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} 3 \leq x \leq 6, \\ \sqrt{x-3} \leq x-3 \end{cases} \iff \begin{cases} 3 \leq x \leq 6, \\ x-3 \leq (x-3)^2 \end{cases} \iff \\ \iff & \begin{cases} 3 \leq x \leq 6, \\ (x-3)(x-4) \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 3 \leq x \leq 6, \\ \begin{cases} x \leq 3, \\ x \geq 4 \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} x = 3, \\ 4 \leq x \leq 6; \end{cases} \\ & \begin{cases} 6 < x \leq 9, \\ \sqrt{x-3} \leq 9-x \end{cases} \iff \begin{cases} 6 < x \leq 9, \\ x-3 \leq (9-x)^2 \end{cases} \iff \\ \iff & \begin{cases} 6 < x \leq 9, \\ (x-7)(x-12) \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 6 < x \leq 9, \\ \begin{cases} x \leq 7, \\ x \geq 12 \end{cases} \end{cases} \iff 6 < x \leq 7. \end{aligned}$$

Следовательно, множеством решений нестрогого неравенства (29) будет множество $\{3\} \cup [4; 7]$. *Ответ:* $\{3\} \cup [4; 7]$.

Задача 43. Решите неравенство

$$12 - 4\sqrt{x+1} \geq |x-8|. \quad (30)$$

Решение. Поскольку

$$|x-8| \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

то из неравенства (30) следует, что

$$12 - 4\sqrt{x+1} \geq 0 \iff \sqrt{x+1} \leq 3 \iff 0 \leq x+1 \leq 9 \iff -1 \leq x \leq 8.$$

Если $x \in [-1; 8]$, то $x-8 < 0$, а значит, $|x-8| = 8-x$. Поэтому неравенство (30) достаточно рассмотреть при $-1 \leq x \leq 8$. При этом неравенство (30) равносильно системе неравенств

$$\begin{cases} -1 \leq x \leq 8, \\ 12 - 4\sqrt{x+1} \geq 8-x \end{cases} \iff \begin{cases} -1 \leq x \leq 8, \\ 4\sqrt{x+1} \leq x+4 \end{cases} \iff$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq x \leq 8, \\ 16(x+1) \leq (x+4)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq x \leq 8, \\ x(x-8) \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq x \leq 8, \\ \begin{cases} x \leq 0, \\ x \geq 8 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq x \leq 0, \\ x = 8. \end{cases} \quad \text{Ответ: } [-1; 0] \cup \{8\}. \end{aligned}$$

Задача 44. Решите неравенство

$$\sqrt{2-|x|} > x-1. \quad (31)$$

Решение. Неравенство (31) равносильно совокупности двух систем:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x-1 < 0, \\ 2-|x| \geq 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x < 1, \\ |x| \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 1, \\ -2 \leq x \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -2 \leq x < 1; \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x-1 \geq 0, \\ 2-|x| > (x-1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1, \\ 2-x > x^2-2x+1 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1, \\ x^2-x-1 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1, \\ \left(x - \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) \left(x - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1, \\ x - \frac{1+\sqrt{5}}{2} < 0 \end{cases} \Leftrightarrow 1 \leq x < \frac{1+\sqrt{5}}{2}.$$

Объединение

$$[-2; 1) \cup \left[1; \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) = \left[-2; \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)$$

является множеством решений строгого неравенства (31).

$$\text{Ответ: } \left[-2; \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right).$$

Задача 45. Решите неравенство

$$\sqrt{4 - 4x^3 + x^6} > x - \sqrt[3]{2}. \quad (32)$$

Решение. Неравенство (32) равносильно неравенству

$$\begin{aligned} \sqrt{(x^3 - 2)^2} > x - \sqrt[3]{2} &\iff |x^3 - 2| > x - \sqrt[3]{2} \iff \\ &\iff \begin{cases} x^3 - 2 < -(x - \sqrt[3]{2}), \\ x^3 - 2 > x - \sqrt[3]{2} \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} (x - \sqrt[3]{2})(x^2 + \sqrt[3]{2}x + \sqrt[3]{4}) + x - \sqrt[3]{2} < 0, \\ (x - \sqrt[3]{2})(x^2 + \sqrt[3]{2}x + \sqrt[3]{4}) - (x - \sqrt[3]{2}) > 0 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} (x - \sqrt[3]{2})(x^2 + \sqrt[3]{2}x + \sqrt[3]{4} + 1) < 0, \\ (x - \sqrt[3]{2})(x^2 + \sqrt[3]{2}x + \sqrt[3]{4} - 1) > 0 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} x - \sqrt[3]{2} < 0, \\ x - \sqrt[3]{2} > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x < \sqrt[3]{2}, \\ x > \sqrt[3]{2}. \end{cases} \end{aligned}$$

В процессе решения было учтено, что

$$x^2 + \sqrt[3]{2}x + \sqrt[3]{4} \pm 1 > 0,$$

так как дискриминанты $D = \sqrt[3]{4} - 4(\sqrt[3]{4} \pm 1) = -3\sqrt[3]{4} \mp 4 < 0$, а первый коэффициент $1 > 0$. *Ответ:* $(-\infty; \sqrt[3]{2}) \cup (\sqrt[3]{2}; +\infty)$.

Задача 46. Решите неравенство

$$(x + 3)\sqrt{12 - |x|} \geq 0. \quad (33)$$

Решение. Неравенство (33) равносильно совокупности

$$\left[\begin{array}{l} 12 - |x| = 0, \\ \left\{ \begin{array}{l} 12 - |x| > 0, \\ x + 3 \geq 0 \end{array} \right. \end{array} \right. \iff \left[\begin{array}{l} |x| = 12, \\ \left\{ \begin{array}{l} |x| < 12, \\ x \geq -3 \end{array} \right. \end{array} \right. \iff \left[\begin{array}{l} x = \pm 12, \\ -3 \leq x < 12 \end{array} \right. \iff \\ \iff \left[\begin{array}{l} x = -12, \\ -3 \leq x \leq 12. \end{array} \right. \quad \text{Ответ: } \{-12\} \cup [-3; 12].$$

Задача 47. Решите неравенство

$$\sqrt{6-x} - |x-5| + \sqrt{x-4} \geq 2. \quad (34)$$

Решение. Способ 1. Неравенство (34) равносильно неравенству

$$\sqrt{6-x} + \sqrt{x-4} \geq 2 + |x-5|. \quad (35)$$

Рассмотрим функции

$$f(x) = \sqrt{6-x} + \sqrt{x-4}$$

с областью определения $D(f) = [4; 6]$, так как

$$\left\{ \begin{array}{l} 6-x \geq 0, \\ x-4 \geq 0 \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} x \leq 6, \\ x \geq 4 \end{array} \right. \iff 4 \leq x \leq 6,$$

и

$$g(x) = |x-5| + 2 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Неравенство (35) будет иметь вид

$$f(x) \geq g(x),$$

и надо найти все те x , при которых значения функции g не больше соответствующих значений функции f .

Так как

$$|x-5| \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

то функция

$$g(x) = |x-5| + 2 \geq 2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

и $g(x) = 2$ при тех x , которые являются корнями уравнения

$$|x - 5| = 0 \iff x - 5 = 0 \iff x = 5.$$

Итак, наименьшее значение

$$\min_{\mathbb{R}} g(x) = g(5) = 2,$$

а

$$g(x) > 2 \quad \forall x \in (-\infty; 5) \cup (5; +\infty). \quad (36)$$

Производная функция

$$f'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{6-x}} + \frac{1}{2\sqrt{x-4}} = \frac{\sqrt{6-x} - \sqrt{x-4}}{2\sqrt{(6-x)(x-4)}} \quad \forall x \in (4; 6)$$

равна нулю, когда

$$\begin{cases} 4 < x < 6, \\ \sqrt{6-x} = \sqrt{x-4} \end{cases} \iff \begin{cases} 4 < x < 6, \\ 6-x = x-4 \end{cases} \iff x = 5.$$

Так как

$$\begin{cases} 4 < x < 6, \\ \sqrt{6-x} > \sqrt{x-4} \end{cases} \iff \begin{cases} 4 < x < 6, \\ 6-x > x-4 \end{cases} \iff \begin{cases} 4 < x < 6, \\ x < 5 \end{cases} \iff 4 < x < 5,$$

а

$$\begin{cases} 4 < x < 6, \\ \sqrt{6-x} < \sqrt{x-4} \end{cases} \iff \begin{cases} 4 < x < 6, \\ 6-x < x-4 \end{cases} \iff \begin{cases} 4 < x < 6, \\ x > 5 \end{cases} \iff 5 < x < 6,$$

то при переходе через точку $x = 5$ производная функция меняет знак с плюса на минус.

Следовательно, критическая точка $x = 5$ является точкой максимума функции f . А учитывая, что $x = 5$ — единственная критическая точка функции f , заключаем, что при $x = 5$ функция f принимает наибольшее значение:

$$\max_{[4;6]} f(x) = f(5) = 2.$$

При этом

$$f(x) < 2 \quad \forall x \in [4; 5) \cup (5; 6]. \quad (37)$$

Из того, что

$$f(5) = g(5),$$

и оценок (36) и (37) следует, что неравенство (34) выполняется в единственном случае, когда

$$f(x) = g(x),$$

и это имеет место, когда $x = 5$.

Итак, $x = 5$ — единственное решение неравенства (34).

Способ 2. Учитывая, что

$$|x - 5| \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

из неравенства (34), как следствие, получаем неравенство

$$\sqrt{6-x} + \sqrt{x-4} \geq 2 \iff \begin{cases} 6-x \geq 0, \\ x-4 \geq 0, \\ 6-x + 2\sqrt{(6-x)(x-4)} + x-4 \geq 4 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x \leq 6, \\ x \geq 4, \\ \sqrt{(6-x)(x-4)} \geq 1 \end{cases} \iff \begin{cases} 4 \leq x \leq 6, \\ (6-x)(x-4) \geq 1 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} 4 \leq x \leq 6, \\ x^2 - 10x + 25 \leq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 4 \leq x \leq 6, \\ (x-5)^2 \leq 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} 4 \leq x \leq 6, \\ x-5 = 0 \end{cases} \iff x = 5.$$

При $x = 5$ неравенство (34) выполняется:

$$\sqrt{6-5} - |5-5| + \sqrt{5-4} \geq 2 \iff 1 + 1 \geq 2 \iff 2 \geq 2.$$

Значит, множеством решений неравенства (34) будет $\{5\}$.

Ответ: $\{5\}$.

Задача 48. Решите неравенство

$$\frac{\sqrt{2-x} + x - 3}{(|x-3| - 3)^2} < 0. \quad (38)$$

Решение. Уравнение

$$|x-3| - 3 = 0 \iff |x-3| = 3 \iff \begin{cases} x-3 = -3, \\ x-3 = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0, \\ x = 6. \end{cases}$$

Неравенство

$$2-x \geq 0 \iff x \leq 2.$$

Следовательно, неравенство (38) равносильно системе

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x \neq 0, \\ \sqrt{2-x} + x - 3 < 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \neq 0, \\ \sqrt{2-x} < 3-x \end{cases} \iff \\ \iff & \begin{cases} x \neq 0, \\ 2-x \geq 0, \\ 3-x > 0, \\ 2-x < (3-x)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x \neq 0, \\ x \leq 2, \\ x < 3, \\ x^2 - 5x + 7 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x < 0, \\ 0 < x \leq 2, \end{cases} \end{aligned}$$

так как квадратный трёхчлен

$$x^2 - 5x + 7 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

как имеющий отрицательный дискриминант $D = 25 - 28 = -3$ и положительный коэффициент при x^2 . Ответ: $(-\infty; 0) \cup (0; 2]$.

Задача 49. Решите неравенство

$$\frac{x^3 - 27 - 9x(x-3)}{|x-15|} \geq \sqrt{15-x}. \quad (39)$$

Решение. Преобразуем числитель дроби:

$$x^3 - 27 - 9x(x - 3) = (x - 3)(x^2 + 3x + 9 - 9x) = (x - 3)^3 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Поскольку квадратный корень $\sqrt{15 - x}$ определён при $15 - x \geq 0$, то модуль $|x - 15| = 15 - x$. Поэтому неравенство (39) равносильно неравенству

$$\begin{aligned} \frac{(x - 3)^3}{15 - x} - \sqrt{15 - x} \geq 0 &\iff \frac{(x - 3)^3 - (\sqrt{15 - x})^3}{15 - x} \geq 0 \iff \\ \iff \begin{cases} 15 - x \neq 0, \\ (x - 3)^3 \geq (\sqrt{15 - x})^3 \end{cases} &\iff \begin{cases} 15 - x \neq 0, \\ (x - 3) \geq \sqrt{15 - x} \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} 15 - x > 0, \\ x - 3 > 0, \\ (x - 3)^2 \geq \sqrt{15 - x} \end{cases} &\iff \begin{cases} 3 < x < 15, \\ x^2 - 5x - 6 \geq 0 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} 3 < x < 15, \\ (x + 1)(x - 6) \geq 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} 3 < x < 15, \\ \begin{cases} x \leq -1, \\ x \geq 6 \end{cases} \end{cases} \iff 6 \leq x < 15. \end{aligned}$$

Ответ: $[6; 15)$.

Задача 50. Решите неравенство

$$\sqrt{x^2 + x + 1} \geq 1 - x - x^2. \quad (40)$$

Решение. Неравенство (40) равносильно неравенству

$$(x^2 + x + 1) + \sqrt{x^2 + x + 1} - 2 \geq 0.$$

Пусть $\sqrt{x^2 + x + 1} = y$. Тогда

$$\begin{cases} y > 0, \\ y^2 + y - 2 \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y > 0, \\ (y + 2)(y - 1) \geq 0 \end{cases} \iff y \geq 1.$$

Следовательно, неравенство (40) равносильно неравенству

$$\sqrt{x^2 + x + 1} \geq 1 \Leftrightarrow x^2 + x + 1 \geq 1^2 \Leftrightarrow x(x + 1) \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -1, \\ x \geq 0, \end{cases}$$

и его множеством решений будет $(-\infty; -1] \cup [0; +\infty)$.

Ответ: $(-\infty; -1] \cup [0; +\infty)$.

Задача 51. Решите неравенство

$$\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} - \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} < \frac{3}{2}. \quad (41)$$

Решение. Выполним подстановку

$$\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} = y,$$

при которой

$$\sqrt{\frac{x-1}{x+1}} = \frac{1}{y}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \begin{cases} y > 0, \\ y - \frac{1}{y} < \frac{3}{2} \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} y > 0, \\ \frac{2y^2 - 3y - 2}{2y} < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} y > 0, \\ (2y + 1)(y - 2) < 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} y > 0, \\ -0,5 < y < 2 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < y < 2. \end{aligned}$$

Неравенство (41) равносильно неравенству

$$0 < \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} < 2 \Leftrightarrow 0 < \frac{x+1}{x-1} < 4 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x+1}{x-1} > 0, \\ \frac{x+1}{x-1} - 4 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x+1)(x-1) > 0, \\ \frac{-3x+5}{x-1} < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x-1 < 0, \\ x+1 < 0, \\ -3x+5 > 0, \end{cases} \\ \begin{cases} x-1 > 0, \\ x+1 > 0, \\ -3x+5 < 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x < 1, \\ x < -1, \\ x < 1\frac{2}{3}, \end{cases} \\ \begin{cases} x > 1, \\ x > -1, \\ x > 1\frac{2}{3} \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x < -1, \\ x > 1\frac{2}{3}. \end{cases} \quad \text{Ответ: } (-\infty; -1) \cup (1\frac{2}{3}; +\infty).$$

Задача 52. Решите неравенство:

$$\text{а) } \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} - \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} \leq \frac{3}{2}; \quad \text{б) } \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} - \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} \geq \frac{3}{2}.$$

$$\text{Ответ: а) } (-\infty; -1) \cup [1\frac{2}{3}; +\infty); \quad \text{б) } (1; 1\frac{2}{3}].$$

Задача 53. Решите неравенство

$$-2(x+1) > (x+2)(\sqrt{x+1} - x - 2). \quad (42)$$

Решение. Способ 1. Пусть $\sqrt{x+1} = y$. Тогда неравенство (42) равносильно системе

$$\begin{cases} y \geq 0, \\ -2y^2 > (y^2+1)(y-y^2-1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y \geq 0, \\ y^4 - y^3 - y + 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} y \geq 0, \\ y^3(y-1) - (y-1) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y \geq 0, \\ (y-1)(y^3-1) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} y \geq 0, \\ (y-1)^2(y^2+y+1) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq y < 1, \\ y > 1. \end{cases}$$

Учитывая подстановку, получаем совокупность

$$\begin{cases} 0 \leq \sqrt{x+1} < 1, \\ \sqrt{x+1} > 1 \end{cases} \iff \begin{cases} 0 \leq x+1 < 1, \\ x+1 > 1 \end{cases} \iff \begin{cases} -1 \leq x < 0, \\ x > 0. \end{cases}$$

Способ 2. Неравенство (42) определено при $x \geq -1$. Если $x = -1$, то неравенство выполняется. Считая, что $x > -1$, разделим обе части неравенства на $x+1$

$$-2 > (x+2) \left(\frac{1}{\sqrt{x+1}} - \frac{x+2}{x+1} \right) \iff \left(\frac{x+2}{\sqrt{x+1}} \right)^2 - \frac{x+2}{\sqrt{x+1}} - 2 > 0. \quad (43)$$

Полагая $\frac{x+2}{\sqrt{x+1}} = y$, неравенство (43) запишем в виде

$$y^2 - y - 2 > 0 \iff (y+1)(y-2) > 0 \iff \begin{cases} y < -1, \\ y > 2. \end{cases}$$

Таким образом, неравенство (43) равносильно совокупности

$$\begin{cases} \frac{x+2}{\sqrt{x+1}} < -1, \\ \frac{x+2}{\sqrt{x+1}} > 2 \end{cases} \iff \begin{cases} \begin{cases} x > -1, \\ x+2 + \sqrt{x+1} < 0, \end{cases} \\ \begin{cases} x > -1, \\ x+2 - 2\sqrt{x+1} > 0 \end{cases} \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x > -1, \\ (\sqrt{x+1} - 1)^2 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > -1, \\ \begin{cases} -1 < x < 0, \\ x > 0 \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} -1 < x < 0, \\ x > 0. \end{cases}$$

Ответ: $[-1; 0) \cup (0; +\infty)$.

Задача 54. Решите неравенство

$$\frac{\sqrt{2-x} + 4x - 3}{x} \geq 2. \quad (44)$$

Решение. Неравенство (44) равносильно неравенству

$$\frac{\sqrt{2-x} + 2x - 3}{x} \geq 0. \quad (45)$$

Пусть $\sqrt{2-x} = y$. Тогда $x = 2 - y^2$.

Из неравенства (45) с учётом замены получаем систему

$$\begin{aligned} & \begin{cases} y \geq 0, \\ \frac{y + 2(2 - y^2) - 3}{2 - y^2} \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y \geq 0, \\ \frac{1 + y - 2y^2}{2 - y^2} \geq 0 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} y \geq 0, \\ \frac{(2y + 1)(1 - y)}{(\sqrt{2} + y)(\sqrt{2} - y)} \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y \geq 0, \\ \frac{1 - y}{\sqrt{2} - y} \geq 0 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} y \geq 0, \\ \begin{cases} y \leq 1, \\ y > \sqrt{2} \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} 0 \leq y \leq 1, \\ y > \sqrt{2}. \end{cases} \end{aligned}$$

Следовательно, неравенство (44) равносильно совокупности

$$\begin{aligned} & \begin{cases} 0 \leq \sqrt{2-x} \leq 1, \\ \sqrt{2-x} > \sqrt{2} \end{cases} \iff \begin{cases} 0 \leq 2-x \leq 1, \\ 2-x > 2 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} -2 \leq -x \leq -1, \\ x < 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 1 \leq x \leq 2, \\ x < 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Ответ: $(-\infty; 0) \cup [1; 2]$.

Задача 55. Решите неравенство

$$\sqrt[3]{x-1} - \sqrt{x+2} - 2 < 0. \quad (46)$$

Решение. Неравенство (46) равносильно неравенству

$$\begin{aligned} & \sqrt[3]{x-1} < 2 + \sqrt{x+2} \iff x-1 < (2 + \sqrt{x+2})^3 \iff \\ & \iff x-1 < 2^3 + 3 \cdot 2^2 \cdot \sqrt{x+2} + 3 \cdot 2(\sqrt{x+2})^2 + (\sqrt{x+2})^3 \iff \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow (x + 14) \cdot \sqrt{x + 2} > -5x - 21 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2 \geq 0, \\ ((x + 2) + 12) \cdot \sqrt{x + 2} > -(5(x + 2) + 11) \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x + 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -2. \quad \text{Ответ: } [-2; +\infty).$$

Задача 56. Решите неравенство

$$\sqrt[3]{x-2} - \sqrt{x-1} + 1 > 0. \quad \text{Ответ: } (2; 10).$$

Задача 57. Решите неравенство

$$\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{2x-3} < \sqrt[3]{12(x-1)}. \quad (47)$$

Решение. Обе части уравнения

$$\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{2x-3} = \sqrt[3]{12(x-1)} \quad (48)$$

возведём в куб и получим равносильное уравнение

$$\begin{aligned} & (\sqrt[3]{x})^3 + 3(\sqrt[3]{x})^2 \cdot \sqrt[3]{2x-3} + \\ & + 3\sqrt[3]{x} \cdot (\sqrt[3]{2x-3})^2 + (\sqrt[3]{2x-3})^3 = 12(x-1) \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \sqrt[3]{x(2x-3)} \cdot (\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{2x-3}) = 3(x-1). \end{aligned}$$

Отсюда, учитывая уравнение (48), получаем новое уравнение

$$\sqrt[3]{x(2x-3)} \cdot \sqrt[3]{12(x-1)} = 3(x-1). \quad (49)$$

Обе части уравнения (49) возведём в куб и получим равносильное уравнение

$$\begin{aligned} 12x(x-1)(2x-3) &= 27(x-1)^3 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (x-1)(x-3)^2 &= 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1, \\ x = 3. \end{cases} \end{aligned}$$

Переход от уравнения (48) к уравнению (49) осуществлён при тех значениях переменной x , при которых сумма $\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{2x-3}$ равна ку-

бическому корню $\sqrt[3]{12(x-1)}$. Поэтому любое решение уравнения (48) будет решением уравнения (49).

Однако не каждый корень уравнения (49) должен быть корнем уравнения (48). Это следует из того, что уравнение (49) в своём задании не предполагает равенства (48). Уравнение (49) лишь получено с учётом уравнения (48). Поэтому необходима проверка.

При $x = 1$ выражение $\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{2x-3}$, расположенное в левой части уравнения (48), принимает значение 0. Выражение $\sqrt[3]{12(x-1)}$, расположенное в правой части уравнения (48), при $x = 1$ принимает значение 0. Число 1 является корнем уравнения (48).

При $x = 3$ выражение $\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{2x-3}$ принимает значение $2\sqrt[3]{3}$. Такое же значение принимает выражение $\sqrt[3]{12(x-1)}$ при $x = 3$. Значит, 3 — корень уравнения (48).

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{2x-3} - \sqrt[3]{12(x-1)} \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

с помощью которой неравенство (47) запишем в виде

$$f(x) < 0.$$

Тогда множеством решений неравенства (47) будет множество тех значений аргумента x , при которых функция f принимает отрицательные значения.

Функция f имеет два нуля $x = 1$ и $x = 3$ и является непрерывной. Поэтому на числовых промежутках $(-\infty; 1)$, $(1; 3)$ и $(3; +\infty)$ она сохраняет знак.

Так как

$$0 \in (-\infty; 1), \quad \text{а} \quad f(0) = -\sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{12} > 0,$$

$$\frac{3}{2} \in (1; 3), \quad \text{а} \quad f\left(\frac{3}{2}\right) = \sqrt[3]{\frac{3}{2}} - \sqrt[3]{6} < 0,$$

$$4 \in (3; +\infty), \quad \text{а} \quad f(4) = \sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{36} < 0,$$

то

$$f(x) > 0 \quad \forall x \in (-\infty; 1) \quad \text{и} \quad f(x) < 0 \quad \forall x \in (1; 3) \cup (3; +\infty).$$

Следовательно, множеством решений строгого неравенства (47) будет множество $(1; 3) \cup (3; +\infty)$. Ответ: $(1; 3) \cup (3; +\infty)$.

Задача 58. Решите неравенство:

а) $\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{2x-3} \leq \sqrt[3]{12(x-1)}$; б) $\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{2x-3} > \sqrt[3]{12(x-1)}$;

в) $\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{2x-3} \geq \sqrt[3]{12(x-1)}$; г) $\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{2x-1} > \sqrt[3]{x+1}$;

д) $\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{2x-1} < \sqrt[3]{x+1}$; е) $\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{2x-1} \leq \sqrt[3]{x+1}$.

Ответ: а) $[1; +\infty)$; б) $(-\infty; 1)$; в) $(-\infty; 1] \cup \{3\}$; г) $(1\frac{1}{62}; +\infty)$;
д) $(-\infty; 1\frac{1}{62})$; е) $(-\infty; 1\frac{1}{62}]$.

Задача 59. Решите неравенство

$$\sqrt[5]{1+x} + \sqrt[5]{1-x} \geq \sqrt[5]{2}. \quad (50)$$

Решение. Рассмотрим функцию

$$f(x) = \sqrt[5]{1+x} + \sqrt[5]{1-x} - \sqrt[5]{2} \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

с помощью которой неравенство (50) запишем в виде

$$f(x) \geq 0.$$

Тогда множеством решений неравенства (50) будет множество тех значений аргумента x , при которых функция f принимает неотрицательные значения.

Нулями функции f будут корни уравнения

$$\sqrt[5]{1+x} + \sqrt[5]{1-x} = \sqrt[5]{2}. \quad (51)$$

Пусть

$$u = \sqrt[5]{1+x}, \quad \text{а} \quad v = \sqrt[5]{1-x}.$$

Тогда

$$u^5 + v^5 = 2.$$

Из уравнения (51) получаем уравнение

$$u + v = \sqrt[5]{u^5 + v^5},$$

обе части которого возведём в пятую степень и получим равносильное уравнение

$$\begin{aligned} u^5 + 5u^4v + 10u^3v^2 + 10u^2v^3 + 5uv^4 + v^5 = u + v &\iff \\ \iff uv(u + v)(u^2 + v^2 + uv) = 0 &\iff \begin{cases} u = 0, \\ v = 0, \\ u = -v, \end{cases} \end{aligned}$$

так как

$$u^2 + v^2 + uv = 0 \iff \frac{1}{2}((u + v)^2 + u^2 + v^2) = 0 \iff \begin{cases} u = 0, \\ v = 0. \end{cases}$$

С учётом замены имеем:

$$\sqrt[5]{1+x} = 0 \iff 1+x = 0 \iff x = -1;$$

$$\sqrt[5]{1-x} = 0 \iff 1-x = 0 \iff x = 1;$$

$$\sqrt[5]{1+x} = -\sqrt[5]{1-x} \iff 1+x = -(1-x) \iff 1 = -1,$$

что неверно.

Следовательно, непрерывная функция f имеет два нуля $x = -1$ и $x = 1$. Поэтому на числовых промежутках $(-\infty; -1)$, $(-1; 1)$ и $(1; +\infty)$ она сохраняет знак.

Так как

$$-2 \in (-\infty; -1), \quad \text{а} \quad f(-2) = \sqrt[5]{3} - (1 + \sqrt[5]{2}) < 0,$$

$$0 \in (-1; 1), \quad \text{а} \quad f(0) = 2 - \sqrt[5]{2} > 0,$$

$$2 \in (1; +\infty), \quad \text{а} \quad f(2) = f(-2) < 0,$$

то

$$f(x) < 0 \quad \forall x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty) \quad \text{и} \quad f(x) > 0 \quad \forall x \in (-1; 1).$$

Таким образом, решением нестрогого неравенства (50) будет отрезок $[-1; 1]$. Ответ: $[-1; 1]$.

Задача 60. Решите неравенство:

а) $\sqrt[5]{1+x} + \sqrt[5]{1-x} > \sqrt[5]{2}$; б) $\sqrt[5]{1+x} + \sqrt[5]{1-x} < \sqrt[5]{2}$;

в) $\sqrt[5]{1+x} + \sqrt[5]{1-x} \leq \sqrt[5]{2}$.

Ответ: а) $(-1; 1)$; б) $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$; в) $(-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$.

Задача 61. Сколько целых решений имеет неравенство

$$\sqrt{2-x} - \frac{3}{\sqrt{2-x}} \leq -2? \quad (52)$$

Решение. Способ 1. Неравенство

$$\begin{aligned} \sqrt{2-x} - \frac{3}{\sqrt{2-x}} \leq -2 &\iff \sqrt{2-x} - \frac{3}{\sqrt{2-x}} + 2 \leq 0 \iff \\ \iff \frac{(\sqrt{2-x})^2 + 2\sqrt{2-x} - 3}{\sqrt{2-x}} \leq 0 &\iff \frac{(\sqrt{2-x} + 1)^2 - 4}{\sqrt{2-x}} \leq 0 \iff \\ \iff \frac{(\sqrt{2-x} + 1 - 2)(\sqrt{2-x} + 1 + 2)}{\sqrt{2-x}} \leq 0 &\iff \\ \iff \frac{(\sqrt{2-x} - 1)(\sqrt{2-x} + 3)}{\sqrt{2-x}} \leq 0 &\iff \frac{\sqrt{2-x} - 1}{\sqrt{2-x}} \leq 0 \iff \\ \iff \begin{cases} \sqrt{2-x} - 1 \leq 0, \\ \sqrt{2-x} \neq 0 \end{cases} &\iff 0 < \sqrt{2-x} \leq 1 \iff \\ \iff 0 < 2-x \leq 1 &\iff -1 \leq x-2 < 0 \iff 1 \leq x < 2. \end{aligned}$$

Итак, $[1; 2)$ — множество решений неравенства (52).

Полуинтервалу $[1; 2)$ принадлежит одно целое число 1.

Способ 2. Неравенство (52) равносильно неравенству

$$\begin{aligned} & \sqrt{2-x} + 2 - \frac{3}{\sqrt{2-x}} \leq 0 \iff \\ & \iff \left(\sqrt{2-x} + 2 + \frac{1}{\sqrt{2-x}} \right) - \frac{4}{\sqrt{2-x}} \leq 0 \iff \\ & \iff \left(\sqrt[4]{2-x} + \frac{1}{\sqrt[4]{2-x}} \right)^2 - \left(\frac{2}{\sqrt[4]{2-x}} \right)^2 \leq 0 \iff \\ & \iff \left(\sqrt[4]{2-x} - \frac{1}{\sqrt[4]{2-x}} \right) \left(\sqrt[4]{2-x} + \frac{3}{\sqrt[4]{2-x}} \right) \leq 0 \iff \\ & \iff \sqrt[4]{2-x} - \frac{1}{\sqrt[4]{2-x}} \leq 0 \iff \frac{\sqrt{2-x} - 1}{\sqrt[4]{2-x}} \leq 0 \iff \\ & \iff \begin{cases} 2-x \neq 0, \\ \sqrt{2-x} - 1 \leq 0, \end{cases} \iff \begin{cases} 2-x \neq 0, \\ \sqrt{2-x} \leq 1 \end{cases} \iff \\ & \iff 0 < 2-x \leq 1 \iff -2 < -x \leq -1 \iff 1 \leq x < 2. \end{aligned}$$

Множеству решений $[1; 2)$ неравенства (52) принадлежит одно целое число 1.

Способ 3. Уравнение

$$\begin{aligned} \sqrt{2-x} - \frac{3}{\sqrt{2-x}} = -2 & \iff \frac{(\sqrt{2-x})^2 + 2\sqrt{2-x} - 3}{\sqrt{2-x}} = 0 \iff \\ & \iff \frac{(\sqrt{2-x} + 3)(\sqrt{2-x} - 1)}{\sqrt{2-x}} \leq 0 \iff \sqrt{2-x} = 1 \iff \\ & \iff 2-x = 1 \iff x = 1. \end{aligned}$$

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \sqrt{2-x} - \frac{3}{\sqrt{2-x}} + 2 \quad \forall x \in (-\infty; 2),$$

с помощью которой неравенство (52) запишем в виде

$$f(x) \leq 0.$$

Тогда множеством решений неравенства (52) будет множество тех значений аргумента x , при которых функция f принимает неположительные значения.

Функция f имеет один нуль $x = 1$ и является непрерывной. Поэтому на числовых промежутках $(-\infty; 1)$ и $(1; 2)$ она сохраняет знак. Так как

$$-2 \in (-\infty; 1), \quad \text{а} \quad f(-2) = 2 - \frac{3}{2} + 2 = \frac{5}{2} > 0,$$

$$\frac{3}{2} \in (1; 2), \quad \text{а} \quad f\left(\frac{3}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{2}} - 3\sqrt{2} + 2 = 2 + \frac{\sqrt{2}}{2} - 3\sqrt{2} < 0,$$

то

$$f(x) > 0 \quad \forall x \in (-\infty; 1) \quad \text{и} \quad f(x) < 0 \quad \forall x \in (1; 2).$$

Значит, решением неравенства (52) будет полуинтервал $[1; 2)$.

Полуинтервалу $[1; 2)$ принадлежит одно целое число 1.

Ответ: 1.

Задача 62. Пусть S — сумма всех целочисленных решений неравенства.

$$\frac{\sqrt{27 - 2x - x^2}}{3 - x} < 1. \tag{53}$$

Выберите верное условие:

1) $-18 < S \leq -14$; 2) $S \leq 18$; 3) $-8 < S \leq -3$;
4) $-3 < S \leq 4$.

Решение. Если $3 - x < 0$, а $27 - 2x - x^2 \geq 0$, то

$$\frac{\sqrt{27 - 2x - x^2}}{3 - x} \leq 0, \quad \text{тем более,} \quad \frac{\sqrt{27 - 2x - x^2}}{3 - x} < 1.$$

Если $3 - x > 0$, то неравенство (53) равносильно неравенству

$$\sqrt{27 - 2x - x^2} < 3 - x.$$

Значит, неравенство (53) равносильно совокупности двух систем.
Первая система

$$\begin{aligned} & \begin{cases} 3 - x < 0, \\ 27 - 2x - x^2 \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x - 3 > 0, \\ x^2 + 2x - 27 \leq 0 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} x > 3, \\ (x + 1 + 2\sqrt{7})(x + 1 - 2\sqrt{7}) \leq 0 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} x > 3, \\ x + 1 - 2\sqrt{7} \leq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 3, \\ x \leq 2\sqrt{7} - 1 \end{cases} \iff 3 < x \leq 2\sqrt{7} - 1. \end{aligned}$$

Вторая система

$$\begin{aligned} & \begin{cases} 3 - x > 0, \\ \sqrt{27 - 2x - x^2} < 3 - x \end{cases} \iff \begin{cases} x - 3 < 0, \\ 27 - 2x - x^2 \geq 0, \\ 27 - 2x - x^2 < (3 - x)^2 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} x - 3 < 0, \\ x^2 + 2x - 27 \leq 0, \\ x^2 - 2x - 9 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x < 3, \\ (x + 1 + 2\sqrt{7})(x + 1 - 2\sqrt{7}) \leq 0, \\ (x - 1 + \sqrt{10})(x - 1 - \sqrt{10}) > 0 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} x < 3, \\ x + 1 + 2\sqrt{7} \geq 0, \\ x - 1 + \sqrt{10} < 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x < 3, \\ x \geq -1 - 2\sqrt{7}, \\ x < 1 - \sqrt{10} \end{cases} \iff \\ & \iff -1 - 2\sqrt{7} \leq x < 1 - \sqrt{10}. \end{aligned}$$

Значит, множеством решений неравенства (53) будет

$$[-1 - 2\sqrt{7}; 1 - \sqrt{10}) \cup (3; 2\sqrt{7} - 1].$$

Поскольку

$$-7 = -1 - 2\sqrt{9} < -1 - 2\sqrt{7} < -1 - 2\sqrt{6,25} = -6,$$

$$-3 = 1 - \sqrt{16} < 1 - \sqrt{10} < 1 - \sqrt{9} = -2,$$

$$4 = 2\sqrt{6,25} - 1 < 2\sqrt{7} - 1 < 2\sqrt{9} - 1 = 5,$$

то целыми решениями неравенства (53) будут числа:

$$-6, -5, -4, -3, 4.$$

Их сумма $S = -6 - 5 - 4 - 3 + 4 = -14$ и удовлетворяет условию

$$-18 < S \leq -14. \quad \text{Ответ: 1)}.$$

Задача 63. Найдите промежуток, содержащий только одно x , удовлетворяющее неравенству

$$\frac{\sqrt{6-x-x^2}}{x+9} \leq \frac{\sqrt{6-x-x^2}}{2x+8} : \quad (54)$$

$1) [2; 3]; 2) [-3; -2]; 3) [-2; -1]; 4) [-2; 1].$

Решение. Неравенство (54) равносильно неравенству

$$\sqrt{6-x-x^2} \cdot \left(\frac{1}{x+9} - \frac{1}{2x+8} \right) \leq 0 \Leftrightarrow \sqrt{6-x-x^2} \cdot \frac{x-1}{(x+9)(x+4)} \leq 0.$$

Значит, неравенство (54) равносильно совокупности двух систем.

Первая система

$$\begin{cases} 6-x-x^2=0, \\ x \neq -9, \\ x \neq -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x+3)(x-2)=0, \\ x \neq -9, \\ x \neq -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3, \\ x = 2. \end{cases}$$

Вторая система

$$\begin{cases} 6-x-x^2 > 0, \\ \frac{x-1}{(x+9)(x+4)} \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x+3)(x-2) < 0, \\ \frac{x-1}{(x+9)(x+4)} \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow -3 < x \leq 1,$$

что устанавливаем с помощью числовой прямой (рис. 3), дважды ис-

пользуя метод числовых промежутков.




Рис. 3

Значит, множеством решений неравенства (54) будет объединение

$$(-3; 1) \cup \{-3, 2\} = [-3; 1] \cup \{2\}.$$

Полуинтервал $[2; 3)$ содержит лишь одно решение $x = 2$ неравенства (54). *Ответ:* 1).

Задача 64. Найдите число целых решений неравенства

$$\sqrt[5]{2-x} \cdot \sqrt{-2x^2+9x+5} \geq 0. \quad (55)$$

Решение. Способ 1. Неравенство (55) имеет смысл при

$$-2x^2+9x+5 \geq 0 \iff (2x+1)(x-5) \leq 0 \iff -0,5 \leq x \leq 5.$$

Отрезку $[-0,5; 5]$ принадлежат целые числа: 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Непосредственно подстановкой устанавливаем, что неравенство (55) выполняется при $x = 0, x = 1, x = 2, x = 5$, а при $x = 3, x = 4$ неравенство (55) не выполняется.

Значит, неравенство (55) имеет четыре целых решения.

Способ 2. Неравенство (55) равносильно совокупности, состоящей из уравнения и системы.

Уравнение

$$-2x^2+9x+5=0 \iff (2x+1)(x-5)=0 \iff \begin{cases} x = -0,5, \\ x = 5. \end{cases}$$

Система

$$\begin{cases} -2x^2+9x+5 > 0, \\ \sqrt[5]{2-x} \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} (2x+1)(x-5) < 0, \\ 2-x \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -0,5 < x < 5, \\ x \leq 2 \end{cases} \iff -0,5 < x \leq 2.$$

Стало быть, множеством решений неравенства (55) будет объединение $A = [-0,5; 2] \cup \{5\}$.

Множеству A принадлежит четыре целых числа: 0, 1, 2, 5.

Ответ: 4.

§ 3. ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С РАДИКАЛАМИ

1. Тригонометрические уравнения и неравенства

Задача 1. Решите уравнение

$$\sqrt{4 - 3 \sin x} = -2 \cos x. \quad (1)$$

Решение. Уравнение (1) равносильно системе

$$\begin{cases} \cos x \leq 0, \\ 4 - 3 \sin x = (-2 \cos x)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} \cos x \leq 0, \\ 4 - 3 \sin x = 4 \cos^2 x \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} \cos x \leq 0, \\ 4 \sin^2 x - 3 \sin x = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \cos x \leq 0, \\ \sin x(4 \sin x - 3) = 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} \begin{cases} \cos x \leq 0, \\ \sin x = 0, \end{cases} \\ \begin{cases} \cos x \leq 0, \\ \sin x = \frac{3}{4} \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \pi + 2\pi k, \\ x = \pi - \arcsin \frac{3}{4} + 2\pi k \quad \forall k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ: $\left\{ \pi + 2\pi k, -\arcsin \frac{3}{4} + \pi(2k + 1) \right\} \forall k \in \mathbb{Z}$.

Задача 2. Решите уравнение

$$\sqrt{9 + 2 \cos x} = -3 \sin x. \quad (2)$$

Решение. Уравнение (2) равносильно системе

$$\begin{cases} \sin x \leq 0, \\ 9 + 2 \cos x = 9 \sin^2 x \end{cases} \iff \begin{cases} \sin x \leq 0, \\ \cos x \left(\cos x + \frac{2}{9} \right) = 0 \end{cases} \iff$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x \leq 0, \\ \cos x = 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \\ x = \pi + \arccos \frac{2}{9} + 2\pi k \quad \forall k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ: $\left\{ -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \arccos \frac{2}{9} + \pi(2k + 1) \right\} \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$

Задача 3. Решите уравнение:

а) $\sqrt{1 - 2 \sin x} = \cos x;$ б) $\sqrt{2 - \sqrt{3} \sin x} = \sqrt{2} \cos x;$

в) $\sqrt{1 - 2 \cos x} = \sin x;$ г) $\sqrt{3 - 2 \cos x} = -\sqrt{3} \sin x.$

Ответ: а) $\{2\pi n\} \quad \forall n \in \mathbb{Z};$ б) $\left\{ 2\pi k; \frac{\pi}{3} + 2\pi k \right\} \quad \forall k \in \mathbb{Z};$

в) $\left\{ \frac{\pi}{2} + 2\pi n \right\} \quad \forall n \in \mathbb{Z};$ г) $\left\{ -\frac{\pi}{2} + 2\pi k; -\arccos \frac{2}{3} + 2\pi k \right\} \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$

Задача 4. Решите уравнение

$$\sqrt{2 + \sin \pi x^2} - \sqrt{2 + \pi x^2} = 7. \quad (3)$$

Решение. Уравнение (3) равносильно уравнению

$$\sqrt{2 + \sin \pi x^2} = 7 + \sqrt{2 + \pi x^2}.$$

В соответствии со свойством ограниченности функции синус имеет место оценка

$$-1 \leq \sin \pi x^2 \leq 1 \iff 1 \leq 2 + \sin \pi x^2 \leq 3 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Следовательно,

$$1 \leq \sqrt{2 + \sin \pi x^2} \leq \sqrt{3} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

В то же время

$$\sqrt{2 + \pi x^2} \geq \sqrt{2} \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

а значит,

$$7 + \sqrt{2 + \pi x^2} \geq 7 + \sqrt{2} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Таким образом,

$$\sqrt{2 + \sin \pi x^2} \leq \sqrt{3} < 7 + \sqrt{2} \leq 7 + \sqrt{2 + \pi x^2} \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

а значит, уравнение (3) решений не имеет.

Ответ: \emptyset .

Задача 5. Решите уравнение

$$\sqrt{49 - 4x^2} \cdot \left(\sin \pi x + 3 \cos \frac{\pi}{2} x \right) = 0.$$

Решение. Произведение обращается в нуль тогда и только тогда, когда хотя бы один из сомножителей равен нулю, при условии, что все сомножители существуют. Поэтому уравнение

$$\sqrt{49 - 4x^2} \cdot \left(\sin \pi x + 3 \cos \frac{\pi}{2} x \right) = 0 \iff \begin{cases} \sqrt{49 - 4x^2} = 0, \\ 49 - 4x^2 \geq 0, \\ \sin \pi x + 3 \cos \frac{\pi}{2} x = 0. \end{cases}$$

Уравнение

$$\sqrt{49 - 4x^2} = 0 \iff 49 - 4x^2 = 0 \iff x^2 = \frac{49}{4} \iff \begin{cases} x = -3\frac{1}{2}, \\ x = 3\frac{1}{2}. \end{cases}$$

Система

$$\begin{cases} 49 - 4x^2 \geq 0, \\ \sin \pi x + 3 \cos \frac{\pi}{2} x = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 \leq \frac{49}{4}, \\ 2 \sin \frac{\pi}{2} x \cos \frac{\pi}{2} x + 3 \cos \frac{\pi}{2} x = 0 \end{cases} \iff$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| \leq 3\frac{1}{2}, \\ \cos \frac{\pi}{2} x (2 \sin \frac{\pi}{2} x + 3) = 0 \end{cases} & \Leftrightarrow \begin{cases} -3\frac{1}{2} \leq x \leq 3\frac{1}{2}, \\ \cos \frac{\pi}{2} x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} -3\frac{1}{2} \leq x \leq 3\frac{1}{2}, \\ \frac{\pi}{2} x = \frac{\pi}{2} + \pi k \end{cases} & \Leftrightarrow \begin{cases} -3\frac{1}{2} \leq x \leq 3\frac{1}{2}, \\ x = 1 + 2k, \end{cases} \end{aligned}$$

где k — целое число.

Поскольку

$$-3\frac{1}{2} \leq 1 + 2k \leq 3\frac{1}{2} \Leftrightarrow -4\frac{1}{2} \leq 2k \leq 2\frac{1}{2} \Leftrightarrow -2\frac{1}{4} \leq k \leq 1\frac{1}{4},$$

то целое число k принимает значения: $-2, -1, 0, 1$.

Следовательно, искомыми решениями будут

$$x = -3, x = -1, x = 1, x = 3. \quad \text{Ответ: } \left\{ -3\frac{1}{2}; -3; -1; 1; 3; 3\frac{1}{2} \right\}.$$

Задача 6. Решите уравнение:

$$\text{а) } \sqrt{4-x^2} \cdot (\sin 2\pi x - 3 \cos \pi x) = 0; \quad \text{б) } \sqrt{1-x^2} \cdot (\cos^2 x - \sin^2 x) = 0.$$

$$\text{Ответ: а) } \left\{ -2; -1\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 1\frac{1}{2}; 2 \right\}; \quad \text{б) } \left\{ \pm 1, \pm \frac{\pi}{4} \right\}.$$

Задача 7. Решите уравнение

$$\sqrt{4-2\sqrt{11-x^2}-\sqrt{11}x} \cdot (5+2\cos 2\pi x+8\cos \pi x) = 0. \quad (4)$$

Решение. Произведение двух выражений равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один из сомножителей равен нулю, при условии, что произведение имеет смысл.

Поэтому уравнение (4) равносильно совокупности, состоящей из уравнения и системы.

Уравнение

$$4 - 2\sqrt{11} - x^2 - \sqrt{11}x = 0 \iff x^2 + \sqrt{11}x + 2\sqrt{11} - 4 = 0 \iff$$

$$\iff (x + 2)(x - 2 + \sqrt{11}) = 0 \iff \begin{cases} x = -2, \\ x = 2 - \sqrt{11}. \end{cases}$$

Система

$$\begin{cases} 4 - 2\sqrt{11} - x^2 - \sqrt{11}x > 0, \\ 5 + 2 \cos 2\pi x + 8 \cos \pi x = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 + \sqrt{11}x + 2\sqrt{11} - 4 < 0, \\ 5 + 4 \cos^2 \pi x - 2 + 8 \cos \pi x = 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} (x + 2)(x - (2 - \sqrt{11})) < 0, \\ 4 \cos^2 \pi x + 8 \cos \pi x + 3 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} (x + 2)(x - (2 - \sqrt{11})) < 0, \\ (2 \cos \pi x + 3)(2 \cos \pi x + 1) = 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} -2 < x < 2 - \sqrt{11}, \\ \cos \pi x = -0,5 \end{cases} \iff \begin{cases} -2 < x < 2 - \sqrt{11}, \\ \pi x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} -2 < x < 2 - \sqrt{11}, \\ x = \pm \frac{2}{3} + 2n, n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Из неравенства

$$-2 < \frac{2}{3} + 2n < 2 - \sqrt{11} \iff -2\frac{2}{3} < 2n < 1\frac{1}{3} - \sqrt{11} \iff$$

$$\iff -\frac{4}{3} < n < \frac{2}{3} - \frac{1}{2}\sqrt{11}$$

с учётом того, что

$$100 > 99 \iff 10 > 3\sqrt{11} \iff \frac{5}{3} > \frac{\sqrt{11}}{2} \iff \frac{2}{3} - \frac{\sqrt{11}}{2} > -1,$$

но

$$16 < 99 \iff 4 < 3\sqrt{11} \iff \frac{2}{3} < \frac{\sqrt{11}}{2} \iff \frac{2}{3} - \frac{\sqrt{11}}{2} < 0,$$

следует, что целое число $n = -1$.

Следовательно, $x = -1\frac{1}{3}$ является решением уравнения (4).

Неравенство

$$\begin{aligned} -2 < -\frac{2}{3} + 2n < 2 - \sqrt{11} &\iff -1\frac{1}{3} < 2n < 2\frac{2}{3} - \sqrt{11} \iff \\ &\iff -\frac{2}{3} < n < \frac{4}{3} - \frac{1}{2}\sqrt{11} \end{aligned}$$

не выполняется ни при каком целом n , так как

$$64 < 99 \iff 8 < 3\sqrt{11} \iff \frac{4}{3} < \frac{\sqrt{11}}{2} \iff \frac{4}{3} - \frac{\sqrt{11}}{2} < 0.$$

Таким образом, множество решений уравнения (4) состоит из чисел -2 , $-1\frac{1}{3}$ и $2 - \sqrt{11}$. *Ответ:* $\left\{-2, -1\frac{1}{3}, 2 - \sqrt{11}\right\}$.

Задача 8. Решите уравнение

$$\sqrt{\sin^4 x + \cos^4 x - \frac{3}{8}} + \cos x - \sin x = 0. \quad (5)$$

Решение. Подкоренное выражение

$$\begin{aligned} \sin^4 x + \cos^4 x - \frac{3}{8} &= (\sin^4 x + 2\sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x) - \frac{3}{8} - 2\sin^2 x \cos^2 x = \\ &= (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - \frac{3}{8} - 2\sin^2 x \cos^2 x = \frac{5}{8} - 2\sin^2 x \cos^2 x \quad \forall x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Уравнение (5) равносильно уравнению

$$\sqrt{\frac{5}{8} - 2\sin^2 x \cos^2 x} = \sin x - \cos x \iff$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x - \cos x \geq 0, \\ \frac{5}{8} - 2 \sin^2 x \cos^2 x = (\sin x - \cos x)^2 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x - \cos x \geq 0, \\ \frac{5}{8} - 2 \sin^2 x \cos^2 x = 1 - 2 \sin x \cos x \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x - \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x \geq 0, \\ 4 \sin^2 2x - 8 \sin 2x + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \geq 0, \\ \left(\sin 2x - \frac{1}{2}\right)\left(\sin 2x - \frac{3}{2}\right) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \geq 0, \\ \sin 2x = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2\pi n \leq x - \frac{\pi}{4} \leq \pi + 2\pi n, \\ 2x = (-1)^k \cdot \frac{\pi}{6} + \pi k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{4} + 2\pi n \leq x \leq \frac{5\pi}{4} + 2\pi n, \\ x = (-1)^k \cdot \frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{2} \end{cases}$$

где k и n — целые числа.

Множество чисел $\left\{(-1)^k \cdot \frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{2}\right\} \forall k \in \mathbb{Z}$, полагая $k = 2p$ и

$k = 2p + 1$, запишем в виде $\left\{\frac{\pi}{12} + \pi p, \frac{5\pi}{12} + \pi p\right\} \forall p \in \mathbb{Z}$.

Так как

$$\frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{12} + \pi p \leq \frac{5\pi}{4} \Leftrightarrow 3 \leq 1 + 12p \leq 15 \Leftrightarrow \frac{1}{6} \leq p \leq \frac{7}{6},$$

то из множества чисел $\left\{\frac{\pi}{12} + \pi p\right\} \forall p \in \mathbb{Z}$ отрезку $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}\right]$ принадле-

жит только число $\frac{13\pi}{12}$.

Так как

$$\frac{\pi}{4} \leq \frac{5\pi}{12} + \pi p \leq \frac{5\pi}{4} \iff 3 \leq 5 + 12p \leq 15 \iff -\frac{1}{6} \leq p \leq \frac{5}{6},$$

то из множества чисел $\left\{ \frac{5\pi}{12} + \pi p \right\} \forall p \in \mathbb{Z}$ отрезку $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{5\pi}{4} \right]$ принадлежит только число $\frac{5\pi}{12}$.

Следовательно, множеством решений уравнения (5) будет

$$\left\{ \frac{5\pi}{12} + 2\pi n, \frac{13\pi}{12} + 2\pi n \right\} \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\left\{ \frac{5\pi}{12} + 2\pi n, \frac{13\pi}{12} + 2\pi n \right\} \forall n \in \mathbb{Z}.$

Задача 9. Решите уравнение

$$\sqrt{\frac{1}{16} + \sin^4 x - \frac{1}{2} \sin^2 x} + \sqrt{\frac{9}{16} + \sin^4 x - \frac{3}{2} \sin^2 x} = \frac{1}{2}. \quad (6)$$

Решение. Выделяя полные квадраты, уравнение (6) приводим к равносильному уравнению

$$\begin{aligned} \sqrt{\left(\sin^2 x - \frac{1}{4}\right)^2} + \sqrt{\left(\sin^2 x - \frac{3}{4}\right)^2} &= \frac{1}{2} \iff \\ \iff \left| \sin^2 x - \frac{1}{4} \right| + \left| \sin^2 x - \frac{3}{4} \right| &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Способ 1. Заметим, что

$$\left(\sin^2 x - \frac{1}{4}\right) - \left(\sin^2 x - \frac{3}{4}\right) = \frac{1}{2}.$$

Согласно

$$|f(x)| + |g(x)| = f(x) - g(x) \iff \begin{cases} f(x) \geq 0, \\ g(x) \leq 0 \end{cases}$$

уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} \sin^2 x - \frac{1}{4} \geq 0, \\ \sin^2 x - \frac{3}{4} \leq 0 \end{cases} \iff \frac{1}{4} \leq \sin^2 x \leq \frac{3}{4} \iff$$

$$\iff \frac{1}{2} \leq |\sin x| \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \iff \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}n \leq x \leq \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}n \quad \forall n \in \mathbb{Z},$$

что устанавливаем с помощью единичной окружности (рис. 1).

Способ 2. Если $0 \leq \sin^2 x < \frac{1}{4}$, то

$$-\sin^2 x + \frac{1}{4} - \sin^2 x + \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \iff \sin^2 x = \frac{1}{4}.$$

Следовательно, таких решений, что $0 \leq \sin^2 x < \frac{1}{4}$, нет.

Если $\frac{1}{4} \leq \sin^2 x \leq \frac{3}{4}$, то

$$\sin^2 x - \frac{1}{4} - \sin^2 x + \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \iff \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Значит, любое x , удовлетворяющее неравенству $\frac{1}{4} \leq \sin^2 x \leq \frac{3}{4}$,

является решением уравнения (6).

Если $\sin^2 x > \frac{3}{4}$, то

$$\sin^2 x - \frac{1}{4} + \sin^2 x - \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \iff$$

$$\iff \sin^2 x = \frac{3}{4}.$$

Стало быть, таких решений, что

$$\frac{3}{4} < \sin^2 x \leq 1, \text{ нет.}$$




Рис. 1

Используя единичную окружность (рис. 1), решим неравенство

$$\frac{1}{4} \leq \sin^2 x \leq \frac{3}{4} \iff \frac{1}{2} \leq |\sin x| \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \iff$$

$$\iff \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} n \leq x \leq \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} n \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\left[\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} n; \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} n \right] \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$

Задача 10. Решите уравнение

$$\sqrt{\frac{1}{16} + \cos^4 x - \frac{1}{2} \cos^2 x} + \sqrt{\frac{9}{16} + \cos^4 x - \frac{3}{2} \cos^2 x} = \frac{1}{2}.$$

Ответ: $\left[\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} n; \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} n \right] \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$

Задача 11. Решите уравнение

$$\cos \sqrt{x} = \cos x. \tag{7}$$

Решение. Уравнение (7) равносильно совокупности

$$\begin{cases} \sqrt{x} = x + 2\pi n, \\ \sqrt{x} = -x + 2\pi n \end{cases} \iff \begin{cases} (\sqrt{x})^2 - \sqrt{x} - 2\pi n = 0, \\ (\sqrt{x})^2 + \sqrt{x} - 2\pi n = 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} \sqrt{x} = \frac{1 - \sqrt{1 + 8\pi n_1}}{2}, \\ \sqrt{x} = \frac{1 + \sqrt{1 + 8\pi n_2}}{2}, \\ \sqrt{x} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 8\pi n}}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} \sqrt{x} = \frac{1 + \sqrt{1 + 8\pi k}}{2}, \\ \sqrt{x} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 8\pi k}}{2} \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x = \frac{2 + 2\sqrt{1 + 8\pi k} + 8\pi k}{4}, \\ x = \frac{2 - 2\sqrt{1 + 8\pi k} + 8\pi k}{4} \end{cases} \iff x = \frac{1 + 4\pi k \pm \sqrt{1 + 8\pi k}}{2},$$

где $m_1 = 0$, $m_2 = 0, 1, 2, \dots$, $n = 0, 1, 2, \dots$, $k = 0, 1, 2, \dots$.

$$\text{Ответ: } \left\{ \frac{1 + 4\pi k \pm \sqrt{1 + 8\pi k}}{2} \right\} \forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Задача 12. Решите уравнение

$$2 \sqrt[3]{\sin x} + \sqrt[6]{\sin x \cos x} - 3 \sqrt[3]{\cos x} = 0. \quad (8)$$

Решение. Поскольку $\sin x$ и $\cos x$ одновременно не обращаются в нуль (у функций синус и косинус нет общих нулей), то в результате деления уравнения (8) на $\sqrt[3]{\cos x}$ получим равносильное уравнение

$$2 \sqrt[3]{\operatorname{tg} x} + \sqrt[6]{\operatorname{tg} x} - 3 = 0.$$

Положим

$$\sqrt[6]{\operatorname{tg} x} = v$$

и рассмотрим алгебраическое уравнение

$$2v^2 + v - 3 = 0 \iff (2v + 3)(v - 1) = 0 \iff \begin{cases} v = -1\frac{1}{2}, \\ v = 1. \end{cases}$$

Положительному корню $v = 1$ соответствует

$$\sqrt[6]{\operatorname{tg} x} = 1 \iff \operatorname{tg} x = 1 \iff x = \frac{\pi}{4} + \pi n \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Подстановка предполагает, что $v \geq 0$. Поэтому у тригонометрического уравнения (8) других решений нет. *Ответ:* $\left\{ \frac{\pi}{4} + \pi n \right\} \forall n \in \mathbb{Z}$.

Задача 13. Решите уравнение

$$\sqrt{\cos \frac{x}{1990} - \frac{1}{2}} + \sqrt{\cos x - \frac{1}{2}} = \sqrt{\cos \frac{x}{1990} + \cos x - 1}. \quad (9)$$

Решение. Уравнение (9) определено при

$$\cos \frac{x}{1990} \geq \frac{1}{2} \quad \text{и} \quad \cos x \geq \frac{1}{2}.$$

Возведём в квадрат обе части уравнения (9):

$$\begin{aligned} & \cos \frac{x}{1990} - \frac{1}{2} + 2 \sqrt{\left(\cos \frac{x}{1990} - \frac{1}{2}\right)\left(\cos x - \frac{1}{2}\right)} + \cos x - \frac{1}{2} = \\ & = \cos \frac{x}{1990} + \cos x - 1 \iff \sqrt{\left(\cos \frac{x}{1990} - \frac{1}{2}\right)\left(\cos x - \frac{1}{2}\right)} = 0 \iff \\ & \iff \left(\cos \frac{x}{1990} - \frac{1}{2}\right)\left(\cos x - \frac{1}{2}\right) = 0. \end{aligned}$$

Следовательно, решениями уравнения (9) будут решения уравнений

$$\cos \frac{x}{1990} = \frac{1}{2} \quad \text{при} \quad \cos x \geq \frac{1}{2}$$

и

$$\cos x = \frac{1}{2} \quad \text{при} \quad \cos \frac{x}{1990} \geq \frac{1}{2}.$$

Уравнение

$$\cos \frac{x}{1990} = \frac{1}{2} \iff \frac{x}{1990} = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k \iff x = \pm \frac{1990\pi}{3} + 3980\pi k,$$

где k — любое целое число.

Используя формулы приведения, находим значение

$$\begin{aligned} \cos\left(\pm \frac{1990\pi}{3} + 3980\pi k\right) &= \cos\left(\pm \frac{1990\pi}{3}\right) = \cos\left(\pm \frac{\pi}{3} + 663\pi\right) = \\ &= -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2} \quad \forall k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Следовательно, уравнение

$$\cos \frac{x}{1990} = \frac{1}{2} \quad \text{при} \quad \cos x \geq \frac{1}{2}$$

решений не имеет.

Среди решений

$$x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

уравнения $\cos x = \frac{1}{2}$ найдём такие, что

$$\cos \frac{x}{1990} \geq \frac{1}{2}. \quad (10)$$

Функция

$$y(x) = \cos \frac{x}{1990} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

является периодической с основным периодом $T_0 = 3980\pi$.

Из множества

$$\left\{ \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k \right\} \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

выделим те числа, которые принадлежат отрезку $[-1990\pi; 1990\pi]$ и при которых выполняется неравенство (10).

Неравенство

$$-1990\pi \leq x \leq 1990\pi \iff -\pi \leq \frac{x}{1990} \leq \pi.$$

Тогда на отрезке $[-1990\pi; 1990\pi]$ решениями тригонометрического неравенства (10) будут

$$\begin{aligned} -\frac{\pi}{3} \leq \frac{x}{1990} \leq \frac{\pi}{3} &\iff -\frac{1990}{3}\pi \leq x \leq \frac{1990}{3}\pi \iff \\ &\iff -663\pi - \frac{\pi}{3} \leq x \leq 663\pi + \frac{\pi}{3}. \end{aligned}$$

Пусть

$$x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Тогда

$$-663\pi - \frac{\pi}{3} \leq -\frac{\pi}{3} + 2\pi k \leq 663\pi + \frac{\pi}{3} \iff$$

$$\iff -663\pi \leq 2\pi k \leq 663\pi + \frac{2\pi}{3} \iff$$

$$\iff -663 \leq 2k \leq 663 + \frac{2}{3} \iff -331 - \frac{1}{2} \leq k \leq 331 + \frac{5}{6},$$

то есть $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm 331$.

Пусть

$$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Тогда

$$-663\pi - \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{3} + 2\pi k \leq 663\pi + \frac{\pi}{3} \iff$$

$$\iff -663\pi - \frac{2\pi}{3} \leq 2\pi k \leq 663\pi \iff$$

$$\iff -663 - \frac{2}{3} \leq 2k \leq 663 \iff -331 - \frac{5}{6} \leq k \leq 331 + \frac{1}{2},$$

то есть $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm 331$.

Итак, на отрезке $[-1990\pi; 1990\pi]$ длины 3980π решениями неравенства (10) среди чисел $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k \quad \forall k \in \mathbb{Z}$ будут

$$x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm 331.$$

Отсюда следует, что среди чисел $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n \quad \forall n \in \mathbb{Z}$ неравенству (10) удовлетворяют числа

$$\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k + 3980s, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm 331 \quad \forall s \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ: } \left\{ \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi(k + 1990s) \right\}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm 331 \quad \forall s \in \mathbb{Z}.$$

Задача 14. Решите уравнение

$$| -1 + \cos(\pi \sqrt[3]{x}) | + | x^2 - 16x + 55 | = 16x - x^2 + \cos(\pi \sqrt[3]{x}) - 56. \quad (11)$$

Решение. Перепишем уравнение (11) в виде

$$\begin{aligned} & | -1 + \cos(\pi \sqrt[3]{x}) | + | x^2 - 16x + 55 | = \\ & = (\cos(\pi \sqrt[3]{x}) - 1) - (x^2 - 16x + 55) \iff \\ \iff & 2(1 - \cos(\pi \sqrt[3]{x})) + | x^2 - 16x + 55 | = - (x^2 - 16x + 55), \end{aligned}$$

так как

$$1 - \cos(\pi \sqrt[3]{x}) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

В левой части полученного равенства расположено неотрицательное выражение, поэтому выражение в правой части этого равенства должно быть неотрицательным. А это значит, что

$$x^2 - 16x + 55 \leq 0 \iff (x - 5)(x - 11) \leq 0 \iff 5 \leq x \leq 11.$$

Ввиду того, что

$$| x^2 - 16x + 55 | = - (x^2 - 16x + 55) \quad \forall x \in [5; 11]$$

уравнение (11) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} & 2(1 - \cos(\pi \sqrt[3]{x})) - (x^2 - 16x + 55) = - (x^2 - 16x + 55) \iff \\ \iff & 1 - \cos(\pi \sqrt[3]{x}) = 0 \iff \cos(\pi \sqrt[3]{x}) = 1 \iff \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \pi \sqrt[3]{x} = 2\pi n \Leftrightarrow x = 8n^3 \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Неравенство $5 \leq 8n^3 \leq 11$ имеет место лишь при одном целом числе $n = 1$. Значит, $x = 8$. Ответ: $\{8\}$.

Задача 15. Решите уравнение

$$|1 + \cos(\pi\sqrt{x})| + |x^2 - 15x + 44| = 15x - x^2 - \cos(\pi\sqrt{x}) - 45.$$

Ответ: $\{9\}$.

Задача 16. Решите уравнение

$$\sqrt{3} \cos \frac{x}{4} = \sqrt{\frac{3}{4} + 6 \sin^2 \frac{x}{6} \cdot \sin\left(\frac{x}{6} + \frac{3\pi}{2}\right)}.$$

а) $x = 4\pi + (2k + 1)\pi$; б) $x = -4\pi + 12\pi k$;
 в) $x = \pm 4\pi + (2k - 1)\pi$; г) $x = \pm 4\pi + 12(2k + 1)\pi$;
 д) $6\pi k$ (во всех ответах $k \in \mathbb{Z}$).

Решение. При условии $\cos \frac{x}{4} \geq 0$ обе части исходного уравнения возводим в квадрат:

$$3 \cos^2 \frac{x}{4} = \frac{3}{4} + 6 \sin^2 \frac{x}{6} \cdot \sin\left(\frac{x}{6} + \frac{3\pi}{2}\right).$$

Сократим это уравнение на 3 и используем формулы приведения, понижения степени и преобразования произведения в сумму. Получаем последовательно

$$\frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{x}{2}\right) = \frac{1}{4} - \cos \frac{x}{6} + \frac{1}{2} \left(\cos \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{6}\right).$$

Следовательно,

$$\cos \frac{x}{6} = -\frac{1}{2}.$$

Отсюда

$$\frac{x}{6} = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \text{ то есть } x = \pm 4\pi + 12\pi n.$$

Полученные корни следует проверить условием $\cos \frac{x}{4} \geq 0$. Имеем

$$\frac{x}{4} = \pm \pi + 3\pi n,$$

$$\cos \frac{x}{4} = \cos(\pm \pi + 3\pi n) = \cos(\pm \pi + 2\pi n + \pi n) = \cos(\pm \pi + \pi n) = 1,$$

если только $n = 2k + 1$ — нечётное число. Таким образом,

$$x = \pm 4\pi + 12\pi(2k + 1) \quad \forall k \in \mathbb{Z}. \quad \text{Ответ: } \Gamma).$$

Задача 17. Найдите сумму целочисленных корней уравнения

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{3}(x - \sqrt{x^2 - 5x - 4})\right) = 0. \quad (12)$$

$1) 8; 2) 5; 3) 13; 4) -8.$

Решение. Уравнение (12) равносильно уравнению

$$\frac{\pi}{3}(x - \sqrt{x^2 - 5x - 4}) = \pi n \iff x - \sqrt{x^2 - 5x - 4} = 3n \iff$$

$$\iff \sqrt{x^2 - 5x - 4} = x - 3n \iff \begin{cases} x - 3n \geq 0, \\ x^2 - 5x - 4 = (x - 3n)^2 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x \geq 3n, \\ x(6n - 5) = 9n^2 + 4 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 3n, \\ x = \frac{9n^2 + 4}{6n - 5} \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Имеет место представление

$$9n^2 + 4 = (6n - 5)\left(\frac{3}{2}n + \frac{5}{4}\right) + \frac{41}{4} = \frac{1}{4}(6n - 5)(6n + 5) + \frac{41}{4} \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Поэтому выражение

$$\frac{9n^2 + 4}{6n - 5} = \frac{1}{4} \cdot \frac{(6n + 5)(6n - 5) + 41}{6n - 5} \quad \forall n \in \mathbb{Z}. \quad (13)$$

Для того чтобы полученное выражение было целым числом, необходимо, чтобы $6n - 5 = \pm 1$ или $6n - 5 = \pm 41$. В противном случае дробь в правой части равенства (13) будет несократимой.

Действительно, если возможно разложение числа $6n - 5$, $n \in \mathbb{Z}$, на простые множители, то в разложение знаменателя этой дроби эти множители входить не будут (поскольку 41 — простое число) и дробь будет несократимой.

Уравнения

$$6n - 5 = -1 \iff n = \frac{2}{3}; \quad 6n - 5 = 1 \iff n = 1;$$

$$6n - 5 = -41 \iff n = -6; \quad 6n - 5 = 41 \iff n = 7\frac{2}{3}.$$

Из полученных значений n лишь -6 и 1 являются целыми. При $n = -6$ дробь

$$\frac{9n^2 + 4}{6n - 5} = \frac{9 \cdot 36 + 4}{-36 - 5} = -8,$$

а при $n = 1$ дробь

$$\frac{9n^2 + 4}{6n - 5} = \frac{9 + 4}{6 - 5} = 13.$$

Поскольку $-8 \geq 3 \cdot (-6) = -18$ и $13 \geq 3 \cdot 1 = 3$, то только $x = -8$ и $x = 13$ — целые корни уравнения (12).

Их сумма равна 5. *Ответ: 2).*

Задача 18. Решите неравенство

$$\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x} > 1. \quad (14)$$

Решение. Неравенство (14) имеет смысл, когда

$$\begin{cases} \sin x \geq 0, \\ \cos x \geq 0 \end{cases} \iff 2\pi k \leq x \leq \frac{\pi}{2} + 2\pi k \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Если $x = 2\pi k$ или $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$, то сумма

$$\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x} = 1.$$

Если же $2\pi k < x < \frac{\pi}{2} + 2\pi k$, то

$$\sqrt{\sin x} > \sin^2 x \quad \text{и} \quad \sqrt{\cos x} > \cos^2 x.$$

Значит,

$$\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x} > \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad \forall x \in \left(2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k\right), \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\left(2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k\right) \forall k \in \mathbb{Z}$.

Задача 19. Решите неравенство

$$\sqrt[4]{|\cos x|} + \sqrt[5]{|\sin x|} \leq 1. \tag{15}$$

Решение. Поскольку

$$|\cos x| \leq 1, \quad |\sin x| \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

то

$$\sqrt[4]{|\cos x|} \geq |\cos x| \geq \cos^2 x \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

$$\sqrt[5]{|\sin x|} \geq |\sin x| \geq \sin^2 x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Следовательно, у неравенства (15) левая часть

$$\sqrt[4]{|\cos x|} + \sqrt[5]{|\sin x|} \geq \cos^2 x + \sin^2 x = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

а значит, неравенство (15) выполняется только в случае равенства, которое имеет место, когда

$$\begin{cases} \sqrt[4]{|\cos x|} = \cos^2 x, \\ \sqrt[5]{|\sin x|} = \sin^2 x. \end{cases} \quad (16)$$

Уравнение

$$\begin{aligned} \sqrt[4]{|\cos x|} = \cos^2 x &\iff \sqrt[4]{|\cos x|} (1 - \sqrt[4]{|\cos x|^7}) = 0 \iff \\ &\iff \begin{cases} \sqrt[4]{|\cos x|} = 0, \\ \sqrt[4]{|\cos x|^7} = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \cos x = 0, \\ |\cos x| = 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Если $\cos x = 0$, то $\sin^2 x = 1$, т.е. $|\sin x| = 1$.

Если $|\cos x| = 1$, то $\sin x = 0$.

Стало быть, если $\cos x = 0$ или $|\cos x| = 1$, то выполняется второе равенство системы (16). Значит, система (16), а вместе с ней и неравенство (15), равносильны совокупности

$$\begin{cases} \cos x = 0, \\ |\cos x| = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \\ x = \pi k \quad \forall k \in \mathbb{Z} \end{cases} \iff x = \frac{\pi}{2} n \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\left\{ \frac{\pi}{2} n \right\} \forall n \in \mathbb{Z}$.

Задача 20. Решите неравенство

$$\sqrt{7-x} + \sqrt{x+1} + \cos 2\pi x \geq 5. \quad (17)$$

Решение. Способ 1. Рассмотрим функции

$$g(x) = 5 - \cos 2\pi x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

и

$$f(x) = \sqrt{7-x} + \sqrt{x+1}$$

с областью определения $D(f) = [-1; 7]$, так как

$$\begin{cases} 7 - x \geq 0, \\ x + 1 \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \leq 7, \\ x \geq -1 \end{cases} \iff -1 \leq x \leq 7.$$

Неравенство (17) будет иметь вид

$$f(x) \geq g(x),$$

и надо найти все те x , при которых значения функции g не больше соответствующих значений функции f .

Исходя из ограниченности функции косинус, устанавливаем, что

$$\begin{aligned} -1 \leq \cos 2\pi x \leq 1 &\iff -1 \leq -\cos 2\pi x \leq 1 \iff \\ &\iff 4 \leq 5 - \cos 2\pi x \leq 6 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

то есть у функции g множество значений

$$E(g) = [4; 6].$$

Производная функция

$$f'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{7-x}} + \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{\sqrt{7-x} - \sqrt{x+1}}{2\sqrt{(7-x)(x+1)}} \quad \forall x \in (-1; 7)$$

равна нулю, когда

$$\begin{cases} -1 < x < 7, \\ \sqrt{7-x} = \sqrt{x+1} \end{cases} \iff \begin{cases} -1 < x < 7, \\ 7-x = x+1 \end{cases} \iff x = 3.$$

Так как

$$\begin{aligned} \begin{cases} -1 < x < 7, \\ \sqrt{7-x} > \sqrt{x+1} \end{cases} &\iff \begin{cases} -1 < x < 7, \\ 7-x > x+1 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} -1 < x < 7, \\ x < 3 \end{cases} \iff -1 < x < 3, \end{aligned}$$

а

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} -1 < x < 7, \\ \sqrt{7-x} < \sqrt{x+1} \end{array} \right. &\iff \left\{ \begin{array}{l} -1 < x < 7, \\ 7-x < x+1 \end{array} \right. \iff \\ &\iff \left\{ \begin{array}{l} -1 < x < 7, \\ x > 3 \end{array} \right. \iff 3 < x < 7, \end{aligned}$$

то при переходе через точку $x = 3$ производная функция меняет знак с плюса на минус.

Следовательно, критическая точка $x = 3$ является точкой максимума функции f . А учитывая, что $x = 3$ — единственная критическая точка функции f , заключаем, что при $x = 3$ функция f принимает наибольшее значение:

$$\max_{[-1;7]} f(x) = f(3) = 4.$$

При этом

$$f(x) < 4 \quad \forall x \in [-1; 3) \cup (3; 7].$$

При $x = 3$ функция g принимает наименьшее значение

$$g(3) = 5 - \cos 6\pi = 4, \quad \text{и} \quad g(x) \geq 4 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Следовательно, неравенство (17) выполняется в единственном случае, когда

$$f(x) = g(x),$$

и это имеет место, когда $x = 3$.

Итак, $x = 3$ — единственное решение неравенства (17).

Способ 2. Неравенство (17) равносильно неравенству

$$\sqrt{7-x} + \sqrt{x+1} \geq 5 - \cos 2\pi x. \tag{18}$$

Как и в способе 1, устанавливаем, что

$$5 - \cos 2\pi x \geq 4 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Тогда из неравенства (18) следует, что

$$\sqrt{7-x} + \sqrt{x+1} \geq 4 \iff 7-x + 2\sqrt{7-x} \cdot \sqrt{x+1} + x+1 \geq 16 \iff$$

$$\iff \begin{cases} 7-x \geq 0, \\ x+1 \geq 0, \\ \sqrt{(7-x)(x+1)} \geq 4 \end{cases} \iff \begin{cases} x \leq 7, \\ x \geq -1, \\ (7-x)(x+1) \geq 16 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} -1 \leq x \leq 7, \\ x^2 - 6x + 9 \leq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -1 \leq x \leq 7, \\ (x-3)^2 \leq 0 \end{cases} \iff x = 3.$$

При $x = 3$ из неравенства (17) получаем верное равенство

$$\sqrt{4} + \sqrt{4} + \cos 6\pi = 5.$$

Значит, множество решений неравенства (17) состоит из одного числа $x = 3$. *Ответ:* $\{3\}$.

Задача 21. Решите неравенство

$$\sqrt[3]{5 - \sin x(1 - \sin x) - \cos^2 x(5 - \sin x)} < 2 - \sin x. \quad (19)$$

Решение. При любом действительном x выражение

$$\begin{aligned} & 5 - \sin x(1 - \sin x) - \cos^2 x(5 - \sin x) = \\ & = 5 - \sin x + \sin^2 x - (1 - \sin^2 x)(5 - \sin x) = \\ & = 5 - \sin x + \sin^2 x - 5 + \sin x + 5 \sin^2 x - \sin^3 x = 6 \sin^2 x - \sin^3 x. \end{aligned}$$

Неравенство (19) равносильно неравенству

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{6 \sin^2 x - \sin^3 x} < 2 - \sin x & \iff 6 \sin^2 x - \sin^3 x < (2 - \sin x)^3 \iff \\ \iff 6 \sin^2 x - \sin^3 x < 8 - 12 \sin x + 6 \sin^2 x - \sin^3 x & \iff \sin x < \frac{2}{3} \iff \end{aligned}$$

$$\iff -\arcsin \frac{2}{3} + \pi(2k-1) < x < \arcsin \frac{2}{3} + 2\pi k \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ: } \left(-\arcsin \frac{2}{3} + \pi(2k-1); \arcsin \frac{2}{3} + 2\pi k \right) \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Задача 22. Решите неравенство

$$\sqrt{3 + 2 \operatorname{tg} x - \operatorname{tg}^2 x} > \frac{1 + 3 \operatorname{tg} x}{2}. \quad (20)$$

Решение. Неравенство (20) равносильно совокупности двух систем

$$\left[\begin{cases} 3 + 2 \operatorname{tg} x - \operatorname{tg}^2 x \geq 0, \\ 1 + 3 \operatorname{tg} x < 0, \end{cases} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{cases} 1 + 3 \operatorname{tg} x \geq 0, \\ 3 + 2 \operatorname{tg} x - \operatorname{tg}^2 x > \frac{(1 + 3 \operatorname{tg} x)^2}{4} \end{cases} \right.$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{cases} \operatorname{tg}^2 x - 2 \operatorname{tg} x - 3 \leq 0, \\ 3 \operatorname{tg} x < -1, \end{cases} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{cases} 3 \operatorname{tg} x \geq -1, \\ 13 \operatorname{tg}^2 x - 2 \operatorname{tg} x - 11 < 0 \end{cases} \right.$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{cases} (\operatorname{tg} x + 1)(\operatorname{tg} x - 3) \leq 0, \\ \operatorname{tg} x < -\frac{1}{3}, \\ \operatorname{tg} x \geq -\frac{1}{3}, \\ (13 \operatorname{tg} x + 11)(\operatorname{tg} x - 1) < 0 \end{cases} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{cases} -1 \leq \operatorname{tg} x \leq 3, \\ \operatorname{tg} x < -\frac{1}{3}, \\ \operatorname{tg} x \geq -\frac{1}{3}, \\ -\frac{11}{13} < \operatorname{tg} x < 1 \end{cases} \right. \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{cases} -1 \leq \operatorname{tg} x < -\frac{1}{3}, \\ -\frac{1}{3} \leq \operatorname{tg} x < 1 \end{cases} \right. \Leftrightarrow -1 \leq \operatorname{tg} x < 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -\frac{\pi}{4} + \pi n \leq x < \frac{\pi}{4} + \pi n \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\left[-\frac{\pi}{4} + \pi n; \frac{\pi}{4} + \pi n\right) \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$

Задача 23. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \cos x \cdot \sqrt{\cos 2x} = 0, \\ 2 \sin^2 x - \cos\left(2y - \frac{\pi}{3}\right) = 0. \end{cases} \quad (21)$$

Решение. Произведение двух выражений равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы одно выражение-сомножитель равно нулю, при условии, что произведение имеет смысл.

Поэтому система (21) равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \cos 2x = 0, \\ 2 \sin^2 x - \cos\left(2y - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} \cos 2x = 0, \\ (1 - \cos 2x) - \cos\left(2y - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} \cos 2x = 0, \\ \cos\left(2y - \frac{\pi}{3}\right) = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}n \quad \forall n \in \mathbb{Z}, \\ y = \frac{\pi}{6} + \pi k \quad \forall k \in \mathbb{Z}; \end{cases} \\ & \begin{cases} \cos x = 0, \\ \cos 2x > 0, \\ 2 \sin^2 x - \cos\left(2y - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} \cos x = 0, \\ \cos 2x > 0, \\ 2(1 - \cos^2 x) - \cos\left(2y - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \cos x = 0, \\ \cos 2x > 0, \\ \cos\left(2y - \frac{\pi}{3}\right) = 2, \end{cases} \end{aligned}$$

которая не имеет решений, так как $\cos\left(2y - \frac{\pi}{3}\right) \leq 1 \quad \forall y \in \mathbb{R}$.

Ответ: $\left\{ \left(\frac{\pi}{4} (2n + 1), \frac{\pi}{6} (6k + 1) \right) \right\} \quad \forall k, n \in \mathbb{Z}$.

Задача 24. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{\sin y} \cdot \sin 2x = 0, \\ \cos x + \cos^2 y = 0,25 + \sin y. \end{cases} \quad (22)$$

Решение. Произведение двух выражений равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один из множителей равен нулю, при условии, что произведение имеет смысл.

Поэтому система (22) равносильна совокупности двух систем

$$\begin{cases} \sin y = 0, \\ \cos x + \cos^2 y = 0,25 + \sin y, \end{cases} \quad \begin{cases} \sin y \geq 0, \\ \sin 2x = 0, \\ \cos x + \cos^2 y = 0,25 + \sin y. \end{cases} \quad (23)$$

Первая система совокупности (23) равносильна системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} \sin y = 0, \\ \cos x + 1 - \sin^2 y = 0,25 + \sin y \end{cases} &\iff \begin{cases} \sin y = 0, \\ \cos x = -0,75 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} y = \pi k, \\ x = \pm \arccos(-0,75) + 2\pi n \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} y = \pi k, \\ x = \pm (\pi - \arccos 0,75) + 2\pi n \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} \begin{cases} x = -\arccos 0,75 + \pi(2n + 1), \\ y = \pi k, \end{cases} \\ \begin{cases} x = \arccos 0,75 + \pi(2n - 1), \\ y = \pi k \end{cases} \forall n, k \in \mathbb{Z}. \end{cases} \end{aligned}$$

Во второй системе совокупности (23) уравнение

$$\sin 2x = 0 \iff 2x = \pi n \iff x = \frac{\pi n}{2} \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Разобъём множество чисел

$$\left\{ \frac{\pi n}{2} \right\} \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

на три подмножества: множество

$$\left\{ x: x = \frac{\pi}{2} + \pi k \right\} \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

чисел x , для которых $\cos x = 0$; множество

$$\{x: x = 2\pi k\} \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

чисел x , для которых $\cos x = 1$; а также множество

$$\{x: x = \pi(2k + 1)\} \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

чисел x , для которых $\cos x = -1$.

При

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi k \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

вторую систему совокупности (23) приводим к системе

$$\begin{cases} \sin y \geq 0, \\ \cos^2 y = 0,25 + \sin y \end{cases} \iff \begin{cases} \sin y \geq 0, \\ \sin^2 y + \sin y - 0,75 = 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} \sin y \geq 0, \\ (\sin y + 1,5)(\sin y - 0,5) = 0 \end{cases} \iff \sin y = 0,5 \iff$$

$$\iff y = (-1)^n \cdot \frac{\pi}{6} + \pi n \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Следовательно, решениями системы (22) будут

$$\left(\frac{\pi}{2} + \pi k, (-1)^n \cdot \frac{\pi}{6} + \pi n \right) \quad \forall k, n \in \mathbb{Z}.$$

При

$$x = 2\pi k \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

вторую систему совокупности (23) приводим к системе

$$\begin{cases} \sin y \geq 0, \\ 1 + \cos^2 y = 0,25 + \sin y \end{cases} \iff \begin{cases} \sin y \geq 0, \\ \sin^2 y + \sin y - \frac{7}{4} = 0 \end{cases} \iff$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin y \geq 0, \\ \left(\sin y + \frac{1 + 2\sqrt{2}}{2} \right) \left(\sin y - \frac{2\sqrt{2} - 1}{2} \right) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sin y = \frac{2\sqrt{2} - 1}{2} \Leftrightarrow y = (-1)^n \cdot \arcsin \frac{2\sqrt{2} - 1}{2} + \pi n \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Тогда решениями системы (22) будут

$$\left(2\pi k, (-1)^n \cdot \arcsin \frac{2\sqrt{2} - 1}{2} + \pi n \right) \quad \forall k, n \in \mathbb{Z}.$$

При

$$x = (2k + 1)\pi \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

вторую систему совокупности (23) приводим к системе

$$\begin{cases} \sin y \geq 0, \\ -1 + \cos^2 y = 0,25 + \sin y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin y \geq 0, \\ \sin^2 y + \sin y + 0,25 = 0, \end{cases}$$

у которой нет решений, так как

$$\sin^2 y + \sin y + 0,25 > 0 \quad \text{при} \quad \sin y \geq 0.$$

Ответ: $\left\{ \left(-\arccos \frac{3}{4} + \pi(2k + 1), \pi n \right), \left(\arccos \frac{3}{4} + \pi(2k - 1), \pi n \right), \right.$

$$\left. \left(\frac{\pi}{2} + \pi k, (-1)^n \cdot \frac{\pi}{6} + \pi n \right), \left(2\pi k, (-1)^n \cdot \arcsin \frac{2\sqrt{2} - 1}{2} + \pi n \right) \right\}$$

$\forall k, n \in \mathbb{Z}.$

Задача 25. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 3 + \sin x = \sqrt{y}, \\ 8 \cos^2 x - y = 4 \sin x. \end{cases} \quad (24)$$

Решение. В левой части первого уравнения системы (24) расположено положительное выражение:

$$\sin x \geq -1 \Leftrightarrow 3 + \sin x \geq 2 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

В правой части этого уравнения расположено неотрицательное выражение: $\sqrt{y} \geq 0 \quad \forall y \in \mathbb{R}$.

Следовательно, уравнение

$$3 + \sin x = \sqrt{y} \iff (3 + \sin x)^2 = y \iff y = 9 + 6 \sin x + \sin^2 x.$$

Подставляя найденное y во второе уравнение системы (24), получим тригонометрическое уравнение

$$\begin{aligned} 8 \cos^2 x - 9 - 6 \sin x - \sin^2 x &= 4 \sin x \iff \\ \iff 8(1 - \sin^2 x) - 9 - 10 \sin x - \sin^2 x &= 0 \iff \\ \iff 9 \sin^2 x + 10 \sin x + 1 &= 0 \iff \\ \iff (\sin x + 1)(9 \sin x + 1) &= 0 \iff \begin{cases} \sin x = -1, \\ \sin x = -\frac{1}{9}. \end{cases} \end{aligned}$$

Стало быть, система (24) равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} \sin x = -1, \\ y = (3 + \sin x)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} \sin x = -1, \\ y = (3 - 1)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n \quad \forall n \in \mathbb{Z}, \\ y = 4; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sin x = -\frac{1}{9}, \\ y = (3 + \sin x)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} \sin x = -\frac{1}{9}, \\ y = \left(3 - \frac{1}{9}\right)^2 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x = (-1)^{n+1} \arcsin \frac{1}{9} + \pi n \quad \forall n \in \mathbb{Z}, \\ y = 8\frac{28}{81}. \end{cases}$$

Ответ: $\left\{ \left(-\frac{\pi}{2} + 2\pi n, 4 \right), \left((-1)^{n+1} \arcsin \frac{1}{9} + \pi n, 8\frac{28}{81} \right) \right\} \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$

Задача 26. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 3\sqrt{y} + \cos x = 5, \\ 3 \sin^2 x - y = 4 \cos x. \end{cases} \quad (25)$$

Решение. Первое уравнение системы (25) равносильно уравнению

$$3\sqrt{y} = 5 - \cos x. \quad (26)$$

В правой части уравнения (26) расположено положительное выражение:

$$\cos x \leq 1 \iff -\cos x \geq -1 \iff 5 - \cos x \geq 4 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

В левой части уравнения (26) расположено неотрицательное выражение: $3\sqrt{y} \geq 0 \quad \forall y \in \mathbb{R}$.

Следовательно, уравнение

$$3\sqrt{y} = 5 - \cos x \iff 9y = (5 - \cos x)^2 \iff y = \frac{\cos^2 x - 10 \cos x + 25}{9}.$$

Подставляя найденное y во второе уравнение системы (25), получим тригонометрическое уравнение

$$\begin{aligned} 3 \sin^2 x - \frac{\cos^2 x - 10 \cos x + 25}{9} &= 4 \cos x \iff \\ \iff 27(1 - \cos^2 x) - \cos^2 x + 10 \cos x - 25 - 36 \cos x &= 0 \iff \\ \iff 14 \cos^2 x + 13 \cos x - 1 = 0 \iff (\cos x + 1) \left(\cos x - \frac{1}{14} \right) &= 0 \iff \\ \iff \begin{cases} \cos x = -1, \\ \cos x = \frac{1}{14}. \end{cases} \end{aligned}$$

Стало быть, система (25) равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} \cos x = -1, \\ y = \left(\frac{\cos x - 5}{3} \right)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} \cos x = -1, \\ y = \left(\frac{-1 - 5}{3} \right)^2 \end{cases} \iff$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \pi + 2\pi n & \forall n \in \mathbb{Z}, \\ y = 4; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos x = \frac{1}{14}, \\ y = \left(\frac{\cos x - 5}{3}\right)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = \frac{1}{14}, \\ y = \left(\frac{\frac{1}{14} - 5}{3}\right)^2 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm \arccos \frac{1}{14} + 2\pi n & \forall n \in \mathbb{Z}, \\ y = 2\frac{137}{196}. \end{cases} \Leftrightarrow$$

Ответ: $\left\{ \left(\pi + 2\pi n, 4 \right), \left(-\arccos \frac{1}{14} + 2\pi n, 2\frac{137}{196} \right), \right.$

$\left. \left(\arccos \frac{1}{14} + 2\pi n, 2\frac{137}{196} \right) \right\} \forall n \in \mathbb{Z}.$

Задача 27. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \left| \sin \frac{\pi(x+y)}{4} \right| + \left| 1 - \sin \frac{\pi(x-y)}{4} \right| = 0, \\ \sqrt{4 - |x| - |y+2|} = \sqrt{4 - |x| - |y+2|}. \end{cases} \quad (27)$$

Решение. Первое уравнение системы (27) равносильно системе

$$\begin{cases} \sin \frac{\pi(x+y)}{4} = 0, \\ 1 - \sin \frac{\pi(x-y)}{4} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi(x+y)}{4} = \pi k, \\ \frac{\pi(x-y)}{4} = \frac{\pi}{2} + 2\pi m \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 4k, \\ x - y = 2 + 8m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2k + 4m + 1, \\ y = 2k - 4m - 1 \end{cases} \quad \forall k, m \in \mathbb{Z}.$$

Второе уравнение системы (27) равносильно неравенству

$$4 - |x| - |y + 2| \geq 0 \iff |x| + |y + 2| \leq 4. \quad (28)$$

На координатной плоскости Oxy множеством решений неравенства (28) является квадрат $ABCD$ с вершинами $A(0, 2)$, $B(4, -2)$, $C(0, -6)$ и $D(-4, -2)$. Поэтому $-4 \leq x \leq 4$, $-6 \leq y \leq 2$. Следовательно,

$$\begin{cases} -4 \leq 2k + 4m + 1 \leq 4, \\ -6 \leq 2k - 4m - 1 \leq 2 \end{cases} \iff \begin{cases} -4 \leq 2k + 4m + 1 \leq 4, \\ -4 \leq 2k - 4m + 1 \leq 4. \end{cases}$$

Отсюда

$$\begin{cases} -4 \leq 2k + 1 \leq 4, \\ -1 \leq m \leq 1 \end{cases} \iff \begin{cases} -5 \leq 2k \leq 3, \\ -1 \leq m \leq 1. \end{cases}$$

Поскольку k и m — целые числа, то

$$k \in \{-2, -1, 0, 1\}, \quad \text{а} \quad m \in \{-1, 0, 1\}.$$

Пусть $m = -1$. Тогда $x = 2k - 3$, $y = 2k + 3$ и $|2k - 3| + |2k + 3| \leq 4$. Если $k = -2$, то $7 + 1 \leq 4$; если $k = -1$, то $5 + 3 \leq 4$; если $k = 0$, то $3 + 5 \leq 4$; если $k = 1$, то $1 + 7 \leq 4$. Значит, случай $m = -1$ не реализуется.

Пусть $m = 0$. Тогда $x = 2k + 1$, $y = 2k - 1$ и

$$|2k + 1| + |2k - 1| \leq 4 \iff |2k + 1| \leq 2.$$

Если $k = -2$, то $3 \leq 2$; если $k = -1$, то $1 \leq 2$; если $k = 0$, то $1 \leq 2$; если $k = 1$, то $3 \leq 2$. Значит, реализуются случаи, когда $k = -1$ и $k = 0$. При этом решениями системы (27) будут $x_1 = -1$, $y_1 = -3$ и $x_2 = 1$, $y_2 = -1$.

Пусть $m = 1$. Тогда $x = 2k + 5$, $y = 2k - 5$ и $|2k + 5| + |2k - 3| \leq 4$. Если $k = -2$, то $1 + 7 \leq 4$; если $k = -1$, то $3 + 5 \leq 4$; если $k = 0$, то $5 + 3 \leq 4$; если $k = 1$, то $7 + 1 \leq 4$. Значит, случай $m = 1$ не реализуется.

Ответ: $\{(-1, -3), (1, -1)\}$.

Задача 28. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \left(\sqrt{3} \cos \frac{\pi x}{4} + \sin \frac{\pi(x-2y)}{12} \right) \left(\sqrt{11-x^2-y^2-4x-2y} - 6 \right) = 0, \\ \frac{1}{2} + 2 \sin \frac{\pi x}{12} \cos \frac{\pi y}{6} = 2 \cos \frac{\pi x}{12} \sin \frac{\pi y}{6} + \sin^2 \frac{\pi x}{8}. \end{cases} \quad (29)$$

Решение. Поскольку

$$\begin{aligned} 11 - x^2 - y^2 - 4x - 2y &= -(x^2 + 4x + 4) - (y^2 + 2y + 1) + 16 = \\ &= 16 - (x+2)^2 - (y+1)^2 \leq 16 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

то

$$\sqrt{11-x^2-y^2-4x-2y} - 6 \leq 4 - 6 < 0 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

и система (29) равносильна системе

$$\begin{cases} (x+2)^2 + (y+1)^2 \leq 16, \\ \sqrt{3} \cos \frac{\pi x}{4} + \sin \frac{\pi(x-2y)}{12} = 0, \\ \frac{1}{2} \left(1 - 2 \sin^2 \frac{\pi x}{8} \right) + 2 \left(\sin \frac{\pi x}{12} \cos \frac{\pi y}{6} - \cos \frac{\pi x}{12} \sin \frac{\pi y}{6} \right) = 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x+2)^2 + (y+1)^2 \leq 16, \\ \sqrt{3} \cos \frac{\pi x}{4} + \sin \frac{\pi(x-2y)}{12} = 0, \\ \frac{1}{2} \cos \frac{\pi x}{4} + 2 \sin \frac{\pi(x-2y)}{12} = 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x+2)^2 + (y+1)^2 \leq 16, \\ \cos \frac{\pi x}{4} = 0, \\ \sin \frac{\pi(x-2y)}{12} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x+2)^2 + (y+1)^2 \leq 16, \\ x = 2 + 4m, \\ y = 1 + 2m - 6n \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 5(m+1)^2 - 6n(m+1) + 9n^2 - 4 \leq 0.$$

Полученное квадратичное неравенство (относительно $m+1$) возможно, лишь когда дискриминант $D \geq 0$, то есть

$$-144n^2 + 80 \geq 0 \Leftrightarrow n^2 \leq \frac{5}{9} \Rightarrow n^2 < 1 \Rightarrow n = 0, \text{ ибо } n \in \mathbb{Z}.$$

Стало быть, решениями системы (29) будут $x = -2, y = -1$.

Ответ: $\{(-2, -1)\}$.

2. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства

2.1. Уравнения

Задача 1. Решите уравнение

$$\left(\left(\sqrt{\frac{2}{3}} \right)^{x-1} \right)^{x+3} = \sqrt[5]{\left(\frac{3}{2} \right)^{x+3}}. \quad (1)$$

Решение. Преобразуем выражения в правой и левой частях уравнения (1) при любом действительном x :

$$\sqrt[5]{\left(\frac{3}{2} \right)^{x+3}} = \left(\frac{3}{2} \right)^{\frac{x+3}{5}};$$

$$\left(\left(\sqrt{\frac{2}{3}} \right)^{x-1} \right)^{x+3} = \left(\frac{2}{3} \right)^{\frac{(x-1)(x+3)}{2}} = \left(\frac{3}{2} \right)^{\frac{(1-x)(x+3)}{2}}.$$

Тогда уравнение (1) равносильно уравнению

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{(1-x)(x+3)}{2}} = \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{x+3}{5}} \iff \frac{(1-x)(x+3)}{2} = \frac{x+3}{5} \iff$$

$$\iff 2(x+3) + 5(x-1)(x+3) = 0 \iff (x+3)(5x-3) = 0 \iff \begin{cases} x = -3, \\ x = 0,6. \end{cases}$$

Ответ: $\{-3; 0,6\}$.

Задача 2. Решите уравнение

$$\sqrt{2^x \cdot \sqrt[3]{4^x \cdot (0,125)^{\frac{1}{x}}}} = 4 \cdot \sqrt[3]{2}. \quad (2)$$

Решение. Учитывая, что

$$4 \cdot \sqrt[3]{2} = 2^2 \cdot 2^{\frac{1}{3}} = 2^{\frac{7}{3}}, \quad 0,125 = \frac{1}{8} = 2^{-3},$$

$$\sqrt{2^x \cdot \sqrt[3]{4^x \cdot (0,125)^{\frac{1}{x}}}} = \sqrt[6]{2^{3x} \cdot 2^{2x} \cdot 2^{-\frac{3}{x}}} = \sqrt[6]{2^{5x - \frac{3}{x}}} = 2^{\frac{5x^2 - 3}{6x}},$$

уравнение (2) приводим к равносильному уравнению

$$\begin{aligned} 2^{\frac{5x^2-3}{6x}} &= 2^{\frac{7}{3}} \iff \frac{5x^2-3}{6x} = \frac{7}{3} \iff \\ \iff \frac{5x^2-3}{2x} - 7 &= 0 \iff \frac{5x^2-14x-3}{x} = 0 \iff \\ \iff \frac{(5x+1)(x-3)}{x} &= 0 \iff \begin{cases} x = -0,2, \\ x = 3. \end{cases} \end{aligned}$$

Ответ: $\{-0,2; 3\}$.

Задача 3. Решите уравнение

$$\sqrt{2^{x-1} \cdot \sqrt[3]{4^x \cdot (0,125)^x}}^{\frac{1}{x}} = 4 \cdot \sqrt[6]{\frac{1}{2}}. \quad (3)$$

Решение. Учитывая, что

$$4 \cdot \sqrt[6]{\frac{1}{2}} = 2^2 \cdot 2^{-\frac{1}{6}} = 2^{\frac{11}{6}}, \quad 0,125 = \frac{1}{8} = 2^{-3},$$

$$\begin{aligned} \sqrt{2^{x-1} \cdot \sqrt[3]{4^x \cdot (0,125)^x}}^{\frac{1}{x}} &= \sqrt[6]{2^{3(x-1)} \cdot 2^{2x} \cdot 2^{-\frac{3}{x}}} = \\ &= \sqrt[6]{2^{5x-3-\frac{3}{x}}} = 2^{\frac{5x^2-3x-3}{6x}}, \end{aligned}$$

уравнение (3) приводим к равносильному уравнению

$$\begin{aligned} 2^{\frac{5x^2-3x-3}{6x}} &= 2^{\frac{11}{6}} \iff \frac{5x^2-3x-3}{6x} = \frac{11}{6} \iff \\ \iff \frac{5x^2-3x-3}{x} - 11 &= 0 \iff \frac{5x^2-14x-3}{x} = 0 \iff \\ \iff \frac{(5x+1)(x-3)}{x} &= 6 \iff \begin{cases} x = -0,2, \\ x = 3. \end{cases} \quad \text{Ответ: } \{-0,2; 3\}. \end{aligned}$$

Задача 4. Решите уравнение

$$3^{2\sqrt{x}} + 3^{2\sqrt{x}-1} - 9^{\sqrt{x}-1} = 11.$$

Решение. Показательное уравнение

$$\begin{aligned} 3^{2\sqrt{x}} + 3^{2\sqrt{x}-1} - 9^{\sqrt{x}-1} &= 11 \iff 3^{2\sqrt{x}} + 3^{2\sqrt{x}-1} - 3^{2\sqrt{x}-2} = 11 \iff \\ \iff 3^{2\sqrt{x}-2} \cdot (3^2 + 3 - 1) &= 11 \iff 3^{2\sqrt{x}-2} = 1 \iff \\ \iff 2\sqrt{x} - 2 = 0 \iff \sqrt{x} &= 1 \iff x = 1. \quad \text{Ответ: } \{1\}. \end{aligned}$$

Задача 5. Решите уравнение

$$\sqrt[5]{(0,(1))^{20-0,5x}} + 2\sqrt[5]{3^{x-35}} = 21. \quad (4)$$

Решение. Поскольку при любом действительном x

$$(0,(1))^{20-0,5x} = \left(\frac{1}{9}\right)^{20-0,5x} = 3^{x-40},$$

то уравнение (4) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} \sqrt[5]{3^{x-40}} + 2\sqrt[5]{3^{x-35}} = 21 &\iff \sqrt[5]{3^{x-40}} + 2\sqrt[5]{3^{(x-40)+5}} = 21 \iff \\ &\iff \sqrt[5]{3^{x-40}}(1 + 2\sqrt[5]{3^5}) = 21 \iff \sqrt[5]{3^{x-40}} = 3 \iff \\ &\iff 3^{\frac{x-40}{5}} = 3 \iff \frac{x-40}{5} = 1 \iff x = 45. \text{ Ответ: } \{45\}. \end{aligned}$$

Задача 6. Найдите x , если

$$16 \cdot \sqrt[5]{0,25^{5-\frac{x}{4}}} = 2^{\sqrt{x+1}}. \quad (5)$$

а) 15; б) 17; в) 16,2; г) 0; д) 24.

Решение. Так как при любом $x \in \mathbb{R}$

$$16 \cdot \sqrt[5]{0,25^{5-\frac{x}{4}}} = 2^4 \cdot \sqrt[5]{\left(\frac{1}{4}\right)^{5-\frac{x}{4}}} = 2^4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{5-\frac{x}{4}} = 2^4 \cdot 2^{\frac{x}{4}-5} = 2^{\frac{x}{4}-1},$$

то уравнение (5) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} 2^{\frac{x}{4}-1} = 2^{\sqrt{x+1}} &\iff \sqrt{x+1} = \frac{x}{4} - 1 \iff 4\sqrt{x+1} = x - 4 \iff \\ &\iff \begin{cases} x - 4 \geq 0, \\ 16(x+1) = x^2 - 8x + 16 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 4, \\ x(x-24) = 0 \end{cases} \iff x = 24. \end{aligned}$$

Ответ: д).

Задача 7. Решите уравнение

$$4^{\frac{1}{2}} \cdot 2^{\sqrt{1-2x+x^2}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-4}. \quad (6)$$

Решение. Так как

$$4^{\frac{1}{2}} = 2, \quad \text{а} \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{-4} = 2^4,$$

то уравнение (6) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} 2^{\sqrt{1-2x+x^2}} = 2^3 &\iff \sqrt{1-2x+x^2} = 3 \iff \sqrt{(x-1)^2} = 3 \iff \\ \iff |x-1| = 3 &\iff \begin{cases} x-1 = -3, \\ x-1 = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -2, \\ x = 4. \end{cases} \quad \text{Ответ: } \{-2; 4\}. \end{aligned}$$

Задача 8. Решите уравнение

$$3^{\sqrt{x^2-4x+4}} \cdot 27^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{-2}. \quad (7)$$

Решение. Так как

$$27^{\frac{1}{3}} = (3^3)^{\frac{1}{3}} = 3, \quad \text{а} \quad \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = 9,$$

то уравнение (7) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} 3^{\sqrt{x^2-4x+4}} = 3 &\iff \sqrt{x^2-4x+4} = 1 \iff \\ \iff \sqrt{(x-2)^2} = 1 &\iff |x-2| = 1 \iff \begin{cases} x-2 = -1, \\ x-2 = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1, \\ x = 3. \end{cases} \end{aligned}$$

Ответ: $\{1; 3\}$.

Задача 9. Решите уравнение

$$9^x + 2\sqrt{x} \cdot 3^x = 10 \cdot \sqrt{x} + 25. \quad (8)$$

а) 0; б) $\sqrt{5}$; в) 5; г) $\log_9 5$; д) $\log_3 5$.

Решение. Уравнение (8) решим методом разложения на множители. Для этого к обеим частям уравнения (8) прибавим x и выделим полные квадраты. Будем иметь:

$$9^x + 2 \cdot 3^x \cdot \sqrt{x} + x = x + 10 \cdot \sqrt{x} + 25 \iff$$

$$\iff (3^x + \sqrt{x})^2 = (\sqrt{x} + 5)^2 \iff \begin{cases} 3^x + \sqrt{x} = \sqrt{x} + 5, \\ 3^x + \sqrt{x} = -(\sqrt{x} + 5). \end{cases}$$

Из первого уравнения получаем $x = \log_3 5$, а второе не имеет корней (левая часть положительна, а правая отрицательна). *Ответ:* д).

Задача 10. Сумма корней уравнения

$$\sqrt{x+1} \cdot (4 \cdot 2^x + 2 \cdot 2^{-x} - 9) = 0 \quad (9)$$

равна:

1) 0; 2) -3; 3) -1; 4) -2; 5) 4.

Решение. Произведение двух выражений равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один из сомножителей равен нулю, при условии, что произведение имеет смысл.

Уравнение (9) равносильно совокупности уравнения и системы.

Уравнение

$$\sqrt{x+1} = 0 \iff x+1 = 0 \iff x = -1.$$

Система¹

¹С учётом равносильности

$$af(x) + \frac{b}{f(x)} = ac + \frac{b}{c} \iff \begin{cases} f(x) = c, \\ f(x) = \frac{b}{ac} \end{cases} \quad (abc \neq 0, b \neq ac^2)$$

при $a = 4, b = 2, c = 2$ уравнение

$$4 \cdot 2^x + 2 \cdot 2^{-x} - 9 = 0 \iff 4 \cdot 2^x + \frac{2}{2^x} = 4 \cdot 2 + \frac{2}{2} \iff \begin{cases} 2^x = \frac{1}{4}, \\ 2^x = 2. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} x + 1 > 0, \\ 4 \cdot 2^x + 2 \cdot 2^{-x} - 9 = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x + 1 > 0, \\ \frac{4 \cdot (2^x)^2 - 9 \cdot 2^x + 2}{2^x} = 0 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} x + 1 > 0, \\ (4 \cdot 2^x - 1)(2^x - 2) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > -1, \\ \begin{cases} 2^x = \frac{1}{4}, \\ 2^x = 2 \end{cases} \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} x > -1, \\ \begin{cases} x = -2, \\ x = 1 \end{cases} \end{cases} \iff x = 1. \end{aligned}$$

Итак, уравнение (9) имеет два корня $x = -1$ и $x = 1$.

Их сумма $-1 + 1 = 0$. *Ответ:* 1).

Задача 11. Решите уравнение

$$\sqrt{x} \left(9^{\sqrt[6]{x^2-3}} - 3^{\sqrt[6]{x^2-3}} \right) = 3^{2\sqrt[6]{x^2-3}+1} - 3^{\sqrt[6]{x^2-3}+1} + 6\sqrt{x} - 18. \quad (10)$$

Решение. Уравнение (10) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} \sqrt{x} \left(3^{2\sqrt[6]{x^2-3}} - 3^{\sqrt[6]{x^2-3}} \right) - 3 \left(3^{2\sqrt[6]{x^2-3}} - 3^{\sqrt[6]{x^2-3}} \right) - 6(\sqrt{x} - 3) = 0 &\iff \\ \iff (\sqrt{x} - 3) \left(3^{2\sqrt[6]{x^2-3}} - 3^{\sqrt[6]{x^2-3}} - 6 \right) = 0. \end{aligned}$$

Полученное уравнение, а значит, и уравнение (10), равносильно совокупности двух уравнений при условии, что оно имеет смысл:

$$\begin{cases} x^2 - 3 \geq 0, \\ \sqrt{x} - 3 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 - 3 \geq 0, \\ x = 9 \end{cases} \iff x = 9;$$

$$\begin{cases} x \geq 0, \\ 3^{2\sqrt[6]{x^2-3}} - 3^{\sqrt[6]{x^2-3}} - 6 = 0 \end{cases} \iff$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0, \\ (3^{\sqrt[6]{x^2-3}} + 2)(3^{\sqrt[6]{x^2-3}} - 3) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0, \\ 3^{\sqrt[6]{x^2-3}} = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0, \\ \sqrt[6]{x^2-3} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0, \\ x^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow x = 2. \quad \text{Ответ: } \{2; 9\}. \end{aligned}$$

Задача 12. Решите уравнение

$$9^{2\sqrt{x-1}} - 4 \cdot 3^{2\sqrt{x-1}} + 3 = 0. \quad (11)$$

Решение. Уравнение (11) равносильно уравнению

$$3^{2(2\sqrt{x-1})} - 4 \cdot 3^{2\sqrt{x-1}} + 3 = 0.$$

Пусть $3^{2\sqrt{x-1}} = t$. Тогда

$$t^2 - 4t + 3 = 0 \Leftrightarrow (t-1)(t-3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1, \\ t = 3. \end{cases}$$

Таким образом, множество решений уравнения (11) состоит из решений уравнений

$$3^{2\sqrt{x-1}} = 1 \Leftrightarrow 2\sqrt{x-1} = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

и

$$3^{2\sqrt{x-1}} = 3 \Leftrightarrow 2\sqrt{x-1} = 1 \Leftrightarrow 4(x-1) = 1 \Leftrightarrow x = 1\frac{1}{4}.$$

Ответ: $\left\{1; 1\frac{1}{4}\right\}$.

Задача 13. Решите уравнение

$$x^{\sqrt{x}} = x^{\frac{x}{2}}. \quad (12)$$

Решение. Уравнение (12) имеет смысл при $x > 0$.

Логарифмированием получаем равносильное уравнение

$$\sqrt{x} \ln x = \frac{x}{2} \ln x \Leftrightarrow \left(\sqrt{x} - \frac{x}{2}\right) \ln x = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x}(2 - \sqrt{x}) \ln x = 0 \Leftrightarrow (2 - \sqrt{x}) \ln x = 0.$$

Произведение двух выражений равно нулю, если и только если хотя бы один из сомножителей равен нулю, а произведение имеет смысл.

Поэтому уравнение (12) равносильно совокупности

$$\begin{cases} \ln x = 0, \\ \begin{cases} x > 0, \\ 2 - \sqrt{x} = 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1, \\ \begin{cases} x > 0, \\ \sqrt{x} = 2 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1, \\ x = 4. \end{cases}$$

Ответ: $\{1; 4\}$.

Задача 14. Решите уравнение

$$5^x \cdot \sqrt{x} 8^{x-1} = 500. \quad (13)$$

Решение. В задании уравнения (13) предполагается извлечение корня степени x . Поэтому x — натуральное число, большее или равное 2.

Логарифмированием по основанию 5 уравнение (13) приводим к равносильному при условии, что $x \in \mathbb{N}$, $x \geq 2$, уравнению

$$\begin{aligned} x + \log_5 2^{\frac{3(x-1)}{x}} &= \log_5(2^2 \cdot 5^3) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x + \frac{3(x-1)}{x} \log_5 2 - 3 - 2 \log_5 2 &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x^2 + 3x \log_5 2 - 3 \log_5 2 - 3x - 2x \log_5 2 &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (x-3)(x + \log_5 2) &= 0. \end{aligned}$$

Число $\log_5 2$ ненатуральное¹. Поэтому уравнение (13) имеет одно решение 3. Ответ: $\{3\}$.

¹Число $\log_5 2$ не является натуральным, так как

$$0 = \log_5 1 < \log_5 2 < \log_5 5 = 1.$$

Задача 15. Решите уравнение

$$\log_2(\sqrt{x} - 5) = 3. \quad (14)$$

Решение. Уравнение (14) равносильно уравнению

$$\sqrt{x} - 5 = 8 \iff \sqrt{x} = 13 \iff x = 169. \quad \text{Ответ: } \{169\}.$$

Задача 16. Решите уравнение

$$\log_3 \sqrt{x+1} + \frac{1}{2} \log_3(x^2 - x + 1) = 1. \quad (15)$$

Решение. Учитывая, что

$$x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

уравнение (15) имеет смысл, когда $x > -1$.

Имеет место тождество

$$\log_3 \sqrt{x+1} = \frac{1}{2} \log_3(x+1) \quad \forall x \in (-1; +\infty).$$

Следовательно, уравнение (15) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \log_3(x+1) + \frac{1}{2} \log_3(x^2 - x + 1) &= 1 \iff \\ \iff \log_3(x+1) + \log_3(x^2 - x + 1) &= 2 \iff \\ \iff \log_3((x+1)(x^2 - x + 1)) &= 2 \iff \log_3(x^3 + 1) = 2 \iff \\ \iff x^3 + 1 = 9 \iff x^3 = 8 \iff x &= 2. \quad \text{Ответ: } \{2\}. \end{aligned}$$

Задача 17. Решите уравнение

$$\log_3 x - 3\sqrt{\log_3 x} + 2 = 0. \quad (16)$$

Решение. Уравнение (16) равносильно уравнению

$$(\sqrt{\log_3 x})^2 - 3\sqrt{\log_3 x} + 2 = 0 \iff (\sqrt{\log_3 x} - 1)(\sqrt{\log_3 x} - 2) = 0 \iff$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \sqrt{\log_3 x} = 1, \\ \sqrt{\log_3 x} = 2 \end{array} \right] \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \log_3 x = 1, \\ \log_3 x = 4 \end{array} \right] \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 3, \\ x = 81. \end{array} \right. \quad \text{Ответ: } \{3; 81\}.$$

Задача 18. Решите уравнение

$$(\lg x - 8) \cdot \lg \sqrt{x} = 10.$$

Решение. Уравнение

$$(\lg x - 8) \cdot \lg \sqrt{x} = 10 \Leftrightarrow (\lg x - 8) \cdot \frac{1}{2} \lg x = 10 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lg^2 x - 8 \lg x - 20 = 0 \Leftrightarrow (\lg x + 2) \cdot (\lg x - 10) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \lg x = -2, \\ \lg x = 10 \end{array} \right] \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 10^{-2}, \\ x = 10^{10}. \end{array} \right. \quad \text{Ответ: } \{10^{-2}; 10^{10}\}.$$

Задача 19. Решите уравнение

$$2 \log_4^2(8x) + 3 \log_2 \sqrt{\frac{x}{2}} = 3^{\frac{9}{4} \log_{3\sqrt{3}} 4}. \quad (17)$$

Решение. Так как

$$2 \log_4^2(8x) = 2 \left(\frac{1}{2} \log_2(8x) \right)^2 = \frac{1}{2} (\log_2 8 + \log_2 x)^2 = \frac{1}{2} (3 + \log_2 x)^2,$$

$$3 \log_2 \sqrt{\frac{x}{2}} = \frac{3}{2} \log_2 \frac{x}{2} = \frac{3}{2} (\log_2 x - 1),$$

$$\frac{9}{4} \log_{3\sqrt{3}} 4 = \frac{9}{4} \log_{3^{\frac{3}{2}}} 2^2 = \frac{9}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot 2 \log_3 2 = 3 \log_3 2,$$

$$3^{\frac{9}{4} \log_{3\sqrt{3}} 4} = 3^{3 \log_3 2} = 3^{\log_3 8} = 8,$$

то уравнение (17) равносильно уравнению

$$\log_2^2 x + 9 \log_2 x - 10 = 0 \iff \begin{cases} \log_2 x = -10, \\ \log_2 x = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2^{-10}, \\ x = 2. \end{cases}$$

Ответ: $\{2^{-10}, 2\}$.

Задача 20. Решите уравнение

$$\frac{1}{2} \log_3(-x-16) - \log_3(\sqrt{-x}-4) = 1. \quad (18)$$

Решение. Уравнение (18) имеет смысл при

$$\begin{aligned} \begin{cases} -x-16 > 0, \\ \sqrt{-x}-4 > 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x < -16, \\ \sqrt{-x} > 4 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} x < -16, \\ -x > 16 \end{cases} \iff x < -16. \end{aligned}$$

Тогда уравнение (18) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} \log_3 \sqrt{-x-16} - \log_3(\sqrt{-x}-4) = 1 &\iff \log_3 \frac{\sqrt{-x-16}}{\sqrt{-x}-4} = 1 \iff \\ &\iff \frac{\sqrt{-x-16}}{\sqrt{-x}-4} = 3 \iff \begin{cases} x < -16, \\ \sqrt{-x-16} = 3(\sqrt{-x}-4) \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} x < -16, \\ -x-16 = 9(-x-8\sqrt{-x}+16) \end{cases} &\iff \begin{cases} x < -16, \\ -x-9\sqrt{-x}+20 = 0 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} x < -16, \\ (\sqrt{-x}-4)(\sqrt{-x}-5) = 0 \end{cases} &\iff x = -25. \text{ Ответ: } \{-25\}. \end{aligned}$$

Задача 21. Решите уравнение

$$(x^2 - 1)^{\log_{\sqrt{23}} \sqrt{x+2}} = (x^2 - 1)^{\log_{23} (2x-1)}. \quad (19)$$

Решение. Система

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x^2 - 1 > 0, \\ \log_{\sqrt{23}} \sqrt{x+2} = \log_{23} (2x-1) \end{cases} \iff \\ \iff & \begin{cases} x^2 > 1, \\ \log_{23} (x+2) = \log_{23} (2x-1) \end{cases} \iff \\ \iff & \begin{cases} |x| > 1, \\ x+2 = 2x-1 \end{cases} \iff x = 3. \end{aligned}$$

Уравнение

$$x^2 - 1 = 1 \iff x^2 = 2 \iff |x| = \sqrt{2} \iff x = \pm \sqrt{2}.$$

Показатели степеней

$$\log_{\sqrt{23}} \sqrt{x+2} \quad \text{и} \quad \log_{23} (2x-1)$$

определены при

$$\begin{cases} x+2 > 0, \\ 2x-1 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > -2, \\ x > 0,5 \end{cases} \iff x > 0,5.$$

Поскольку $-\sqrt{2} < 0,5$, а $\sqrt{2} > 0,5$, то $x = -\sqrt{2}$ корнем уравнения (19) не является, а $x = \sqrt{2}$ будет корнем уравнения (19).

Итак, уравнение (19) имеет два корня $x = \sqrt{2}$ и $x = 3$.

Ответ: $\{\sqrt{2}, 3\}$.

Задача 22. Решите уравнение

$$\sqrt{\log_5 x} + \sqrt[3]{\log_5 x} = 2. \quad (20)$$

Решение. Корни $\sqrt{\log_5 x}$ и $\sqrt[3]{\log_5 x}$ приведём к общему показателю:

$$\sqrt{\log_5 x} = \sqrt[6]{\log_5^3 x} \quad \text{и} \quad \sqrt[3]{\log_5 x} = \sqrt[6]{\log_5^2 x}.$$

С помощью подстановки

$$\sqrt[6]{\log_5 x} = w$$

уравнение (20) приводим к алгебраическому уравнению

$$\begin{aligned} w^3 + w^2 - 2 = 0 &\iff (w - 1)(w^2 + 2w + 2) = 0 \iff \\ &\iff (w - 1)((w + 1)^2 + 1) = 0 \iff w - 1 = 0 \iff w = 1. \end{aligned}$$

Следовательно, уравнение (20) равносильно уравнению

$$\sqrt[6]{\log_5 x} = 1 \iff \log_5 x = 1 \iff x = 5. \quad \text{Ответ: } \{5\}.$$

2.2. Неравенства

Задача 23. Решите неравенство

$$0,3^{\sqrt{x}} \geq 0,3^x.$$

Решение. Учитывая, что при $0 < a < 1$ показательная функция

$$y(x) = a^x, \quad D(y) = \mathbb{R},$$

убывает, получаем:

$$\begin{aligned} 0,3^{\sqrt{x}} \geq 0,3^x &\iff \sqrt{x} \leq x \iff 0 \leq x \leq x^2 \iff \\ &\iff \begin{cases} x \geq 0, \\ x(x - 1) \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0, \\ \begin{cases} x > 0, \\ x - 1 \geq 0 \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0, \\ x \geq 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Ответ: $\{0\} \cup [1; +\infty)$.

Задача 24. Решите неравенство

$$(0,3)^{\sqrt{x}} \leq (0,3)^x. \quad \text{Ответ: } [0; 1].$$

Задача 25. Найдите сумму целых решений неравенства

$$\left(\operatorname{tg}^2 \frac{\pi}{3}\right)^{\sqrt{3x+17}} < 9^2. \quad (21)$$

Решение. Так как $\operatorname{tg} \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$, то неравенство (21) равносильно неравенству

$$\begin{aligned} 3^{\sqrt{3x+17}} < 3^4 &\iff \sqrt{3x+17} < 4 \iff \\ \iff 0 \leq 3x+17 < 16 &\iff -17 \leq 3x < -1 \iff \\ \iff -\frac{17}{3} \leq x < -\frac{1}{3} &\iff -5\frac{2}{3} \leq x < -\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Целыми решениями неравенства (21) будут:

$$x = -5, x = -4, x = -3, x = -2, x = -1.$$

Их сумма

$$-5 - 4 - 3 - 2 - 1 = -15. \quad \text{Ответ: } -15.$$

Задача 26. Решите неравенство

$$\sqrt{5-4^x} > 2^x - 1. \quad (22)$$

Решение. Способ 1. Неравенство (22) равносильно совокупности двух систем.

Первая система

$$\begin{cases} 5 - 4^x \geq 0, \\ 2^x - 1 < 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2^{2x} \leq 5, \\ 2^x < 1 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x \leq \log_2 5, \\ x < 0 \end{cases} \iff x < 0,$$

так как $\log_2 5 > 0$.

Вторая система

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2^x - 1 \geq 0, \\ 5 - 4^x > (2^x - 1)^2 \end{cases} &\iff \begin{cases} 2^x \geq 1, \\ 5 - 2^{2x} > 2^{2x} - 2 \cdot 2^x + 1 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} 2^x \geq 1, \\ 2^{2x} - 2^x - 2 < 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} 2^x \geq 1, \\ (2^x + 1)(2^x - 2) < 0 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} 2^x \geq 1, \\ 2^x - 2 < 0 \end{cases} &\iff 1 \leq 2^x < 2 \iff 0 \leq x < 1. \end{aligned}$$

Следовательно, множеством решений неравенства (22) будет

$$(-\infty; 0) \cup [0; 1) = (-\infty; 1).$$

Способ 2. Рассмотрим функцию

$$f(x) = \sqrt{5 - 4^x} - 2^x + 1$$

с областью определения $D(f) = \left(-\infty; \frac{1}{2} \log_2 5\right]$, так как

$$5 - 4^x \geq 0 \iff 2^{2x} \leq 5 \iff 2x \leq \log_2 5 \iff x \leq \frac{1}{2} \log_2 5.$$

Неравенство (22) будет иметь вид

$$f(x) > 0,$$

а множество решений неравенства (22) состоит из тех x , при которых функция f принимает положительные значения.

Известно, что показательная функция с основанием, большим единицы, возрастает. Поэтому функция f является убывающей.

Заметим, что $x = 1$ — нуль функции f :

$$f(1) = \sqrt{5 - 4} - 2 + 1 = 0.$$

Следовательно,

$$f(x) > 0 \quad \forall x \in (-\infty; 1),$$

$$f(x) < 0 \quad \forall x \in \left(1; \frac{1}{2} \log_2 5\right],$$

а значит, множеством решений неравенства (22) будет $(-\infty; 1)$.

Ответ: $(-\infty; 1)$.

Задача 27. Решите неравенство

$$\sqrt{10 - 9^x} > 4 - 3^x. \quad \text{Ответ: } (0; 1).$$

Задача 28. Решите неравенство

$$\sqrt{9^x + 2 \cdot 3^x - 3} > 2 - 3^x. \tag{23}$$

Решение. Неравенство (23) равносильно неравенству

$$\sqrt{3^{2x} + 2 \cdot 3^x - 3} > 2 - 3^x \iff \begin{cases} 2 - 3^x < 0, \\ 3^{2x} + 2 \cdot 3^x - 3 \geq 0, \end{cases} \iff$$

$$\begin{cases} 2 - 3^x \geq 0, \\ 3^{2x} + 2 \cdot 3^x - 3 > (2 - 3^x)^2 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} 3^x > 2, \\ (3^x + 3)(3^x - 1) \geq 0, \\ 3^x \leq 2, \\ 3^{2x} + 2 \cdot 3^x - 3 > 4 - 4 \cdot 3^x + 3^{2x} \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} 3^x > 2, \\ 3^x \geq 1, \\ 3^x \leq 2, \\ 6 \cdot 3^x - 7 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 3^x > 2, \\ \frac{7}{6} < 3^x \leq 2 \end{cases} \iff$$

$$\iff 3^x > \frac{7}{6} \iff x > \log_3 \frac{7}{6} \iff x > \log_3 7 - \log_3 2 - 1.$$

Ответ: $(\log_3 7 - \log_3 2 - 1; +\infty)$.

Задача 29. Решите неравенство

$$3^{\sqrt{x}} + 3^{\sqrt{x}-1} - 3^{\sqrt{x}-2} < 11. \quad (24)$$

Решение. Неравенство (24) равносильно неравенству

$$3^{\sqrt{x}-2}(3^2 + 3 - 1) < 11 \iff 3^{\sqrt{x}-2} < 1 \iff$$

$$\iff \sqrt{x} - 2 < 0 \iff \sqrt{x} < 2 \iff 0 \leq x < 4. \quad \text{Ответ: } [0; 4).$$

Задача 30. Решите неравенство

$$5^{2\sqrt{x}} + 5 < 5^{\sqrt{x}+1} + 5^{\sqrt{x}}. \quad (25)$$

Решение. Так как при $x \geq 0$ сумма

$$5^{\sqrt{x}+1} + 5^{\sqrt{x}} = 5 \cdot 5^{\sqrt{x}} + 5^{\sqrt{x}} = 6 \cdot 5^{\sqrt{x}},$$

то показательное неравенство (25) равносильно неравенству

$$5^{2\sqrt{x}} - 6 \cdot 5^{\sqrt{x}} + 5 < 0 \iff (5^{\sqrt{x}} - 1)(5^{\sqrt{x}} - 5) < 0 \iff$$

$$\iff 1 < 5^{\sqrt{x}} < 5 \iff 0 < \sqrt{x} < 1 \iff 0 < x < 1. \quad \text{Ответ: } (0; 1).$$

Задача 31. Решите неравенство

$$2^{x+\sqrt{x}} + 4^x \leq 6 \cdot 4^{\sqrt{x}}. \quad (26)$$

Решение. Неравенство (26) равносильно неравенству

$$4^x + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2^x \cdot 2^{\sqrt{x}} + \frac{1}{4} \cdot 4^{\sqrt{x}} \leq \frac{25}{4} \cdot 4^{\sqrt{x}} \iff$$

$$\iff \left(2^x + \frac{1}{2} \cdot 2^{\sqrt{x}}\right)^2 - \left(\frac{5}{2} \cdot 2^{\sqrt{x}}\right)^2 \leq 0 \iff$$

$$\iff \left(2^x - 2 \cdot 2^{\sqrt{x}}\right) \left(2^x + 3 \cdot 2^{\sqrt{x}}\right) \leq 0 \iff$$

$$\iff 2^x - 2 \cdot 2^{\sqrt{x}} \leq 0 \iff 2^x \leq 2 \cdot 2^{\sqrt{x}} \iff x \leq \sqrt{x} + 1 \iff$$

$$\iff x - \sqrt{x} - 1 \leq 0 \iff \left(\sqrt{x} - \frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right) \left(\sqrt{x} - \frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right) \leq 0 \iff$$

$$\iff \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \leq \sqrt{x} \leq \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \iff 0 \leq \sqrt{x} \leq \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \iff$$

$$\iff 0 \leq x \leq \frac{3 + \sqrt{5}}{2}. \quad \text{Ответ: } \left[0; \frac{3 + \sqrt{5}}{2}\right].$$

Задача 32. Решите неравенство

$$9^{\sqrt{x}} \leq 8 \cdot 3^{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x}} + 9^{\sqrt[4]{x}+1}.$$

Решение. Неравенство

$$9^{\sqrt{x}} \leq 8 \cdot 3^{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x}} + 9^{\sqrt[4]{x}+1} \iff 8 \cdot 3^{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x}} + 9 \cdot 3^{2\sqrt[4]{x}} - 3^{2\sqrt{x}} \geq 0 \iff$$

$$\iff 8 \cdot 3^{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x} - 2\sqrt[4]{x}} + 9 - 3^{2\sqrt{x} - 2\sqrt[4]{x}} \geq 0 \iff$$

$$\iff 3^{2(\sqrt{x} - \sqrt[4]{x})} - 8 \cdot 3^{\sqrt{x} - \sqrt[4]{x}} - 9 \leq 0 \iff$$

$$\iff (3^{\sqrt{x} - \sqrt[4]{x}} + 1)(3^{\sqrt{x} - \sqrt[4]{x}} - 9) \leq 0 \iff$$

$$\iff 3^{\sqrt{x} - \sqrt[4]{x}} - 9 \leq 0 \iff 3^{\sqrt{x} - \sqrt[4]{x}} \leq 3^2 \iff \sqrt{x} - \sqrt[4]{x} \leq 2 \iff$$

$$\iff (\sqrt[4]{x})^2 - \sqrt[4]{x} - 2 \leq 0 \iff (\sqrt[4]{x} + 1)(\sqrt[4]{x} - 2) \leq 0 \iff$$

$$\iff \sqrt[4]{x} - 2 \leq 0 \iff \sqrt[4]{x} \leq 2 \Rightarrow 0 \leq x \leq 2^4 \iff 0 \leq x \leq 16.$$

Ответ: $[0; 16]$.

Задача 33. Решите неравенство

$$\sqrt[4]{4^{2x} + 16} + \sqrt[4]{\left(\frac{1}{4}\right)^{2x} + 1} \leq 3.$$

Решение. Неравенство не имеет решений.

Действительно,

$$4^{2x} + 16 > 16 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{а} \quad \left(\frac{1}{4}\right)^{2x} + 1 > 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Следовательно,

$$\sqrt[4]{4^{2x} + 16} + \sqrt[4]{\left(\frac{1}{4}\right)^{2x} + 1} > \sqrt[4]{16} + \sqrt[4]{1} = 3 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Ответ: \emptyset .

Задача 34. Решите неравенство

$$\sqrt{3^x + 3} + \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^x + \frac{1}{3}} \geq \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

Решение. Решением неравенства является любое действительное число. Действительно,

$$3^x + 3 > 3 \text{ и } \left(\frac{1}{3}\right)^x + \frac{1}{3} > \frac{1}{3}$$

при любом действительном x , а поэтому

$$\sqrt{3^x + 3} + \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^x + \frac{1}{3}} > \sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3} \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad \text{Ответ: } \mathbb{R}.$$

Задача 35. Решите неравенство

$$\sqrt{3-x} + \sqrt{x-1} \geq 3^{2-x} + 3^{x-2}. \quad (27)$$

Решение. Способ 1. Рассмотрим функции

$$f(x) = \sqrt{3-x} + \sqrt{x-1}$$

с областью определения $D(f) = [1; 3]$, так как

$$\begin{cases} 3-x \geq 0, \\ x-1 \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \leq 3, \\ x \geq 1 \end{cases} \iff 1 \leq x \leq 3,$$

и

$$g(x) = 3^{2-x} + 3^{x-2} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Неравенство (27) будет иметь вид

$$f(x) \geq g(x),$$

и надо найти все те x , при которых значения функции g не больше соответствующих значений функции f .

Сумма двух взаимно обратных положительных чисел не меньше 2 и равна 2, когда эти числа равны единице.

Поэтому функция

$$g(x) = 3^{2-x} + \frac{1}{3^{2-x}} \geq 2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

и $g(x) = 2$ при тех x , которые являются корнями уравнения

$$3^{2-x} = 1 \iff 2 - x = 0 \iff x = 2.$$

Итак, наименьшее значение

$$\min_{\mathbb{R}} g(x) = g(2) = 2,$$

а

$$g(x) > 2 \quad \forall x \in (-\infty; 2) \cup (2; +\infty). \quad (28)$$

Производная функция

$$f'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{3-x}} + \frac{1}{2\sqrt{x-1}} = \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{x-1}}{2\sqrt{(3-x)(x-1)}} \quad \forall x \in (1; 3)$$

равна нулю, когда

$$\begin{cases} 1 < x < 3, \\ \sqrt{3-x} = \sqrt{x-1} \end{cases} \iff \begin{cases} 1 < x < 3, \\ 3-x = x-1 \end{cases} \iff x = 2.$$

Так как

$$\begin{cases} 1 < x < 3, \\ \sqrt{3-x} > \sqrt{x-1} \end{cases} \iff \begin{cases} 1 < x < 3, \\ 3-x > x-1 \end{cases} \iff \begin{cases} 1 < x < 3, \\ x < 2 \end{cases} \iff 1 < x < 2,$$

а

$$\begin{cases} 1 < x < 3, \\ \sqrt{3-x} < \sqrt{x-1} \end{cases} \iff \begin{cases} 1 < x < 3, \\ 3-x < x-1 \end{cases} \iff \begin{cases} 1 < x < 3, \\ x > 2 \end{cases} \iff 2 < x < 3,$$

то при переходе через точку $x = 2$ производная функция меняет знак с плюса на минус.

Следовательно, критическая точка $x = 2$ является точкой максимума функции f . А учитывая, что $x = 2$ — единственная критическая точка функции f , заключаем, что при $x = 2$ функция f принимает наибольшее значение:

$$\max_{[1;3]} f(x) = f(2) = 2.$$

При этом

$$f(x) < 2 \quad \forall x \in [1; 2) \cup (2; 3]. \quad (29)$$

Из того, что

$$f(2) = g(2),$$

и оценок (28) и (29) следует, что неравенство (27) выполняется в единственном случае, когда

$$f(x) = g(x),$$

и это имеет место, когда $x = 2$.

Итак, $x = 2$ — единственное решение неравенства (27).

Способ 2. Сумма двух взаимно обратных положительных чисел не меньше 2:

$$3^{2-x} + 3^{x-2} = 3^{2-x} + \frac{1}{3^{2-x}} \geq 2 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Тогда из неравенства (27) следует, что

$$\sqrt{3-x} + \sqrt{x-1} \geq 2 \iff \begin{cases} 3-x \geq 0, \\ x-1 \geq 0, \\ 3-x + 2\sqrt{(3-x)(x-1)} + x-1 \geq 4 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x \leq 3, \\ x \geq 1, \\ \sqrt{(3-x)(x-1)} \geq 1 \end{cases} \iff \begin{cases} 1 \leq x \leq 3, \\ (3-x)(x-1) \geq 1 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} 1 \leq x \leq 3, \\ x^2 - 4x + 4 \leq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 1 \leq x \leq 3, \\ (x-2)^2 \leq 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} 1 \leq x \leq 3, \\ x-2 = 0 \end{cases} \iff x = 2.$$

При $x = 2$ из неравенства (27) получаем верное неравенство:

$$\sqrt{3-2} + \sqrt{2-1} \geq 3^{2-2} + 3^{2-2} \iff 1 + 1 \geq 1 + 1 \iff 2 \geq 2.$$

Значит, множество решений состоит из одного числа 2.

Ответ: {2}.

Задача 36. Решите неравенство

$$3^{\sqrt{1-x}} + 3^{\sqrt{2-x}} + 3^{\sqrt{6-2x}} > 13. \quad (30)$$

Решение. Рассмотрим функцию

$$f(x) = 3^{\sqrt{1-x}} + 3^{\sqrt{2-x}} + 3^{\sqrt{6-2x}} - 13$$

с областью определения $D(f) = (-\infty; 1]$, так как

$$\begin{cases} 1-x \geq 0, \\ 2-x \geq 0, \\ 6-2x \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \leq 1, \\ x \leq 2, \\ x \leq 3 \end{cases} \iff x \leq 1.$$

Тогда неравенство (30) будет иметь вид

$$f(x) > 0,$$

а его решениями будут все те x , при которых функция f является положительной.

При $x = 1$ функция f принимает нулевое значение:

$$f(1) = 3^0 + 3^1 + 3^2 - 13 = 0.$$

А поскольку функция f убывает, то

$$f(x) > f(1) = 0 \quad \forall x \in (-\infty; 1).$$

Таким образом, функция f является положительной на числовом луче $(-\infty; 1)$, который и будет множеством решений неравенства (30).

Ответ: $(-\infty; 1)$.

Задача 37. Решите неравенство

$$0,64 < \sqrt{0,8^{x(x-3)}} < 1. \quad (31)$$

Решение. Неравенство (31) равносильно неравенству

$$(0,8)^2 < (0,8)^{\frac{x^2-3x}{2}} < 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2-3x}{2} > 0, \\ \frac{x^2-3x}{2} < 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-3x > 0, \\ x^2-3x-4 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x(x-3) > 0, \\ (x+1)(x-4) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 < x < 0, \\ 3 < x < 4, \end{cases}$$

Рис. 1

что устанавливаем с помощью числовой прямой (рис. 1), дважды используя метод числовых промежутков. *Ответ:* $(-1; 0) \cup (3; 4)$.

Задача 38. Найдите число целых решений неравенства

$$\frac{12^{x+2} - 3^{2x} \cdot 4^{4x-4}}{\sqrt{x+1}} \geq 0. \quad (32)$$

Решение. Неравенство (32) равносильно системе

$$\begin{cases} x+1 > 0, \\ 12^{x+2} - 3^{2x} \cdot 4^{4x-4} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 > 0, \\ 3^{2x} \cdot 4^{4x-4} \leq 12^{x+2}. \end{cases}$$

Разделив показательное неравенство системы на

$$12^{x+2} = 3^{x+2} \cdot 4^{x+2} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

получим равносильное неравенство

$$\begin{aligned} 3^{2x-(x+2)} \cdot 4^{(4x-4)-(x+2)} &\leq 1 \Leftrightarrow 3^{x-2} \cdot 4^{3(x-2)} \leq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (3 \cdot 4^3)^{x-2} \leq 1 \Leftrightarrow x-2 \leq 0 \Leftrightarrow x \leq 2. \end{aligned}$$

Таким образом, неравенство (32) равносильно системе

$$\begin{cases} x+1 > 0, \\ x \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -1, \\ x \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow -1 < x \leq 2.$$

Полуинтервалу $(-1; 2]$ принадлежит три целых числа: 0, 1, 2.

Ответ: 3.

Задача 39. Решите неравенство

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{(x^2-2x-15)^3}} \cdot 7^{(x+3)^2(x-5)} \leq 1. \quad (33)$$

Решение. В левой и правой частях неравенства (33) расположены положительные выражения при условии их существования. Это позволяет прологарифмировать неравенство (33) по основанию 2.

Тогда с учётом возрастания логарифмической функции с основанием 2 неравенство (33) приведём к равносильному неравенству

$$\begin{aligned} & -\sqrt{(x^2-2x-15)^3} + (x+3)^2(x-5) \log_2 7 \leq 0 \iff \\ \iff & \sqrt{((x+3)(x-5))^3} - (x+3)^2(x-5) \log_2 7 \geq 0 \iff \\ \iff & (x+3)(x-5)(\sqrt{(x+3)(x-5)} - (x+3) \log_2 7) \geq 0. \quad (34) \end{aligned}$$

Неравенство (34) имеет смысл, когда

$$(x+3)(x-5) \geq 0 \iff \begin{cases} x \leq -3, \\ x \geq 5. \end{cases}$$

При $x = -3$ и при $x = 5$ неравенство (34) выполняется.

На множестве $(-\infty; -3) \cup (5; +\infty)$ неравенство (34) равносильно неравенству

$$\sqrt{(x+3)(x-5)} - (x+3) \log_2 7 \geq 0. \quad (35)$$

Если $x < -3$, то выражение в левой части неравенства (35) положительное, а значит, неравенство (35) справедливо при любом $x < -3$.

При $x > 5$ неравенство (35) равносильно неравенству

$$\begin{aligned} & \sqrt{x+3}(\sqrt{x-5} - \sqrt{x+3} \log_2 7) \geq 0 \iff \\ \iff & \sqrt{x-5} \geq \sqrt{x+3} \log_2 7 \iff \\ \iff & x-5 \geq (x+3) \log_2^2 7 \iff (\log_2^2 7 - 1)x + (5 + 3 \log_2^2 7) \leq 0 \end{aligned}$$

и не выполняется, так как выражение

$$(\log_2^2 7 - 1)x > 0 \quad \forall x \in (5; +\infty)$$

и число $5 + 3 \log_2^2 7$ — положительное.

Итак, $(-\infty; -3] \cup \{5\}$ — множество решений неравенства (33).

Ответ: $(-\infty; -3] \cup \{5\}$.

Задача 40. Решите неравенство

$$\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x^2 + 4x - 4)} < 1. \quad (36)$$

Решение. Неравенство (36) равносильно неравенству

$$0 \leq \log_{\frac{1}{2}}(x^2 + 4x - 4) < 1 \iff \frac{1}{2} < x^2 + 4x - 4 \leq 1 \iff$$

$$\iff \begin{cases} 2x^2 + 8x - 9 > 0, \\ x^2 + 4x - 5 \leq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \left[x < -\frac{4 + \sqrt{34}}{2}, \right. \\ \left. x > \frac{-4 + \sqrt{34}}{2}, \right. \\ \left. -5 \leq x \leq 1 \right. \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} -5 \leq x < -\frac{4 + \sqrt{34}}{2}, \\ \frac{-4 + \sqrt{34}}{2} < x \leq 1. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } \left[-5; -\frac{4 + \sqrt{34}}{2} \right) \cup \left(\frac{-4 + \sqrt{34}}{2}; 1 \right].$$

Задача 41. Решите неравенство

$$\sqrt{x^{\log_2 \sqrt{x}}} > 2.$$

Решение. Неравенство

$$\begin{aligned} \sqrt{x^{\log_2 \sqrt{x}}} > 2 &\iff x^{\frac{1}{2} \log_2 \sqrt{x}} > 2 \iff x^{\frac{1}{4} \log_2 x} > 2 \iff \\ \iff \frac{1}{4} \log_2^2 x > \log_2 2 &\iff \log_2^2 x > 4 \iff |\log_2 x| > 2 \iff \\ \iff \begin{cases} \log_2 x < -2, \\ \log_2 x > 2 \end{cases} &\iff \begin{cases} 0 < x < 0,25, \\ x > 4. \end{cases} \end{aligned}$$

Ответ: $(0; 0,25) \cup (4; +\infty)$.

Задача 42. Решите неравенство

$$x^{\lg \sqrt{x}} > x. \quad (37)$$

Решение. Неравенство (37) имеет смысл при $x > 0$. Поскольку неравенство (37) строгое, то достаточно рассмотреть два¹ случая:

$$1) 0 < x < 1; \quad 2) x > 1.$$

При $0 < x < 1$ неравенство (37) равносильно системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} 0 < x < 1, \\ x^{\lg \sqrt{x}} > x \end{cases} &\iff \begin{cases} 0 < x < 1, \\ \lg \sqrt{x} < 1 \end{cases} \iff \begin{cases} 0 < x < 1, \\ 0 < \sqrt{x} < 10 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} 0 < x < 1, \\ 0 < x < 100 \end{cases} \iff 0 < x < 1. \end{aligned}$$

При $x > 1$ неравенство (37) равносильно системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} x > 1, \\ x^{\lg \sqrt{x}} > x \end{cases} &\iff \begin{cases} x > 1, \\ \lg \sqrt{x} > 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 1, \\ \sqrt{x} > 10 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} x > 1, \\ x > 100 \end{cases} &\iff x > 100. \quad \text{Ответ: } (0; 1) \cup (100; +\infty). \end{aligned}$$

¹При $h(x) = 1$ строгое неравенство $h^{f(x)}(x) > h^{g(x)}(x)$ не выполняется.

Задача 43. Решите неравенство

$$\left(\frac{3}{7}\right)^{\sqrt{\log_{\sqrt{3}} \operatorname{ctg} x - 1}} \geq 1.$$

Решение. Показательная функция

$$y(x) = a^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

при $0 < a < 1$ убывает; квадратный корень

$$y(x) = \sqrt{x} \quad \forall x \in [0; +\infty)$$

возрастает; логарифмическая функция

$$y(x) = \log_b x \quad \forall x \in (0; +\infty)$$

с основанием $b > 1$ возрастает; котангенс

$$y(x) = \operatorname{ctg} x \quad \forall x \in (\pi n; \pi(n+1)), \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

убывает на каждом интервале $(\pi n; \pi(n+1))$.

Последовательно, основываясь на свойстве монотонности этих функций, решаем неравенство:

$$\left(\frac{3}{7}\right)^{\sqrt{\log_{\sqrt{3}} \operatorname{ctg} x - 1}} \geq 1 \iff \sqrt{\log_{\sqrt{3}} \operatorname{ctg} x - 1} \leq 0 \iff$$

$$\iff \sqrt{\log_{\sqrt{3}} \operatorname{ctg} x} \leq 1 \iff 0 \leq \log_{\sqrt{3}} \operatorname{ctg} x \leq 1 \iff$$

$$\iff 1 \leq \operatorname{ctg} x \leq \sqrt{3} \iff \frac{\pi}{6} + \pi n \leq x \leq \frac{\pi}{4} + \pi n \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\left[\frac{\pi}{6} + \pi n; \frac{\pi}{4} + \pi n\right] \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$

Задача 44. Решите неравенство

$$\sqrt{\log_2 x} - \log_4 \sqrt{2x} > 0,5. \tag{38}$$

Решение. Так как

$$\log_4 \sqrt{2x} = \frac{1}{4} \log_2 2x = \frac{1}{4} (1 + \log_2 x) \quad \forall x \in (0; +\infty),$$

то неравенство (38) равносильно неравенству

$$\sqrt{\log_2 x} - \frac{1}{4} (1 + \log_2 x) > 0,5 \iff \log_2 x - 4 \sqrt{\log_2 x} + 3 < 0 \iff$$

$$\iff (\sqrt{\log_2 x} - 1)(\sqrt{\log_2 x} - 3) < 0 \iff 1 < \sqrt{\log_2 x} < 3 \iff$$

$$\iff 1 < \log_2 x < 9 \iff 2 < x < 2^9. \quad \text{Ответ: } (2; 2^9).$$

Задача 45. Решите неравенство

$$\sqrt{\lg x} + \sqrt{20 - \lg x} \leq 6. \quad (39)$$

Решение. Неравенство (39) равносильно системе

$$\begin{cases} \lg x \geq 0, \\ 20 - \lg x \geq 0, \\ \lg x + 2\sqrt{\lg x(20 - \lg x)} + 20 - \lg x \leq 36 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} 0 \leq \lg x \leq 20, \\ \sqrt{\lg x(20 - \lg x)} \leq 8 \end{cases} \iff \begin{cases} 0 \leq \lg x \leq 20, \\ \lg x(20 - \lg x) \leq 64 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} 0 \leq \lg x \leq 20, \\ \lg^2 x - 20 \lg x + 64 \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 0 \leq \lg x \leq 20, \\ (\lg x - 4)(\lg x - 16) \geq 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} 0 \leq \lg x \leq 20, \\ \begin{cases} \lg x \leq 4, \\ \lg x \geq 16 \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} 0 \leq \lg x \leq 4, \\ 16 \leq \lg x \leq 20 \end{cases} \iff \begin{cases} 1 \leq x \leq 10^4, \\ 10^{16} \leq x \leq 10^{20}. \end{cases}$$

Ответ: $[1; 10^4] \cup [10^{16}; 10^{20}]$.

Задача 46. Решите неравенство

$$\log_2(3 + \sqrt{x^2 - 4x}) > 1 + \log_{\frac{1}{2}} \frac{2}{1 + \sqrt{x^2 - 4x} + \sqrt{x + 1}}. \quad (40)$$

Решение. Поскольку¹

$$\begin{aligned} & 1 + \log_{\frac{1}{2}} \frac{2}{1 + \sqrt{x^2 - 4x} + \sqrt{x + 1}} = \\ & = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} + \log_{\frac{1}{2}} \frac{2}{1 + \sqrt{x^2 - 4x} + \sqrt{x + 1}} = \\ & = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{1 + \sqrt{x^2 - 4x} + \sqrt{x + 1}} = \log_2(1 + \sqrt{x^2 - 4x} + \sqrt{x + 1}), \end{aligned}$$

то неравенство (40) равносильно неравенству

$$\log_2(3 + \sqrt{x^2 - 4x}) > \log_2(1 + \sqrt{x^2 - 4x} + \sqrt{x + 1}) \iff$$

$$\iff 3 + \sqrt{x^2 - 4x} > 1 + \sqrt{x^2 - 4x} + \sqrt{x + 1} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x^2 - 4x \geq 0, \\ \sqrt{x + 1} < 2 \end{cases} \iff \begin{cases} x(x - 4) \geq 0, \\ x + 1 \geq 0, \\ x + 1 < 4 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x \leq 0, \\ x \geq 4, \\ -1 \leq x < 3 \end{cases} \iff -1 \leq x \leq 0. \quad \text{Ответ: } [-1; 0].$$

¹Иначе:

$$\begin{aligned} & 1 + \log_{\frac{1}{2}} \frac{2}{1 + \sqrt{x^2 - 4x} + \sqrt{x + 1}} = \\ & = 1 + \log_{\frac{1}{2}} 2 - \log_{\frac{1}{2}} (1 + \sqrt{x^2 - 4x} + \sqrt{x + 1}) = \log_2(1 + \sqrt{x^2 - 4x} + \sqrt{x + 1}). \end{aligned}$$

Задача 47. Решите неравенство

$$\log_{\frac{1}{3}}(3 + \sqrt{9x - x^2}) > -3 + \log_3 \frac{27}{2 + \sqrt{9x - x^2} + \sqrt{5 - x^2}}.$$

Ответ: $[0; 2)$.

Задача 48. Решите неравенство

$$(\sqrt{x^2 - 4x + 3} + 1) \log_5 \frac{x}{5} + \frac{1}{x} (\sqrt{8x - 2x^2 - 6} + 1) \leq 0. \quad (41)$$

Решение. Неравенство (41) имеет смысл при

$$\begin{cases} x^2 - 4x + 3 \geq 0, \\ -2(x^2 - 4x + 3) \geq 0, \\ x > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 - 4x + 3 \geq 0, \\ x^2 - 4x + 3 \leq 0, \\ x > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 - 4x + 3 = 0, \\ x > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} (x-1)(x-3) = 0, \\ x > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1, \\ x = 3. \end{cases}$$

Выражение в левой части неравенства (41) при $x = 1$ принимает значение

$$\log_5 \frac{1}{5} + 1 = -1 + 1 = 0,$$

а при $x = 3$ — значение

$$\log_5 \frac{3}{5} + \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \left(3 \log_5 \frac{3}{5} + 1 \right) = \frac{1}{3} \log_5 \frac{27}{25} > 0.$$

Стало быть, решением неравенства (41) является одно число — 1.

Ответ: $\{1\}$.

Задача 49. Решите неравенство

$$\frac{\sqrt{\log_2(x-1)}}{x^2 - 3x - 4} \geq 0. \quad (42)$$

Решение. Неравенство (42) выполняется в двух случаях, когда

$$\begin{cases} \log_2(x-1) = 0, \\ x^2 - 3x - 4 \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x-1 = 1, \\ (x+1)(x-4) \neq 0 \end{cases} \iff x = 2,$$

и когда

$$\begin{cases} \log_2(x-1) > 0, \\ x^2 - 3x - 4 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x-1 > 1, \\ (x+1)(x-4) > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 2, \\ x-4 > 0 \end{cases} \iff x > 4.$$

Ответ: $\{2\} \cup (4; +\infty)$.

Задача 50. Решите неравенство

$$\frac{\log_5(x^2 - 4x + 11)^2 - \log_{11}(x^2 - 4x - 11)^3}{\sqrt{2 - 5x - 3x^2}} \geq 0. \quad (43)$$

Решение. Выражение $\sqrt{2 - 5x - 3x^2}$ не принимает отрицательных значений, а поскольку оно является знаменателем дроби, то должно быть положительным:

$$\begin{aligned} 2 - 5x - 3x^2 > 0 &\iff 3x^2 + 5x - 2 < 0 \iff (x+2)(3x-1) < 0 \iff \\ &\iff -2 < x < \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Таким образом, неравенство (43) надо рассматривать на интервале $\left(-2; \frac{1}{3}\right)$, на котором оно равносильно неравенству

$$\log_5(x^2 - 4x + 11)^2 - 3 \log_{11}(x^2 - 4x - 11) \geq 0. \quad (44)$$

Квадратный трёхчлен

$$x^2 - 4x + 11 = (x^2 - 4x + 4) + 7 = (x-2)^2 + 7 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

а квадратный трёхчлен

$$\begin{aligned} x^2 - 4x - 11 > 0 &\iff (x-2)^2 - 15 > 0 \iff |x-2| > \sqrt{15} \iff \\ &\iff \begin{cases} x < 2 - \sqrt{15}, \\ x > 2 + \sqrt{15}. \end{cases} \end{aligned}$$

В соответствии с определением логарифмической функции устанавливаем, что неравенство (43) равносильно неравенству (44) на интервале $(-2; 2 - \sqrt{15})$.

Квадратичная функция

$$y(x) = x^2 - 4x - 11 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

на числовом луче $(-\infty; 2]$ убывает.

Поэтому функция

$$f(x) = x^2 - 4x - 11 \quad \forall x \in (-2; 2 - \sqrt{15})$$

убывает.

Её множество значений

$$E(f) = (f(2 - \sqrt{15}); f(-2)).$$

Поскольку $f(2 - \sqrt{15}) = 0$, а $f(-2) = 4 + 8 - 11 = 1$, то

$$E(f) = (0; 1).$$

Тогда сложная логарифмическая функция

$$g(x) = \log_{11}(x^2 - 4x - 11) \quad \forall x \in (-2; 2 - \sqrt{15})$$

является отрицательной.

Квадратный трёхчлен

$$x^2 - 4x + 11 = (x - 2)^2 + 7 > 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

значит,

$$\log_{11}(x^2 - 4x - 11)^2 > \log_5 1 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Итак, в левой части неравенства (44) расположено положительное выражение, и, следовательно, неравенство (44) выполняется на интервале $(-2; 2 - \sqrt{15})$.

Интервал $(-2; 2 - \sqrt{15})$ — множество решений неравенства (43).

Ответ: $(-2; 2 - \sqrt{15})$.

Задача 51. Решите неравенство

$$\log_2 \sqrt{x^2 + 2x + 1} \leq 4^{-1 + \log_4 12}. \quad (45)$$

Решение. Учитывая, что

$$4^{-1 + \log_4 12} = 4^{-1} \cdot 4^{\log_4 12} = 4^{-1} \cdot 12 = 3,$$

а при любом действительном x квадратный корень

$$\sqrt{x^2 + 2x + 1} = \sqrt{(x + 1)^2} = |x + 1|,$$

неравенство (45) приводим к равносильному неравенству

$$\begin{aligned} \log_2 |x + 1| \geq 3 &\iff \begin{cases} |x + 1| \neq 0, \\ |x + 1| \leq 8 \end{cases} \iff \begin{cases} x + 1 \neq 0, \\ -8 \leq x + 1 \leq 8 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} x \neq -1, \\ -9 \leq x \leq 7 \end{cases} \iff \begin{cases} -9 \leq x < -1, \\ -1 < x \leq 7. \end{cases} \end{aligned}$$

Ответ: $[-9; -1) \cup (-1; 7]$.

Задача 52. Решите неравенство

$$\log_{|x|}(\sqrt{9 - x^2} - x - 1) \geq 1. \quad (46)$$

Решение. В соответствии с определением логарифма и монотонностью логарифмической функции неравенство (46) равносильно совокупности двух систем:

$$\begin{cases} 0 < |x| < 1, \\ 0 < \sqrt{9 - x^2} - x - 1 \leq |x| \end{cases} \quad (47)$$

и

$$\begin{cases} |x| > 1, \\ \sqrt{9 - x^2} - x - 1 \geq |x|. \end{cases} \quad (48)$$

Система (47) равносильна совокупности двух систем.

Первая система не имеет решений:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} -1 < x < 0, \\ 0 < \sqrt{9-x^2} - x - 1 \leq -x \end{cases} \iff \begin{cases} -1 < x < 0, \\ \sqrt{9-x^2} > x+1, \\ \sqrt{9-x^2} \leq 1 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} -1 < x < 0, \\ 9-x^2 > (x+1)^2, \\ 9-x^2 \leq 1 \end{cases} \iff \begin{cases} -1 < x < 0, \\ x^2+x-4 < 0, \\ x^2 \geq 8 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} -1 < x < 0, \\ \left(x + \frac{1+\sqrt{17}}{2}\right) \left(x - \frac{-1+\sqrt{17}}{2}\right) < 0, \\ |x| \geq 2\sqrt{2} \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} -1 < x < 0, \\ x + \frac{1+\sqrt{17}}{2} > 0, \\ -x \geq 2\sqrt{2} \end{cases} \iff \begin{cases} -1 < x < 0, \\ x > -\frac{1+\sqrt{17}}{2}, \\ x \leq -2\sqrt{2}. \end{cases} \end{aligned}$$

Вторая система

$$\begin{aligned} & \begin{cases} 0 < x < 1, \\ 0 < \sqrt{9-x^2} - x - 1 \leq x \end{cases} \iff \begin{cases} 0 < x < 1, \\ \sqrt{9-x^2} > x+1, \\ \sqrt{9-x^2} \leq 2x+1 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} 0 < x < 1, \\ 9-x^2 > (x+1)^2, \\ 9-x^2 \leq (2x+1)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} 0 < x < 1, \\ x^2+x-4 < 0, \\ 5x^2+4x-8 \geq 0 \end{cases} \iff \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 0 < x < 1, \\ \left(x + \frac{1 + \sqrt{17}}{2}\right) \left(x - \frac{-1 + \sqrt{17}}{2}\right) < 0, \\ \left(x + \frac{2(1 + \sqrt{11})}{5}\right) \left(x - \frac{2(\sqrt{11} - 1)}{5}\right) \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 0 < x < 1, \\ x - \frac{-1 + \sqrt{17}}{2} < 0, \\ x - \frac{2(\sqrt{11} - 1)}{5} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 0 < x < 1, \\ x < \frac{-1 + \sqrt{17}}{2}, \\ x \geq \frac{2(\sqrt{11} - 1)}{5} \end{cases} \Leftrightarrow \frac{2(\sqrt{11} - 1)}{5} \leq x < 1,$$

так как $\frac{-1 + \sqrt{17}}{2} > 1$, а $\frac{2(\sqrt{11} - 1)}{5} < 1$.

Система (48) равносильна совокупности двух систем.

Первая система

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x < -1, \\ \sqrt{9 - x^2} - x - 1 \geq -x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < -1, \\ \sqrt{9 - x^2} \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} x < -1, \\ 9 - x^2 \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < -1, \\ x^2 \leq 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < -1, \\ |x| \leq 2\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} x < -1, \\ -x \leq 2\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow -2\sqrt{2} \leq x < -1. \end{aligned}$$

Вторая система не имеет решений:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x > 1, \\ \sqrt{9-x^2} - x - 1 \geq x \end{cases} \iff \begin{cases} x > 1, \\ \sqrt{9-x^2} \geq 2x+1 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} x > 1, \\ 9-x^2 \geq (2x+1)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 1, \\ 5x^2+4x-8 \leq 0 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} x > 1, \\ \left(x + \frac{2(1+\sqrt{11})}{5}\right) \left(x - \frac{2(\sqrt{11}-1)}{5}\right) \leq 0 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} x > 1, \\ x - \frac{2(\sqrt{11}-1)}{5} \leq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 1, \\ x \leq \frac{2(\sqrt{11}-1)}{5}, \end{cases} \end{aligned}$$

так как

$$\frac{2(\sqrt{11}-1)}{5} < 1.$$

Итак, множеством решений неравенства (46) будет объединение полуинтервалов $[-2\sqrt{2}; -1)$ и $\left[\frac{2(\sqrt{11}-1)}{5}; 1\right)$.

Ответ: $[-2\sqrt{2}; -1) \cup \left[\frac{2(\sqrt{11}-1)}{5}; 1\right)$.

Задача 53. Решите неравенство

$$\left| \log_{\sqrt{x^2-x-2}} 3 - 3^{\sqrt{x^2-x-1}} \right| + 2 \log_{x^2-x-2} 3 \geq 3^{\sqrt{x^2-x-1}}. \quad (49)$$

Решение. Неравенство имеет смысл, когда

$$\begin{cases} x^2 - x - 2 > 0, \\ x^2 - x - 2 \neq 1, \\ x^2 - x - 1 \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 - x - 2 > 0, \\ x^2 - x - 3 \neq 0, \\ (x^2 - x - 2) + 1 \geq 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} (x+1)(x-2) > 0, \\ \left(x - \frac{1-\sqrt{13}}{2}\right)\left(x - \frac{1+\sqrt{13}}{2}\right) \neq 0, \end{cases}$$

то есть на множестве A , равном объединению

$$\left(-\infty; \frac{1-\sqrt{13}}{2}\right) \cup \left(\frac{1-\sqrt{13}}{2}; -1\right) \cup \left(2; \frac{1+\sqrt{13}}{2}\right) \cup \left(\frac{1+\sqrt{13}}{2}; +\infty\right).$$

Пусть

$$f(x) = 3^{\sqrt{x^2-x-1}} - 2 \log_{x^2-x-2} 3.$$

Тогда с учётом того, что

$$\log_{\sqrt{x^2-x-2}} 3 = 2 \log_{x^2-x-2} 3,$$

неравенство (49) будет иметь вид

$$|f(x)| \geq f(x) \tag{50}$$

и выполняется при любом x из области определения функции f .

Действительно, если $f(x) < 0$, то неравенство (50) имеет место, так как $|f(x)| \geq 0 \forall x \in D(f)$.

Если же $f(x) \geq 0$, то модуль $|f(x)| = f(x)$, и неравенство (50) примет вид $f(x) \geq f(x)$, что верно при любом x из области определения функции f .

Значит, и при $f(x) \geq 0$ неравенство (50) выполняется.

Таким образом, неравенство (49) выполняется при всех тех x , при которых оно имеет смысл. Поэтому A — множество его решений.

Ответ:

$$\left(-\infty; \frac{1-\sqrt{13}}{2}\right) \cup \left(\frac{1-\sqrt{13}}{2}; -1\right) \cup \left(2; \frac{1+\sqrt{13}}{2}\right) \cup \left(\frac{1+\sqrt{13}}{2}; +\infty\right).$$

Задача 54. Решите неравенство

$$\frac{|\lg x| - 3}{\sqrt{2-x}} < 0. \quad (51)$$

Решение. Неравенство (51) равносильно системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2-x > 0, \\ |\lg x| - 3 < 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x < 2, \\ |\lg x| < 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x < 2, \\ -3 < \lg x < 3 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} x < 2, \\ 10^{-3} < x < 10^3 \end{cases} &\iff 10^{-3} < x < 2. \quad \text{Ответ: } (10^{-3}; 2). \end{aligned}$$

Задача 55. Решите неравенство

$$|2-x| < \frac{\sqrt{\lg^2 x}}{\lg x}. \quad (52)$$

Решение. Из неравенства (52) следует, что

$$\lg x > 0 \iff x > 1.$$

В этом случае

$$\frac{\sqrt{\lg^2 x}}{\lg x} = \frac{\lg x}{\lg x} = 1.$$

Стало быть, неравенство (52) равносильно системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} x > 1, \\ |2-x| < 1 \end{cases} &\iff \begin{cases} x > 1, \\ |x-2| < 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 1, \\ -1 < x-2 < 1 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} x > 1, \\ 1 < x < 3 \end{cases} &\iff 1 < x < 3. \quad \text{Ответ: } (1; 3). \end{aligned}$$

Задача 56. Решите неравенство

$$\frac{\log_3^2 |x| + 4}{\sqrt{x+4} - x + 2} > 0. \quad (53)$$

Решение. Числитель

$$\log_3^2 |x| + 4 > 0 \quad \forall x \in (-\infty; 0) \cup (0; +\infty).$$

Поэтому неравенство (53) равносильно системе

$$\begin{cases} x \neq 0, \\ \sqrt{x+4} - x + 2 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \neq 0, \\ \sqrt{x+4} > x - 2. \end{cases}$$

Иррациональное неравенство

$$\sqrt{x+4} > x - 2 \tag{54}$$

равносильно совокупности двух систем:

$$\begin{cases} x - 2 < 0, \\ x + 4 \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x < 2, \\ x \geq -4 \end{cases} \iff -4 \leq x < 2;$$

$$\begin{cases} x - 2 \geq 0, \\ x + 4 > (x - 2)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 2, \\ x(x - 5) < 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 2, \\ x - 5 < 0 \end{cases} \iff \\ \iff 2 \leq x < 5. \end{cases}$$

Объединение

$$[-4; 2) \cup [2; 5) = [-4; 5)$$

является множеством решений неравенства (54).

Тогда множество $[-4; 0) \cup (0; 5)$ будет множеством решений неравенства (53). *Ответ:* $[-4; 0) \cup (0; 5)$.

Задача 57. Решите неравенство

$$\frac{\sqrt{x^2 - \frac{|x|}{x}} + \log_3 7}{\lg^2 x - 4 \log_2 x \cdot \lg 2 + 3} < 0. \tag{55}$$

Решение. Выражение $\log_2 x$ определено, когда $x > 0$.
При этом

$$\frac{|x|}{x} = 1, \quad \text{а} \quad \lg 2 \cdot \log_2 x = \lg x.$$

Получаем равносильное неравенство

$$\frac{\sqrt{x^2 - 1} + \log_3 7}{\lg^2 x - 4 \lg x + 3} < 0.$$

Числитель дроби определён, когда $x^2 - 1 \geq 0$, и является положительным.

Поэтому неравенство (55) равносильно системе

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x^2 - 1 \geq 0, \\ \lg^2 x - 4 \lg x + 3 < 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 \geq 1, \\ (\lg x - 1)(\lg x - 3) < 0 \end{cases} \iff \\ \iff & \begin{cases} |x| \geq 1, \\ 1 < \lg x < 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 1, \\ 10 < x < 10^3 \end{cases} \iff 10 < x < 10^3. \end{aligned}$$

Ответ: $(10; 10^3)$.

Задача 58. Решите неравенство

$$\sqrt{1 - \log_5(x + 2)} < \log_5(5x + 10). \quad (56)$$

Решение. Так как

$$\log_5(5x + 10) = \log_5(5(x + 2)) = 1 + \log_5(x + 2) \quad \forall x \in (-2; +\infty),$$

то неравенство (56) равносильно неравенству

$$\sqrt{1 - \log_5(x + 2)} < 1 + \log_5(x + 2).$$

Пусть $z = \log_5(x + 2)$. Тогда

$$\begin{aligned} & \sqrt{1 - z} < 1 + z \iff \begin{cases} 1 - z \geq 0, \\ 1 + z > 0, \\ 1 - z < 1 + 2z + z^2 \end{cases} \iff \\ \iff & \begin{cases} z \leq 1, \\ z > -1, \\ z(z + 3) > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -1 < z \leq 1, \\ z > 0 \end{cases} \iff 0 < z \leq 1. \end{aligned}$$

Стало быть, неравенство (56) равносильно двойному неравенству

$$0 < \log_5(x+2) \leq 1 \iff 1 < x+2 \leq 5 \iff -1 < x \leq 3.$$

Ответ: $(-1; 3]$.

Задача 59. Решите неравенство

$$\log_{\frac{1}{2}} x + \sqrt{1 - 4 \log_{\frac{1}{2}}^2 x} \leq 1. \quad (57)$$

Решение. Заменяем $\log_{\frac{1}{2}} x$ на y и решим неравенство

$$\begin{aligned} y + \sqrt{1 - 4y^2} \leq 1 &\iff \sqrt{1 - 4y^2} \leq 1 - y \iff \\ &\iff \begin{cases} 1 - 4y^2 \geq 0, \\ 1 - y \geq 0, \\ 1 - 4y^2 \leq (1 - y)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} y^2 \leq \frac{1}{4}, \\ y \leq 1, \\ y(5y - 2) \geq 0 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} -\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}, \\ \begin{cases} y \leq 0, \\ y \geq \frac{2}{5} \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} -\frac{1}{2} \leq y \leq 0, \\ \frac{2}{5} \leq y \leq \frac{1}{2}. \end{cases} \end{aligned}$$

Неравенство (57) равносильно совокупности неравенств

$$\begin{aligned} \begin{cases} -\frac{1}{2} \leq \log_{\frac{1}{2}} x \leq 0, \\ \frac{2}{5} \leq \log_{\frac{1}{2}} x \leq \frac{1}{2} \end{cases} &\iff \begin{cases} 1 \leq x \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{2}}, \\ \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \leq x \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{5}} \end{cases} \iff \begin{cases} 1 \leq x \leq \sqrt{2}, \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \leq x \leq \frac{\sqrt[5]{4^4}}{4}. \end{cases} \end{aligned}$$

Ответ: $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt[5]{4^4}}{4}\right] \cup [1; \sqrt{2}]$.

Задача 60. Решите неравенство

$$\sqrt{7 - \log_2 x^2} + \log_2 x^4 > 4. \quad (58)$$

Решение. Неравенство (58) равносильно неравенству

$$\sqrt{7 - \log_2 x^2} + 2 \log_2 x^2 > 4. \quad (59)$$

Пусть $\log_2 x^2 = t$. Тогда из неравенства (59) получаем:

$$\begin{aligned} \sqrt{7-t} > 4-2t &\Leftrightarrow \begin{cases} 4-2t < 0, \\ 7-t \geq 0, \\ 4-2t \geq 0, \\ 7-t > (4-2t)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 2 < t \leq 7, \\ t \leq 2, \\ 4t^2 - 15t + 9 < 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 2 < t \leq 7, \\ t \leq 2, \\ (4t-3)(t-3) < 0, \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 2 < t \leq 7, \\ t \leq 2, \\ \frac{3}{4} < t < 3 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 2 < t \leq 7, \\ \frac{3}{4} < t \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{3}{4} < t \leq 7. \end{aligned}$$

Следовательно, неравенство (58) равносильно неравенству

$$\frac{3}{4} < \log_2 x^2 \leq 7 \Leftrightarrow \frac{3}{4} < 2 \log_2 |x| \leq 7 \Leftrightarrow \frac{3}{8} < \log_2 |x| \leq \frac{7}{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0, \\ |x| > \sqrt[8]{8}, \\ |x| \leq 8\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0, \\ \begin{cases} x < -\sqrt[8]{8}, \\ x > \sqrt[8]{8}, \end{cases} \\ -8\sqrt{2} \leq x \leq 8\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -8\sqrt{2} \leq x < -\sqrt[8]{8}, \\ \sqrt[8]{8} < x \leq 8\sqrt{2}. \end{cases} \quad \text{Ответ: } [-8\sqrt{2}; -\sqrt[8]{8}) \cup (\sqrt[8]{8}; 8\sqrt{2}].$$

Задача 61. Решите неравенство

$$\sqrt{1 - 9 \log_{\frac{1}{8}}^2 x} > 1 - 4 \log_{\frac{1}{8}} x. \quad (60)$$

Решение. Обозначим $\log_{\frac{1}{8}} x$ переменной y и решим неравенство

$$\sqrt{1 - 9y^2} > 1 - 4y \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - 4y < 0, \\ 1 - 9y^2 \geq 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y > \frac{1}{4}, \\ y^2 \leq \frac{1}{9}, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y \leq \frac{1}{4}, \\ y(25y - 8) < 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y > \frac{1}{4}, \\ -\frac{1}{3} \leq y \leq \frac{1}{3}, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{4} < y \leq \frac{1}{3}, \\ 0 < y \leq \frac{1}{4} \end{cases} \Leftrightarrow 0 < y \leq \frac{1}{3}.$$

$$\begin{cases} y \leq \frac{1}{4}, \\ 0 < y < \frac{8}{25} \end{cases}$$

Неравенство (60) равносильно двойному неравенству

$$0 < \log_{\frac{1}{8}} x \leq \frac{1}{3} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{1}{3}} \leq x < 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq x < 1.$$

Ответ: $\left[\frac{1}{2}; 1\right)$.

Задача 62. Найдите область определения функции

$$y(x) = \sqrt{-\frac{\log_{0,3}(x-1)}{\sqrt{-x^2+2x+8}}}. \quad (61)$$

Решение. Областью определения функции y является множество решений неравенства

$$\begin{aligned}
 -\frac{\log_{0,3}(x-1)}{\sqrt{-x^2+2x+8}} \geq 0 &\iff \frac{\log_{0,3}(x-1)}{\sqrt{-x^2+2x+8}} \leq 0 \iff \\
 \iff \begin{cases} \log_{0,3}(x-1) \leq 0, \\ -x^2+2x+8 > 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x-1 \geq 1, \\ (x+2)(x-4) < 0 \end{cases} \iff \\
 \iff \begin{cases} x \geq 2, \\ -2 < x < 4 \end{cases} &\iff 2 \leq x < 4.
 \end{aligned}$$

Следовательно, $D(y) = [2; 4)$. *Ответ:* $[2; 4)$.

Задача 63. Найдите область определения функции

$$y(x) = \sqrt{\sqrt{3x-2}-x+4} - 3 \lg \frac{3-x}{x-5}.$$

В ответе укажите наибольшее целое значение x из этой области.

а) 4; б) 5; в) 9; г) 3; д) 2.

Решение. Функция y определена при

$$\begin{cases} \sqrt{3x-2} \geq x-4, \\ \frac{3-x}{x-5} > 0. \end{cases}$$

Первое неравенство равносильно совокупности систем

$$\left[\begin{cases} x-4 < 0, \\ 3x-2 \geq 0, \end{cases} \iff \left[\begin{cases} x < 4, \\ x \geq \frac{2}{3}, \end{cases} \iff \left[\begin{cases} x \geq 4, \\ x^2-11x+18 \leq 0 \end{cases} \right. \right.$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2}{3} \leq x < 4, \\ x \geq 4, \\ (x-2)(x-9) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2}{3} \leq x < 4, \\ 4 \leq x \leq 9 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{2}{3} \leq x \leq 9.$$

Второе неравенство равносильно неравенству

$$\frac{x-3}{x-5} < 0 \Leftrightarrow (x-3)(x-5) < 0 \Leftrightarrow 3 < x < 5.$$

Следовательно, областью определения функции y является множество

$$\left[\frac{2}{3}; 9\right] \cap (3; 5) = (3; 5).$$

Число 4 — наибольшее целое число из интервала $(3; 5)$.

Ответ: а).

Задача 64. Найдите множество допустимых значений и все целые значения x , удовлетворяющие неравенству

$$\log_{2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} - x + 13} \frac{\sqrt{16-x}}{\sqrt{x+11}+1} \leq 0. \quad (62)$$

Решение. Множество допустимых значений неравенства (62) состоит из всех тех x , при которых

$$16 - x > 0 \Leftrightarrow x < 16,$$

$$x + 11 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -11,$$

$$2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} - x + 13 > 0 \Leftrightarrow x < 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} + 13,$$

$$2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} - x + 13 \neq 1 \Leftrightarrow x \neq 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} + 12.$$

Поскольку

$$\operatorname{tg} \frac{\pi}{5} < \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1 < \frac{3}{2},$$

то

$$2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} < 3 \iff 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} + 13 < 16.$$

Следовательно, множеством допустимых значений неравенства (62) будет множество

$$\left[-11; 12 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} \right) \cup \left(12 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5}; 13 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} \right).$$

Преобразуем неравенство (62), используя свойство логарифма частного, к равносильному неравенству

$$\log_{2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} - x + 13} \sqrt{16 - x} \leq \log_{2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} - x + 13} (\sqrt{x + 11} + 1). \quad (63)$$

Так как

$$-11 \leq x < 12 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} \iff -12 - 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} < -x \leq 11 \iff$$

$$\iff 1 < 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} - x + 13 \leq 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} + 24,$$

$$12 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} < x < 13 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} \iff$$

$$\iff -13 - 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} < -x < -12 - 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} \iff$$

$$\iff 0 < 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} - x + 13 < 1,$$

то на полуинтервале $\left[-11; 12 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} \right)$ основание логарифмов в неравенстве (63) больше 1, а на интервале $\left(12 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5}; 13 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} \right)$ основание логарифмов в неравенстве (63) больше 0, но меньше 1.

Стало быть, неравенство (63) равносильно совокупности, состоящей из двух систем

$$\begin{cases} -11 \leq x < 12 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5}, \\ \sqrt{16 - x} \leq \sqrt{x + 11} + 1 \end{cases} \quad (64)$$

и

$$\begin{cases} 12 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} < x < 13 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5}, \\ \sqrt{16 - x} \geq \sqrt{x + 11} + 1. \end{cases} \quad (65)$$

Способ 1. Для решения систем (64) и (65) введём в рассмотрение функции

$$f(x) = \sqrt{16 - x} \quad \forall x \in (-\infty; 16]$$

и

$$g(x) = \sqrt{x + 11} + 1 \quad \forall x \in [-11; +\infty),$$

графики которых схематически изображены на рисунке 2.

При этом учтено, что

$$f(0) = 4 < g(0) = \sqrt{11} + 1,$$

функция f убывает; функция g возрастает. А значит, графики функций f и g пересекаются только в одной точке, абсцисса $x = x_0$ которой является отрицательной.




Рис. 2

На полуинтервале $[-11; x_0)$ график функции f лежит выше графика функции g :

$$f(x) \geq g(x) \quad \forall x \in [-11; x_0], \quad (66)$$

а на полуинтервале $(x_0; 16]$ график функции f лежит ниже графика функции g :

$$f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [x_0; 16]. \quad (67)$$

Учитывая неравенство (66), заключаем, что система (65) решений не имеет.

Найдём целые решения системы (64) с учётом неравенства (67).

Так как

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \frac{\pi}{6} < \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} < \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} &\iff \frac{1}{\sqrt{3}} < \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} < 1 \iff \\ \iff \frac{2}{\sqrt{3}} < 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} < 2 &\iff 12 + \frac{2}{\sqrt{3}} < 12 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} < 14, \end{aligned}$$

то

$$13 < 12 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} < 14.$$

Следовательно, целые решения системы (64) принадлежат отрезку $[x_0; 13]$.

При $x = -1$ значения функций f и g связаны неравенством

$$f(-1) = \sqrt{17} < g(-1) = \sqrt{10} + 1,$$

ибо

$$\begin{aligned} 9 < 10 &\iff 3 < \sqrt{10} \iff 6 < 2\sqrt{10} \iff \\ \iff 17 < 10 + 2\sqrt{10} + 1 &\iff 17 < (\sqrt{10} + 1)^2 \iff \sqrt{17} < \sqrt{10} + 1. \end{aligned}$$

При $x = -2$ значения функций f и g связаны неравенством

$$f(-2) = \sqrt{18} > g(-2) = 4.$$

Поэтому $-2 < x_0 < -1$, а целыми решениями системы (64) будут целые числа из отрезка $[-1; 13]$.

Таким образом, целыми решениями неравенства (62) будут числа

$$-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.$$

Способ 2. Решим систему (64).

Неравенство

$$\sqrt{16-x} \leq \sqrt{x+11} + 1 \tag{68}$$

имеет смысл, когда

$$\begin{cases} 16-x \geq 0, \\ x+11 \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \leq 16, \\ x \geq -11 \end{cases} \iff -11 \leq x \leq 16.$$

В левой и правой частях неравенства (68) расположены неотрицательные выражения.

Поэтому неравенство (68) равносильно системе

$$\begin{cases} -11 \leq x \leq 16, \\ 16-x \leq x+11+2\sqrt{x+11}+1 \end{cases} \iff \begin{cases} -11 \leq x \leq 16, \\ \sqrt{x+11} \geq 2-x. \end{cases}$$

Иррациональное неравенство

$$\sqrt{x+11} \geq 2-x \quad (69)$$

равносильно совокупности двух систем.

Первая система

$$\begin{cases} x+11 \geq 0, \\ 2-x < 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq -11, \\ x > 2 \end{cases} \iff x > 2.$$

Вторая система

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2-x \geq 0, \\ x+11 \geq (2-x)^2 \end{cases} &\iff \begin{cases} x \leq 2, \\ x^2-5x-7 \leq 0 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} x \leq 2, \\ \left(x - \frac{5-\sqrt{53}}{2}\right) \left(x - \frac{5+\sqrt{53}}{2}\right) \leq 0 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} x \leq 2, \\ \frac{5-\sqrt{53}}{2} \leq x \leq \frac{5+\sqrt{53}}{2} \end{cases} \iff \frac{5-\sqrt{53}}{2} \leq x \leq 2. \end{aligned}$$

Объединяя множества решений этих систем, получим множество решений неравенства (69):

$$\left[\frac{5-\sqrt{53}}{2}; 2\right] \cup (2; +\infty) = \left[\frac{5-\sqrt{53}}{2}; +\infty\right).$$

Множество решений неравенства (68) состоит из решений неравенства (69), которые принадлежат отрезку $[-11; 16]$.

Учитывая, что

$$-11 < \frac{5-\sqrt{53}}{2} < 16,$$

находим множество решений неравенства (68):

$$[-11; 16] \cap \left[\frac{5-\sqrt{53}}{2}; +\infty\right) = \left[\frac{5-\sqrt{53}}{2}; 16\right].$$

Если теперь учесть, что $0 < 12 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} < 16$, то множеством решений системы (64) будет

$$\left[-11; 12 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} \right) \cap \left[\frac{5 - \sqrt{53}}{2}; 16 \right] = \left[\frac{5 - \sqrt{53}}{2}; 12 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} \right).$$

Найдём целые числа, которые принадлежат полуинтервалу

$$\left[\frac{5 - \sqrt{53}}{2}; 12 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} \right).$$

Так как

$$\begin{aligned} 49 < 53 < 81 &\iff 7 < \sqrt{53} < 9 \iff -9 < -\sqrt{53} < -7 \iff \\ &\iff -4 < 5 - \sqrt{53} < -2 \iff -2 < \frac{5 - \sqrt{53}}{2} < -1, \end{aligned}$$

а

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \frac{\pi}{6} < \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} < \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} &\iff \frac{1}{\sqrt{3}} < \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} < 1 \iff \frac{2}{\sqrt{3}} < 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} < 2 \iff \\ &\iff 12 + \frac{2}{\sqrt{3}} < 12 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} < 14 \implies 13 < 12 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} < 14, \end{aligned}$$

то целыми числами, принадлежащими полуинтервалу

$$\left[\frac{5 - \sqrt{53}}{2}; 12 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} \right),$$

будут

$$-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.$$

Решим систему (65).

Как и неравенство (68), неравенство

$$\sqrt{16 - x} \geq \sqrt{x + 11} + 1 \tag{70}$$

имеет смысл на отрезке $[-11; 16]$.

Множеством решений неравенства (68) является отрезок

$$\left[\frac{5 - \sqrt{53}}{2}; 16 \right].$$

Уравнение

$$\sqrt{16 - x} = \sqrt{x + 11} + 1$$

имеет один корень $x = \frac{5 - \sqrt{53}}{2}$.

Следовательно, множеством решений строгого неравенства

$$\sqrt{16 - x} < \sqrt{x + 11} + 1 \quad (71)$$

будет полуинтервал $\left(\frac{5 - \sqrt{53}}{2}; 16 \right]$.

Тогда решениями неравенства (70) будут те x , которые принадлежат отрезку $[-11; 16]$, но не являются решениями неравенства (71).

Стало быть, множеством решений¹ неравенства (70) будет отрезок

¹Решим неравенство (70), учитывая, что оно имеет смысл на $[-11; 16]$.

В левой и правой частях неравенства (70) расположены неотрицательные выражения.

Поэтому неравенство (70) равносильно системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} -11 \leq x \leq 16, \\ 16 - x \geq x + 11 + 2\sqrt{x + 11} + 1 \end{cases} &\iff \begin{cases} -11 \leq x \leq 16, \\ \sqrt{x + 11} \leq 2 - x \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} -11 \leq x \leq 16, \\ 2 - x \geq 0, \\ x + 11 \leq (2 - x)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} -11 \leq x \leq 2, \\ x^2 - 5x - 7 \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Квадратичное неравенство

$$x^2 - 5x - 7 \geq 0 \iff \left(x - \frac{5 - \sqrt{53}}{2} \right) \left(x - \frac{5 + \sqrt{53}}{2} \right) \geq 0$$

и имеет множество решений $\left(-\infty; \frac{5 - \sqrt{53}}{2} \right] \cup \left[\frac{5 + \sqrt{53}}{2}; +\infty \right)$.

$$\left[-11; \frac{5 - \sqrt{53}}{2} \right].$$

Заметим, что решения неравенства (70) суть отрицательные числа, а интервал $\left(12 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5}; 13 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5}\right)$ состоит из чисел положительных.

Следовательно, система (65) не имеет решений.

Таким образом, множество целых решений неравенства (62) состоит из целых решений системы (64).

$$\begin{aligned} \text{Ответ: } & \left[-11; 12 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} \right) \cup \left(12 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5}; 13 + 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} \right); \\ & -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. \end{aligned}$$

Задача 65. Найдите множество допустимых значений и все целые значения x , удовлетворяющие неравенству:

$$\text{а) } \log_{2 \operatorname{ctg} \frac{2\pi}{7} - x + 7} \frac{\sqrt{x+6} - 1}{\sqrt{9-x}} \geq 0; \quad \text{б) } \log_{2 \cos \frac{2\pi}{7} - x + 8} \frac{\sqrt{x+5} - 1}{\sqrt{10-x}} \geq 0;$$

$$\text{в) } \log_{4 \sin \frac{\pi}{5} - x + 10} \frac{\sqrt{15-x}}{1 + \sqrt{x+12}} \leq 0.$$

$$\text{Ответ: а) } \left(-5; 6 + 2 \operatorname{ctg} \frac{2\pi}{7} \right) \cup \left(6 + 2 \operatorname{ctg} \frac{2\pi}{7}; 7 + 2 \operatorname{ctg} \frac{2\pi}{7} \right), 5, 6, 7;$$

$$\text{б) } \left(-4; 7 + 2 \cos \frac{2\pi}{7} \right) \cup \left(7 + 2 \cos \frac{2\pi}{7}; 8 + 2 \cos \frac{2\pi}{7} \right), 6, 7, 8;$$

$$\text{в) } \left[-12; 9 + 4 \sin \frac{\pi}{5} \right) \cup \left(9 + 4 \sin \frac{\pi}{5}; 10 + 4 \sin \frac{\pi}{5} \right),$$

$$-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.$$

Отрезку $[-11; 2]$ принадлежат лишь те решения этого квадратичного неравенства, которые принадлежат отрезку $\left[-11; \frac{5 - \sqrt{53}}{2} \right]$.

Значит, $\left[-11; \frac{5 - \sqrt{53}}{2} \right]$ — множество решений неравенства (70).

Рекомендуемая литература

1. Альфа. Математика. Физика. Информатика. — Гродно: ГрГУ, 1995. — № 1. — 112 с.
2. Амелькин, В.В. Задачи вступительных экзаменов по математике/ В.В. Амелькин [и др.]. — Минск: ТетраСистемс, 2002. — 160 с.
3. Блох, А.Ш. Неравенства/ А.Ш. Блох, Т.Л. Трухан. — Минск: Народная асвета, 1972. — 224 с.
4. Галицкий, М.Л. Углубленное изучение курса алгебры и математического анализа/ М.Л. Галицкий, М.М. Мошкович, С.И. Шварцбуд. — М.: Просвещение, 1986. — 352 с.
5. Говоров, В.М. Сборник конкурсных задач по математике с методическими указаниями и решениями/ В.М. Говоров [и др.]; под ред. А.И. Прилепко. — М.: Наука, 1986. — 384 с.
6. Горбузов, В.Н. Тригонометрические системы: рекомендации для учителей, студентов и учащихся физико-математической школы: в 2 ч./ В.Н. Горбузов. — Гродно: ГрГУ, 1990. — Ч. 2: Тригонометрические системы. — 1996. — 44 с.
7. Дробушевич, Г.А. Математика — абитуриентам/ Г.А. Дробушевич, Ч.Н. Ролич. — Минск: Университетское, 1987. — 336 с.
8. Зеленский, А.С. Сборник конкурсных задач по математике/ А.С. Зеленский — М.: Научно-технический центр «Университетский», 1996. — 336 с.
9. Квант: Научно-популярный физико-математический журнал. — М.: Наука, 1989. — № 2. — 82 с.
10. Куланин, Е.Д. Математика. Варианты вступительных экзаменов. Финансово-экономические специальности/ Е.Д. Куланин, С.Н. Федин. — М.: Рольф, Айрис-пресс, 1998. — 160 с.
11. Куланин, Е.Д. Математика. Варианты вступи-

тельных экзаменов. Химико-биологические специальности/ Е.Д. Куланин, С.Н. Федин. — М.: Рольф, Айрис-Пресс, 1998. — 128 с.

12. Кушнир, И.А. Неравенства. Задачи и решения/ И.А. Кушнир. — Киев: Астарта, 1996. — 544 с.

13. Лунгу, К.Н. Тесты по математике для абитуриентов/ К.Н. Лунгу. — М.: Айрис-пресс, 2003. — 352 с.

14. Математика: экзаменационные задания на вступительных экзаменах в Гродненский государственный университет и их решения/ Н.С. Берёзкина [и др.]. — Гродно: ГрГУ, 2001. — 160 с.

15. Методические указания и контрольные задания по математике для слушателей заочных подготовительных курсов/ сост. В.И. Васильева, Л.К. Юхо. — Минск: Бел. гос. ун-т информ. и радиоэлектроники, 2001. — 80 с.

16. Методы решения задач по алгебре: от простых до самых сложных/ С.В. Кравцев [и др.]. — М.: Экзамен, 2001. — 544 с.

17. Моденов, П.С. Экзаменационные задачи по математике с анализом их решения/ П.С. Моденов. — М.: Просвещение, 1969. — 351 с.

18. Назаретов, А.П. Математика/ А.П. Назаретов, Б.П. Пигарев. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1999. — 736 с.

19. Нестеренко, Ю.В. Задачи вступительных экзаменов по математике/ Ю.В. Нестеренко, С.Н. Олехник, М.К. Потапов. — М.: Наука, 1986. — 512 с.

20. Панчишкин, А.А. Тригонометрические функции в задачах/ А.А. Панчишкин, Е.Т. Шавгулидзе. — М.: Наука, 1986. — 160 с.

21. Процко, С.В. Экзамен по математике: руководство к решению задач/ С.В. Процко, А.И. Азаров, В.С. Федосенко. — Минск: ТетраСистемс, 2000. — 208 с.

22. Самаль, С.А. Математика: пособие для поступающих в вузы/ С.А. Самаль, А.М. Фельдман. — Минск: БГЭУ, 2000. — 189 с.

23. Сборник задач по математике для поступающих во втузы/ под ред. М.И. Сканави. — М.: Высшая школа, 1988. — 431 с.

24. Сборник экзаменационных материалов по математике за курс средней школы. — Минск: Жасскон, 1999. — 200 с.

25. Тесты: Математика. Химия. Беларуская мова: Варианты и ответы централиз. тестирования: пособие для подгот. к тестированию/ Респ. ин-т контроля знаний. — Минск: Асар, 2003. — 176 с.

26. Черкасов, О.Ю. Математика: интенсивный курс подготовки к экзамену/ О.Ю. Черкасов, А.И. Якушев. — 6-е изд., испр. и доп. — М.: Рольф, 2002. — 432 с.

27. Черкасов, О.Ю. Математика: условия контрольных работ/ для учащихся заочных подготовительных курсов (факультеты: мех-мат, ВМиК, физический, экономический, психологии, биологический, фундаментальной медицины)/ О.Ю. Черкасов, А.И. Якушев. — М.: Издат. отдел УНЦ ДО, 2002. — 41 с.

28. Шарыгин, И.Ф. Математика. Для поступающих в вузы: учеб. пособие/ И.Ф. Шарыгин. — 2-е изд. — М.: Дрофа, 1999. — 416 с.

29. Шувалова, Э.З. Повторим математику/ Э.З. Шувалова, Б.Г. Агафонов, Г.И. Богатырёв. — М.: Высшая школа, 1974. — 520 с.

С о д е р ж а н и е

Введение	3
§ 1. Уравнения с радикалами	7
1. Уравнение $\sqrt{f(x)} = g(x)$	7
1.1. Формальный метод	7
1.2. Метод эквивалентных преобразований	10
2. Уравнение $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$ при $n \in \mathbb{N}$	15
3. Уравнение $\sqrt[n+1]{f(x)} = g(x)$ при $n \in \mathbb{N}$	18
4. Специальные методы	23
5. Задачи	34
§ 2. Неравенства с радикалами	87
1. Неравенство $\sqrt{f(x)} < g(x)$	87
2. Неравенство $\sqrt{f(x)} \leq g(x)$	89
3. Неравенство $\sqrt{f(x)} > g(x)$	91
4. Неравенство $\sqrt{f(x)} \geq g(x)$	94
5. Неравенства с радикалами нечётной степени	97
6. Специальные методы	99
7. Задачи	106
§ 3. Трансцендентные уравнения и неравенства с радикалами	157
1. Тригонометрические уравнения и неравенства	157
2. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства	190
2.1. Уравнения	190
2.2. Неравенства	203
Список рекомендуемой литературы	243

Для заметок

Учебное издание

Гнездовский Юрий Юрьевич
Горбузов Виктор Николаевич
Павлючик Павел Болеславович

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
С РАДИКАЛАМИ

П о с о б и е

Редактор *Н.П. Дудко*
Компьютерная верстка: *П.Б. Павлючик*
Дизайн обложки: *О.В. Канчуга*

Сдано в набор 06.12.2007. Подписано в печать 27.12.2007.

Формат 60х84/16. Бумага офсетная.

Печать RISO. Гарнитура Таймс.

Усл.печ.л. 14,41. Уч.-изд.л. 7,87. Тираж 100 экз. Заказ

Учреждение образования «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы».

ЛИ № 02330/0133257 от 30.04.2004. Пер. Телеграфный, 15а, 230023, Гродно.

Отпечатано на технике издательского центра Учреждения образования
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».

ЛП № 02330/0056882 от 30.04.2004. Пер. Телеграфный, 15а, 230023, Гродно.