

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ГИМНАЗИЯ №3 Г. ГРОДНО»**

**Секция «Алгебра,
геометрия и математический анализ»**

**«Неординарное представление
известной последовательности»**

Авторы работы:

Доминич Роман Игоревич, 8 класс
ГУО «Гимназия №3 г. Гродно»,
Мельников Александр Андреевич, 9 класс
ГУО «Гимназия №3 г. Гродно»,

Руководитель работы:

Разумов Евгений Владимирович, учитель
математики, магистр педагогических наук,
ГУО «Гимназия №3 г. Гродно»

г. Гродно, 2020 г.

Оглавление

Введение	3
Основная часть	4
Общая теория	4
Исследовательская часть	5
Заключение	10
Список использованных источников.....	11

Введение

Нам часто приходится сталкиваться с подсчётом вариантов того или иного события как в реальной жизни, так и на уроках математики, и на олимпиадах в частности. В этом нам часто помогает комбинаторика. В комбинаторных задачах для их решения используются разные способы, это может быть полный или ограниченный перебор вариантов или использование специальных комбинаторных формул. В более редких случаях, где для некоторого заданного натурального n необходимо найти количество способов какой-либо расстановки n элементов можно прибегнуть к целочисленным последовательностям.

На шестом Минском городском открытом турнире юных математиков (младшая лига – 5-7 классы) в 2019 году была предложена задача «Письма» [1]. При решении данной задачи была выдвинута гипотеза, что количество различных порядков отправления писем совпадает с количеством триангуляций правильного $(n + 2)$ -угольника. В данной работе рассмотрим истинность выдвинутого предположения. Некоторые частные случаи задачи рассмотрены в книге «Семь шагов» [2], но не общий случай, который изучим в этой работе.

Объект исследования: последовательности с заданными свойствами.

Предмет исследования: количество всевозможных порядков отправления писем.

Цель работы: доказать, что количество различных порядков отправления писем совпадает с количеством триангуляций правильного $(n + 2)$ -угольника.

На основании сформулированной цели определим ряд **задач** исследования:

- 1) Определить возможный порядок отправления писем.
- 2) Найти количество способов отправления n писем.
- 3) Доказать, что полученная рекуррентная формула совпадает с формулой количества триангуляций $(n + 2)$ -угольника.

Основная часть

Общая теория

Последовательность чисел Каталана (числа Каталана) – последовательность чисел $\{C_n\}$, которая выражает количество триангуляций $(n + 2)$ -угольника (разрезание его на треугольники непересекающимися диагоналями). Кроме этого определения у данной последовательности есть множество других способов выражения, такие как:

- количество правильных скобочных последовательностей длины $2n$;
- количество способов соединения $2n$ точек на окружности n - не пересекающимися хордами;
- количество способов полностью разделить скобками $n + 1$ множитель;
- количество способов заполнить лестницу ширины и высоты n прямоугольниками;
- количество кортежей (x_1, x_2, \dots, x_n) из n натуральных чисел, что $x_1 = 1$ $x_i \leq x_{i-1} + 1$ при $2 \leq i \leq n$;
- количество неизоморфных упорядоченных бинарных деревьев с корнем и $(n + 1)$ листьями;
- количество всевозможных способов линейризации декартова произведения двух линейных упорядоченных множеств: из 2 и из n элементов [3].

Также у данной последовательности существуют несколько известных рекуррентных и нерекуррентных формул представления:

$$C_n = \sum_{i=0}^{n-1} (C_i \cdot C_{n-i-1}), \forall C_n \in \mathbb{N}, C_0 = 1 \quad (1)$$
$$C_n = \frac{(2 \cdot n)!}{n! \cdot (n+1)!} = \frac{2^n \cdot (2 \cdot n - 1)!!}{(n+1)!} = \prod_{k=1}^n \frac{n+k}{1+k}.$$

Исследовательская часть

На шестом Минском городском открытом турнире юных математиков в 2019 году была предложена задача «Письма», в которой предлагается рассмотреть следующую комбинаторную задачу.

Сотрудникам почты необходимо разослать n писем. Время от времени начальник опускает очередное письмо в конверт и кладет его на уже лежащую стопку с конвертами. Его помощник время от времени берет самый верхний конверт из стопки и отдает его почтальону для отправки. Будем считать, что письма, которые кладет начальник, пронумерованы им по порядку, начиная с 1. Сколько всего может получиться различных порядков отправления писем?

Введём последовательность $\{P_n\}$ такую, что P_n совпадает с количеством способов отправки n писем.

Сформулируем и докажем лемму:

Лемма 1. Если письмо №1 помощник взял после m ($m \in \mathbb{N}_0$) некоторых других писем, то эти m писем были пронумерованы номерами $2, 3 \dots, m, (m + 1)$ в некотором порядке.

Доказательство:

Докажем методом от противного. Пусть среди этих m писем было хотя бы одно с номером, большим $(m + 1)$. Пусть, не нарушая общности, это письмо № $(m + \alpha)$ ($\alpha \in \mathbb{N}, \alpha \neq 1$). Так как помощник, по предположению, до письма №1 вытянул ровно m писем, среди которых было письмо № $(m + \alpha)$, то по принципу Дирихле получим, что существует письмо № i ($i \in \mathbb{N}$), такое, что $i \in (1; (m + 1)]$ и оно было взято после письма №1.

Рассмотрим письма № i и №1. Они, по предположению, были взяты помощником после письма № $(m + \alpha)$, значит, они уже лежат в стопке писем, так как если положено оно, то положены и все письма, номера которых меньше. Письмо № i лежит выше в стопке писем, чем письмо №1, так как было положено туда позже письма №1, что и показывает его номер. Если оно лежит выше в стопке, то оно будет раньше взято помощником, чем письмо №1, так как помощник постепенно, идя сверху вниз, забирая письма, дойдёт раньше до письма № i и возьмёт его, пока письмо №1 будет лежать в стопке. Отсюда получаем противоречие, так как с одной стороны письмо № i было взято позже письма №1, а с другой наоборот.

Значит, наше предположение неверно и лемма доказана.

Для нахождения количества способов отправления n писем выведем и докажем следующую теорему:

Теорема 1. Количество различных порядков отправления n писем вычисляется по следующей формуле:

$$P_n = \sum_{m=0}^{n-1} (P_m \cdot P_{n-m-1}), \forall n \in \mathbb{N}, \quad (2)$$

где P_0 определим за 1.

Доказательство:

Рассмотрим все возможные позиции, на которых может стоять письмо №1 и сколько при этом может быть расстановок остальных писем. Пусть письмо №1 помощник вытянул после m некоторых других. Тогда, по Лемме 1, получаем, что до этого помощник вытянул письма №2, №3, ..., № m , №($m + 1$).

Соответственно после того, как помощник отдал письмо №1 почтальону, он в некотором порядке вытянул письма №($m + 2$), №($m + 3$), ..., № n .

Разобьём все письма на 3 промежутка:

- 1) письма от №2 до №($m + 1$);
- 2) письма от №($m + 2$) до № n ;
- 3) письмо №1;

В промежутке 1) перенумеруем все письма следующим образом: №2 в №1; №3 в №2; ...; №($m + 1$) в № m , тогда количество различных отправок этих писем равно P_m .

В промежутке 2) перенумеруем все письма следующим образом: №($m + 2$) в №1; №($m + 3$) в №2; ...; № n в №($n - m - 1$). Тогда количество различных отправок ($n - m - 1$) письма равно P_{n-m-1} . Значит количество различных отправок писем равно $P_m \cdot P_{n-m-1}$ для промежутка 1) и 2) и конкретного значения m .

Так как m пробегает все значения от 0 до ($n - 1$) (перед письмом №1 могло быть отправлено от 0 до ($n - 1$) письма), то количество различных отправок n писем равно

$$\sum_{m=0}^{n-1} (P_m \cdot P_{n-m-1}).$$

Теорема доказана.

Таким образом нами была получена рекуррентная формула представления полученной последовательности $\{P_n\}$. Несложно заметить её полное сходство с формулой чисел Каталана (1). Докажем методом математической индукции.

Предположение индукции: $P_i = C_i, \forall i \in \mathbb{N}_0$.

База индукции:

$P_0 = 1, C_0 = 1$, значит $P_0 = C_0$.

База доказана.

Шаг индукции:

Пусть при $i = n_0$ верно $P_{n_0} = C_{n_0}, \forall n_0 < n$, тогда

$\sum_{m=0}^{n-1} (C_m \cdot C_{n-m-1}) = \sum_{m=0}^{n-1} (P_m \cdot P_{n-m-1})$. Учитывая, что

$C_n = \sum_{m=0}^{n-1} (C_m \cdot C_{n-m-1})$, а $P_n = \sum_{m=0}^{n-1} (P_m \cdot P_{n-m-1})$, значит и $C_n = P_n$. Шаг доказан.

Так как база индукции верна и из справедливости утверждения при $i = n_0, \forall n_0 < n$ следует его справедливость для $i = n$, то согласно принципу математической индукции предположение справедливо при всех натуральных i .

Таким образом нами доказано, что последовательность $\{P_n\}$ совпадает с $\{C_n\}$, следовательно, совпадает с последовательностью чисел Каталана. Что приводит нас к новому возможному определению последовательности Каталана.

Далее рассмотрим выпуклый, не обязательно правильный, $(n + 2)$ -угольник. За T_{n+2} обозначим количество различных разрезов $(n + 2)$ -угольника непересекающимися диагоналями на треугольники.

Выберем некоторую вершину многоугольника, обозначим её №1, а далее по часовой стрелке остальные вершины пронумеруем №2, №3, ..., № $(n + 2)$ соответственно каждой следующей вершине.

Утверждение 1. Рассмотрим треугольник: Очевидно, что его можно всего одним способом разрезать на треугольники – не разрезая его вовсе. Значит $T_3 = 1$.

Утверждение 2. Если из вершины № k не исходит ни одной диагонали, то вершины № $(k - 1)$ и № $(k + 1)$ соединены ребром, чтобы при разрезании из данных трех вершин образовывался треугольник.

Рассмотрим вершину №1:

Если из неё не исходит диагоналей, то по *Утверждению 2* вершины №2 и № $(n + 2)$ соединены ребром, отсюда имеем, что исходный $(n + 2)$ -угольник разбивается на один треугольник и один $(n + 1)$ -угольник с вершинами №2, №3, ..., № $(n + 2)$, получаем $T_3 \cdot T_{n+1}$, то есть T_{n+1} способов.

Пусть из вершины №1 исходит ровно r диагоналей ($r \in [1; (n - 1)]$) в вершины $t_0 < t_1 < \dots < t_{r-1}$. Рассмотрим диагональ, соединяющую вершины №1 и № t_0 . Тогда возможны 2 случая:

1) $t_0 = 3$, тогда получаем разбиение $(n + 2)$ -угольника на треугольник и $(n + 1)$ -угольник с вершинами №3, №4, ..., № $(n + 2)$ и №1, значит число его разбиений равно $T_3 \cdot T_{n+1}$, то есть T_{n+1} способов.

2) $t_0 > 3$, тогда рассмотрим t_0 -угольник с вершинами №1, №2, ..., № t_0 получим, что в данном многоугольнике вершина №1 не соединена ни с одной другой, значит Вершины №2 и № t_0 соединены диагональю и остаётся $(t_0 - 1)$ -угольник, количество способов его разрезать равно T_{t_0-1} . Также остаётся $(n - t_0 + 4)$ -угольник с вершинами № t_0 , № $(t_0 + 1)$, ..., № $(n + 2)$ и №1, количество способов его разрезаний равно T_{n-t_0+4} , а общее количество различных разрезаний равно $T_{t_0-1} \cdot T_{n-t_0+4}$, а так как t_0 пробегает все значения от 4 до $(n + 1)$ отсюда имеем $\sum_{t_0=4}^{n+1} (T_{t_0-1} \cdot T_{n-t_0+4})$ способов разрезания.

Таким образом, сложив все случаи получим следующую формулу:

$$T_{n+2} = 2 \cdot T_{n+1} + \sum_{t_0=4}^{n+1} (T_{t_0-1} \cdot T_{n-t_0+4}).$$

А заменив $(t_0 - 3)$ на k получим

$$T_{n+2} = 2 \cdot T_{n+1} + \sum_{k=1}^{n-2} (T_{k+2} \cdot T_{n-k+1}).$$

Определим T_2 за 1, тогда можно записать формулу в следующем виде:

$$T_{n+2} = \sum_{k=0}^{n-1} (T_{k+2} \cdot T_{n-k+1}).$$

Для доказательства того, что данная формула совпадает с таковой из Теоремы 1, воспользуемся методом математической индукции:

Предположение: $P_i = T_{i+2}, \forall i \in \mathbb{N}_0$.

База индукции:

$$P_0 = 1, T_2 = 1, \text{ значит } P_0 = T_2.$$

База доказана.

Шаг индукции:

Пусть $P_{n_0} = T_{n_0+2}, \forall n_0 < n$, тогда

$$\sum_{k=0}^{n-1} (T_{k+2} \cdot T_{n-k+1}) = \sum_{m=0}^{n-1} (P_m \cdot P_{n-m-1}).$$

Значит и

$$T_{n+2} = \sum_{m=0}^{n-1} (P_m \cdot P_{n-m-1}) = P_n.$$

Значит, шаг доказан.

Значит и предположение верно. Таким образом мы получили, что количество всевозможных порядков отправления n писем равно количеству способов разрезать правильный $(n + 2)$ -угольник непересекающимися диагоналями на треугольники, что является одним из определений последовательности Каталана.

Также нами получен другой способ доказательства – преобразование задачи о письмах в задачу о скобочных последовательностях.

Для начала скажем, что называется правильной скобочной последовательностью длины $2n$. Данная последовательность характеризуется 2 свойствами:

1) Это последовательность, содержащая 2 разных вида элементов, как правило это открывающаяся и закрывающаяся скобки («(» и «)»);

2) Взяв любой её промежуток от начала до любого другого места количество элементов первого типа не меньше количества элементов второго типа.

Переформулируем выше сказанное под условие поставленной ранее задачи:

1) Из условия понятно, что возможны всего 2 операции: либо начальник кладёт письмо в стопку, либо письмо забирает помощник;

2) На любом промежутке времени от начала до любого момента начальник положил суммарно в стопку писем не меньше, чем их взял помощник.

Поставим в соответствие открывающейся скобке появление письма в стопке, а закрывающейся скобке – его взятие оттуда, тогда наша задача сводится к последовательности чисел Каталана, ведь она является представлением правильной скобочной последовательности.

Заключение

В данной работе представлено решение задачи «Письма». Частные случаи этой задачи представлены в книге «Семь шагов» Антипова М. А. В процессе подготовки к Минскому городскому открытому турниру юных математиков (младшая лига – 5-7 классы) возникла идея обобщить частные значения количества отправки писем. Была выдвинута гипотеза, что количество способов отправки n писем совпадает с соответствующим числом Каталана C_n . Для этого была выведена и доказана теорема 1, в которой сформулирована рекуррентная формула для подсчета количества способов отправки писем. Далее в работе с помощью метода математической индукции доказано, что эта формула совпадает с одним из рекуррентных представлений последовательности чисел Каталана. Также в работе присутствует другое доказательство выдвинутого предположения. Основные результаты получены автором самостоятельно и не рассмотрены ранее в литературе.

Числовые последовательности являются одним из основных понятий в математике. В школе им уделяется мало внимания, в то время как решение многих задач, в условии которых явно или неявно содержатся последовательности, развивает математическую интуицию, логику, а также совершенствует работу с различными математическими объектами.

В дальнейшем планируется найти другие необычные представления известных последовательностей.

Список использованных источников

1. Исследовательские задания VI Минского городского открытого турнира юных математиков (младшая лига – 5-7 классы). – Режим доступа: <http://www.uni.bsu.by/arrangements/gtum57/index.html> – Дата доступа: 15.03.2020.
2. Антипов, М. А. Семь шагов. Олимпиады юношеской математической школы / М. А. Антипов, К. А. Кноп, А. М. Порецкий, А. А. Сольнин. – М.:МЦНМО, 2016. – 224 с.
3. Спивак, А. Числа Каталана [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://www.mccme.ru/circles/oim/materials/spivak-04-1.pdf> – Дата доступа: 15.03.2020.