

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЛОВ С ПЕРЕМЕННЫМ ВЕРХНИМ ПРЕДЕЛОМ В НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧАХ

Белогривая Т.Е.

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», факультет математики и информатики, специальность «Управление информационными ресурсами», кафедра системного программирования и компьютерной безопасности.

Научный руководитель - Сетько Е.А., кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры фундаментальной и прикладной математики, ГрГУ им. Я. Купалы

РЕЗЮМЕ

В данной работе рассматривается решение задач, в постановке условий которых присутствуют интегралы с переменным верхним пределом.

Во введении указан объект исследования – интегралы с переменным верхним пределом в нестандартных задачах.

Целью исследования является знакомство с интегралами с переменным верхним пределом и изучение различных методов их использования в нестандартных задачах.

В основной части рассмотрены наиболее типичные примеры решений интегралов с переменным верхним пределом.

В заключении приведены подведены итоги исследования.

Ключевые слова: производная, интеграл с переменным верхним пределом, дифференциальные уравнения.

В классическом курсе высшей математики в каждом университете студентам вводят понятие интеграла с переменным верхним пределом и теорема об основном свойстве интегралов. Но несмотря на то, что информации немного, множество разнообразных задач по разным разделам высшей математики используют это понятие.

Если функция f интегрируема на отрезке $[a, b]$, то для любого $x \in [a, b]$ существует интеграл, который называется *интегралом с переменным верхним пределом*. Основное свойство звучит следующим образом:

Если функция f непрерывна на отрезке $[a, b]$, то интеграл с переменным верхним пределом $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, имеет производную, равную значению

подынтегральной функции, вычисленной в верхнем пределе, т.е. $F'(x)=f(x)$ [1].

Математический анализ в виде дифференциального и интегрального исчисления был создан в XVII веке как инструмент естествознания. При этом он должен изучаться в связи с его приложениями в физике и других естественных науках.

Так интеграл с переменным пределом применяется в прикладной физике [2], например, для вычисления потенциальной энергии:

Функция $U(x)$ называется потенциальной энергией и может быть

$$\text{записана следующим образом: } U(x) = \int_{x_0}^x f(x)dx.$$

Рассмотрим различные примеры с применением интеграла с переменным верхним пределом.

Пример 1. $\Phi(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(t)dt$. Найти $\Phi'(x)$.

Решение. Пусть $F(x)$ - первообразная для $f(x)$, т.е. $F'(x) = f(x)$.

$$\int_{a(x)}^{b(x)} f(t)dt = F(t) \Big|_{a(x)}^{b(x)} = F(b(x)) - F(a(x))$$

То есть $\Phi(x) = F(b(x)) - F(a(x))$

$$\Phi'(x) = (F(b(x)) - F(a(x)))' = F'(b(x)) \cdot b'(x) - F'(a(x)) \cdot a'(x).$$

Так как $F'(x) = f(x)$

$$\left(\int_{a(x)}^{b(x)} f(t)dt \right)' = f(b(x))b'(x) - f(a(x))a'(x), \text{ получаем:}$$

$$\Phi' = f(b(x)) \cdot b'(x) - f(a(x)) \cdot a'(x).$$

Пример 2. Вычислить производную: $\int_{1/x}^{\sqrt{x}} \cos t^2 dt$.

Решение. Воспользовавшись формулой $f(b(x)) \cdot b'(x) - f(a(x)) \cdot a'(x)$, получим:

$$\left(\int_{1/x}^{\sqrt{x}} \cos t^2 dt \right)' = \cos x \times \frac{1}{2\sqrt{x}} + \cos \frac{1}{x^2} \times \frac{1}{x^2}$$

Пример 3. Найти предел: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt}$.

Решение. Поскольку мы имеем неопределенность вида $\frac{\infty}{\infty}$, то применим правило Лопиталя. Получим:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 \int_0^x e^{t^2} dt \times e^{x^2}}{e^{2x^2}};$$

Сократим дробь и, поскольку неопределенность осталась, применим правило Лопиталя повторно:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 \int_0^x e^{t^2} dt}{e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2e^{x^2}}{e^{x^2} \times 2x};$$

Вычислим окончательно предел: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{2x} = 0$.

Пример 4. Пусть $F(x)$ первообразная для функции $\int_0^x (t^3 - 1) dt$, причём

$$F(0) = -1. \text{ Найти } F(-1).$$

Решение. По определению первообразной $F'(x) = \int_0^x (t^3 - 1) dt$

$$\int_0^x t^3 dt - \int_0^x 1 dt = \frac{x^4}{4} \Big|_0^x - t \Big|_0^x = \frac{x^4}{4} - x$$

То есть $F'(x) = \frac{x^4}{4} - x$, следовательно $F(x) = \int \left(\frac{x^4}{4} - x \right) dx = \frac{x^5}{20} - \frac{x^2}{2} + C$

$$F(0) = -1 \Rightarrow C = -1$$

$$F(x) = \frac{x^5}{20} - \frac{x^2}{2} + 1 \Rightarrow F(-1) = -\frac{31}{20}$$

Ответ: $-\frac{31}{20}$.

Пример 5. Доказать, что $\int_0^x e^{t^2} dt \sim \frac{1}{2x} \cdot e^{x^2}$.

Решение. Для решения этой задачи воспользуемся определением эквивалентных бесконечно малых функций [1]. Две бесконечно малые функции $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ называются эквивалентными в окрестности a , если

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$. Вычислим производную числителя и знаменателя:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)'}{\left(\frac{1}{2x} \cdot e^{x^2} \right)'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{x^2}}{-\frac{1}{2x^2} \cdot e^{x^2} + \frac{1}{2x} \cdot e^{x^2} \cdot 2x}$$

После преобразований получим, что $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x e^{t^2} dt}{\int_0^x e^{t^2} dt} = 1$

Следовательно $\int_0^x e^{t^2} dt \sim \frac{1}{2x} \cdot e^{x^2}$.

Пример 6. Решить уравнение $\int_0^x (x^2 - t^2)\varphi(t)dt = \frac{x^3}{3}$

Решение. Для того, чтобы применить основное свойство интегралов с переменным верхним пределом, найдём производную левой и правой части равенства.

$$\left(\int_0^x x^2 \varphi(t) dt - \int_0^x t^2 \varphi(t) dt \right)' = \left(\frac{x^3}{3} \right)'$$

После преобразования, получаем:

$$2x \int_0^x \varphi(t) dt + x^2 \varphi(x) - x^2 \varphi(x) = x^2$$

Вновь дифференцируем левую и правую части равенства:

$$\left(2x \int_0^x \varphi(t) dt \right)' = (x^2)'$$

Получаем: $2\varphi(x) + x\varphi'(x) = 1$.

Пусть $\varphi(x) = y$, тогда получим дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными $y' = \frac{1-2y}{x}$, решая которое находим, что

$$y = -\frac{C}{2x^2} + \frac{1}{2}$$

Ответ: $y = -\frac{C}{2x^2} + \frac{1}{2}$.

Пример 7. Исследовать функцию $F(x) = \int_0^x (t-1)(t-2)^2 dt$ на экстремум.

$$F'(x) = \left(\int_0^x (t-1)(t-2)^2 dt \right)' = (x-1)(x-2)^2$$

Приравняем производную к нулю:

$$F'(x) = 0 \Rightarrow (x-1)(x-2)^2 = 0 \Rightarrow x = 1 - \text{точка минимума } F_{\min}(1) = \int_0^1 (t-1)(t-2)^2 dt = -\frac{17}{12}$$

Ответ: $-\frac{17}{12}$.

Пример 8. Найти наибольшее и наименьшее значение функции

$$F(x) = \int_0^x \frac{(2t+1)dt}{t^2 - 2t + 2} \text{ на отрезке } [-1;1].$$

Решение. Наибольшее и наименьшее значение функции достигается в точках, в которых производная равна нулю, либо на концах отрезка. Для начала найдем производную:

$$F'(x) = \left(\int_0^x \frac{(2t+1)dt}{t^2 - 2t + 2} \right)' = \frac{2x+1}{x^2 - 2x + 2}$$

Затем необходимо найти точку, в которой производная равна 0.

$$F'(x) = 0, x = -\frac{1}{2} \in [-1;1]$$

Полученная точка принадлежит заданному отрезку, значит вычислим значение функции в этой точке.

$$F\left(-\frac{1}{2}\right) = \int_0^{-\frac{1}{2}} \frac{2t+1}{t^2 - 2t + 2}$$

После преобразований получаем, что

$$F\left(-\frac{1}{2}\right) = \int_0^{-\frac{1}{2}} \frac{(2t+1)dt}{t^2 - 2t + 2} = \left(\ln|t^2 - 2t + 2| - 3\operatorname{arctg}(t-1) \right) \Big|_0^{-\frac{1}{2}} = \ln \frac{13}{8} - 3\operatorname{arctg} \frac{3}{2} + \frac{3\pi}{4}.$$

Затем вычислим значение функции на концах отрезка:

$$F(-1) = \ln \frac{13}{8} - 3\operatorname{arctg} \frac{3}{2} + \frac{3\pi}{4}$$

$$F(1) = -\ln 2 + \frac{3\pi}{4}$$

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что: наибольшее значение функции достигается в точке $x = 1$, наименьшее значение функции достигается в точке $x = -\frac{1}{2}$.

Пример 9. Решить дифференциальное уравнение: а) $y(x) = \int_0^x y(t)dt + x + 1$

Решение. Продифференцируем обе части равенства по переменной x

$$y'(x) = y(x) + 1, y' = y + 1.$$

Это дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными. Решая его, получим общее решение: $y = ce^x - 1$.

Так как $y(0) = \int_0^0 + 0 + 1 = 1$; $1 = c - 1^0$; $c = 2$, то имеем начальное условие $y(0) = 1$,

что позволит найти $c = 2$.

Ответ: $y = 2e^x - 1$.

Пример 10. Найти все функции $f(x)$, непрерывные на $[0; +\infty)$, для которых

$$\sin\left(\int_0^x f(t)dt\right) = \frac{x}{x+1}.$$

Решение. Рассмотрим выражение $\sin\left(\int_0^x f(t)dt\right) = \frac{x}{x+1}$

Выразим интеграл с переменным верхним пределом:

$$\left(\int_0^x f(t)dt\right)' = \left(\arcsin\left(\frac{x}{x+1}\right)\right)'$$
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{x+1}\right)^2}} \cdot \frac{x+1-x}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)\sqrt{1+2x}}$$

Ответ: $f(x) = \frac{1}{(x+1)\sqrt{1+2x}}$

Заключение

Таким образом, многие нестандартные задачи можно решить с применением понятия «Интеграл с переменным верхним пределом». При этом используются различные способы и преобразования. Ведении понятия интеграла, рассмотрение его свойств, отработка техники интегрирования способствует осознанному качественному усвоению материала, развитию правильного представления об изучаемом понятии, его огромной значимости в различных науках.

Список литературы

1. Высшая математика: учеб. пособие / Е. А. Ровба [и др.]. – Минск: Выш. шк., 2012. – с.211
2. Применение интегралов в физике [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/book.23.pdf> – Дата доступа: 9.11.2020